



**ANAIS DO IV CONGRESSO DE SAÚDE E BEM ESTAR DO
MARANHÃO**

São Luis – MA

2016

IV CONGRESSO DE SAÚDE E BEM ESTAR DO MARANHÃO

PRESIDENTE: Profa. Dra. Andrezza de Almeida Bastos Maciel

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA: Profa. Dra. Andrezza de Almeida Bastos Maciel

Prof. Dr. Marco Aurélio Benini Paschoal

COMISSÃO ORGANIZADORA

Biomedicina: Prof. Me. Rachel Pontes

Educação Física: Prof. Me. Fabiano de Jesus Furtado Almeida

Enfermagem: Profa. Esp. Francisca Maria Ferreira Noronha

Estética: Profa. Me. Solange Negreiros de Almeida Bacelar

Farmácia: Profa. Dra. Angela Falcai

Fisioterapia: Profa. Me. Karla Virginia Bezerra de Castro

Fonoaudiologia: Prof. Pablo Ferraz

Medicina: Profa. Me. Edna Lucia Coutinho da Silva

Nutrição: Profa. Me. Rosângela Sousa

Odontologia: Profa. Dra. Andrezza de Almeida Bastos Maciel

Profa. Dra. Mariana Carvalho Batista

Psicologia: Prof. Me. Melina Serra

Profa. Rafisa Lobato

IV CONGRESSO DE SAÚDE E BEM ESTAR DO MARANHÃO

BIOMEDICINA

EDUCAÇÃO FÍSICA

ENFERMAGEM

ESTÉTICA

FARMÁCIA

FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGIA

MEDICINA

NUTRIÇÃO

ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

TERAPIA OCUPACIONAL



EXPEDIENTE

EDITORA CIENTÍFICA: Profa. Dra. Andrezza de Almeida Bastos Maciel

COORDENAÇÃO CIETÍFICA:

Profa. Dra. Andrezza de Almeida Bastos Maciel

Prof. Dr. Marco Aurélio Benini Paschoal

IV CONGRESSO DE SAÚDE E BEM ESTAR DO MARANHÃO – ANAIS

É uma publicação da Universidade Ceuma

Rua Josué Montello, número 1, Renascença II CEP 65075120 – São Luís/MA

Internet: www.ceuma.br/bemestar

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação UNIVERSIDADE CEUMA

Processamento Técnico Catalogação na fonte elaborada pela equipe

de bibliotecárias: Gleice Melo da Silva – CBR 13/650

Luciane de Jesus Silva e Silva – CRB 13/629

Michele Alves da Silva – CBR 13/601

Leontina Silva Neta – CRB 13/487

U58c

Universidade Ceuma.

Anais do IV Congresso de Saúde e Bem Estar. / Andrezza de Almeida Bastos Maciel (Editor). São Luís: UNICEUMA, 2016.

437p.

ISSN 2319-0914

Anais (IV Congresso de Saúde e Bem Estar). UNIVERSIDADE CEUMA, 2016.

1. Saúde 2. Bem Estar. 3. Qualidade de Vida I. Maciel, Andrezza de Almeida Bastos (Editor). II. Título.

CDU: 61(063)

Universidade Ceuma – Corpo Dirigente

Chancelar – Ana Elizabeth Fecury Braga

Reitor – prof. Me. Saulo Henrique Brito Matos Martins

Diretor de Operações e Diretoria de Relacionamentos – prof. Me. Marcos Barros e Silva

Diretor de Serviço Administrativo – Sérgio de Carvalho Tavares

Diretor Acadêmico –. prof. Shen Paul Ming Jen

Diretor de Desenvolvimento Institucional - Fabio Antônio Brito Matos Martins

Assessora de Regulação e Avaliação – Cristina Nitz da Cruz

Gestor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – prof. Dr. Valério Monteiro Neto.

Gestor da Unidade Renascença - Saulo Henrique Brito Matos Martins

Gestor da Unidade Cohama- Fernando Domingos de Carvalho Tavares

Gestor de Unidade Anil - Marcos André Marques Naves.

Gestor de Unidade Deodoro - Sergio Santos Filho

Gestor de Unidade Turu - Sérgio Fernando Saraiva Silva

Gestor do campus Imperatriz – Prof. Me. Sylvio Rogério Araújo Santos

Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) - profa. Me. Fabiana Mendes Lobato.

Chefe da Assessoria Jurídica - Gustavo Nogueira Santos

Chefe da Assessoria de Qualidade – profa. Me. Mekaele Frota do Vale

Coordenadora de Pós-Graduação Lato Sensu - Claudina dos Reis Ferreira

Coordenador de Extensão - Lauro Matioli

Coordenador do Programa de educação a Distância (EAD) – profa. Alda Leila Santos Baldez.

Coordenador do Comitê de Ética e pesquisa (CEP) – Rudys Rodolfo de Jesus Tavares.

Coordenador do Núcleo de Apoio Docente e Discente (NADD) –Melainie Christine Polary Franco Ribeiro.

Gestor do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) – Rodrigo Aparecido Justino

Chefe da Ouvidoria - Mekaele Frota do Vale

APRESENTAÇÃO

O IV Congresso da Saúde e Bem Estar do Maranhão foi realizado entre os dias 17 e 21 de outubro de 2016, com o objetivo de debater saúde em um contexto multidisciplinar, abrangendo todos os cursos da área da saúde da Universidade Ceuma. Estiveram reunidos em um único evento, profissionais e acadêmicos dos Cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Os resumos que compõem a presente publicação, em sua grande parte, tiveram sua origem em trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso de graduação, de especialização e de mestrado, e de trabalhos desenvolvidos em sala por alunos e professores dos diversos cursos da área da Saúde não somente da Universidade Ceuma, mas como de diversas outras instituições de ensino superior do Maranhão e de outros estados, com o intuito de divulgar suas pesquisas individuais e/ou coletivas.

Foi muito gratificante, e engrandecedor, participar das discussões que se desenvolveram durante o evento que manteve, ao longo dos cinco dias de atividades, a reunião de autores de cerca de 900 trabalhos científicos e aproximadamente 3000 congressistas inscritos provenientes tanto da Universidade CEUMA quanto de diversas outras instituições de ensino superior da região. Assim é fundamental importância a divulgação dos resumos para que o leitor possa avaliar a relevância dos assuntos apresentados.

É com imensa satisfação que agradecemos a todos aqueles que contribuíram para a realização deste IV Congresso de Saúde e Bem Estar do Maranhão, e destacamos particularmente a importância dos alunos, professores e gestores que, de diferentes formas nos acompanharam ao longo da organização e realização do Congresso.

Comissão Organizadora

São Luis, outubro de 2016

SUMÁRIO

	p.
MESA DEMONSTRATIVA	08
PAINEL CASO CLÍNICO GRADUAÇÃO	25
PAINEL CASO CLÍNICO PÓS-GRADUAÇÃO	60
PAINEL PESQUISA GRADUAÇÃO	67
PAINEL PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO	133
PAINEL REVISÃO DE LITERATURA GRADUAÇÃO	143
PAINEL REVISÃO DE LITERATURA PÓS-GRADUAÇÃO	319
TEMA LIVRE CASO CLÍNICO GRADUAÇÃO	328
TEMA LIVRE CASO CLÍNICO PÓS-GRADUAÇÃO	343
TEMA LIVRE PESQUISA GRADUAÇÃO	351
TEMA LIVRE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO	372
TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA GRADUAÇÃO	374
TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA PÓS-GRADUAÇÃO	426

MESA DEMONSTRATIVA

ACIDENTES BIOLÓGICOS EM CTBMF : TIPOS DE PREVENÇÃO

VALE, Carlos Eduardo Silva Vale; BAQUIL, Bruna Lethicia Pedrosa; LIMA, Caroline Santos; BORRALHO, Luccas Vinicius de Aragão; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: brunaleth@hotmail.com

Resumo : Com o avanço da tecnologia odontológica nos últimos anos, o número de acidentes biológicos em equipes de atendimento odontológico vem crescendo, levando à inúmeros estudos sobre as causas desses acidentes. Estresse, excesso de carga horária de trabalho, estado emocional dos pacientes e/ou profissionais durante o atendimento e principalmente o uso incorreto da biossegurança, fazem com que os profissionais estejam suscetíveis à uma grande variedade de micro-organismos que estão presentes no sangue, saliva e nas vias aéreas dos pacientes. Essa exposição pode ser minimizada com um bom planejamento de práticas de trabalho e organização profissional no atendimento, sem negligenciar o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, manuseio correto de instrumentais e materiais biológicos, imunização completa, adequação das instalações físicas aos preceitos da biossegurança e capacitação continuada dos cirurgiões, sendo assim evitando o comprometimento da qualidade de sua saúde e dos procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados. O objetivo do trabalho foi apresentar as diversas formas de se prevenir contra os acidentes biológicos frente as CTBMF (cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial) evitando assim a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Os dados foram coletados do Ministério da Saúde, PubMed, Ebsco. A partir dos achados foi possível concluir que existem várias formas de prevenção para se evitar acidentes, porém é negligenciada por profissionais e graduandos.

ACIDENTES BIOLÓGICOS EM CTBMF: TIPOS DE PROTOCOLO

VERAS, Nicole Paiva Veras; SILVA, Lara Araújo da; BRASIL, Natália Silva; FERREIRA, Mychelle Thainá Marques; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: npaivaveras@gmail.com

Resumo : As cirurgias buco-maxilo faciais trabalham com procedimentos de alto risco envolvendo material biológico. Essa exposição funciona como via de transmissão de várias doenças, como hepatite B, hepatite A, AIDS e outras doenças virais e bacterianas. Muitos profissionais e acadêmicos não conhecem o protocolo a ser seguido após o acidente biológico e, geralmente, há negligência no preenchimento do registro e notificação do acidente ocorrido. Um dos métodos a se seguir, é ter cuidado com a área exposta, fazer a notificação, realizar os exames de detecção viral no espaço de tempo determinado no protocolo e mesmo com resultados positivos ou negativos, é importante que o indivíduo administre os medicamentos como forma de prevenção da possível doença. O objetivo do estudo foi apresentar e orientar sobre os tipos de protocolos de exposição a material biológico em CTBMF (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial) para evitar que o indivíduo adquira a doença. Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa bibliográfica em bases de dados como o PubMed, Ebsco, Bireme, Google Acadêmico e do Ministério da Saúde. A partir dos achados, é possível concluir que o protocolo é o meio mais simples de proteger o indivíduo de possíveis doenças, mas não é seguido corretamente pela maioria dos profissionais e pacientes, os quais abandonam muitas vezes o tratamento pela metade ou não são acompanhados de maneira correta por uma equipe multidisciplinar.

ARSENAL ANESTÉSICO

LARANJA, Gabrielle de Oliveira*; DA SILVA JÚNIOR, Ricardo Cláudio; BORGES, Michael; ABDALA, Rachid; GALDINO, Beatriz; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: gabi.-.zinha@hotmail.com

A evolução do arsenal anestésico possibilitou maior eficiência terapêutica e ampliou a segurança clínica desses fármacos, tornando o tratamento odontológico um procedimento mais confortável e, portanto, menos estressante para o paciente. O arsenal anestésico consiste em seringa, agulha, cartucho, equipamento adicional e preparação do equipamento. A seringa carpule é um dos três componentes essenciais do arsenal anestésico podendo ser com refluxo ou sem refluxo (os outros são a agulha e o cartucho). Há oito tipos de seringa para administração

de anestésicos locais disponíveis para uso em odontologia hoje em dia. A agulha é o veículo que permite que a solução anestésica local passe do cartucho odontológico para os tecidos ao redor de sua ponta. O cartucho odontológico é um cilindro de vidro ou plástico que contém a droga anestésica local, contém aproximadamente 1,8 ml de solução anestésica local. O antisséptico tópico serve para preparar os tecidos no local da injeção antes da penetração da agulha. A aspiração pode ser dividida em dois tipos, a passiva conhecida como auto aspiração e a ativa.. Assim, o objetivo desta revisão é atualizar o cirurgião-dentista sobre os novos avanços e sobre o que o futuro reserva sobre o arsenal anestésico.

ARSENAL CIRÚRGICO

JUNIOR, Renato Veloso Costa*; COSTA, Priscilla Nunes; COSTA, Jacilene Jansen; PEREIRA, Thayanne Moura; JUNIOR, Rildo Santos Sousa; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: renato.junior05@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O arsenal cirúrgico consiste em todos os instrumentais necessários para fazer procedimentos na cirurgia oral, são utilizados para ampla variedade de finalidades, incluindo os tecidos moles e duros. Após a anestesia são realizadas quatro manobras. A primeira é a diérese que tem função de separação dos tecidos moles e duros, a segunda é a exérese que irá fazer a remoção dos tecidos moles e duros (remoção total do órgão), a terceira é a hemostasia que fará a contenção do sangramento, e por fim a síntese que fará a sutura/osteossíntese. Com isso devemos saber a importância e função de cada instrumento cirúrgico dentre eles o bisturi, descolador de molt, os afastadores, pinça hemostática, pinça allis, pinça, cinzel, o martelo, a lima, porta- agulha ,tesouras de sutura, as alavancas e o conjunto de fórceps. Assim, o objetivo desta revisão é atualizar o cirurgião-dentista sobre os novos avanços e sobre o que o futuro reserva sobre o arsenal cirúrgico.

BICHECTOMIA: A CIRURGIA PLÁSTICA DA BELEZA

COSTA JUNIOR, Renato Veloso*; VALE, Carlos Eduardo Silva Vale; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima;

Curso: Odontologia

Email: renato.junior05@hotmail.com

Para se sentir bem com o corpo, os brasileiros estão sempre procurando por cirurgias plásticas que possam corrigir esta ou aquela imperfeição. O Brasil é o segundo país do mundo que mais

faz cirurgias plásticas, a maioria por vaidade. Desenvolvida para deixar o rosto mais magro e fino diminuindo a forma arredondada das bochechas, a cirurgia de bichectomia está sendo muito procurada pelas pessoas que se incomodam com as bochechas enormes. A cirurgia consiste na retirada da bola gordurosa de Bichat. A bola de Bichat é uma estrutura que se encontra na face na região das bochechas, consiste em um acúmulo de gordura que existe em todas as pessoas, no entanto alguns indivíduos podem apresentar uma quantidade maior desta gordura ocasionando um formato arredondado à face. Algumas pessoas se sentem incomodadas com isso e para essas pessoas pode estar indicada a cirurgia de remoção de bola de Bichat (bichectomia).

CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES DE DIFERENTES DISPOSITIVOS PARA CONTROLE MECÂNICO DO BIOFILME DENTÁRIO

AMARAL, Neuza Costa*; NUNES, Livia Helena De Araújo Castro; CARDOSO, Fabiana Daniele Maia; BARROS, Caroline Mano; MELO, Natália Costa Oliveira; ZAGO, Patricia Maria Wiziack; JUNIOR, José Carlos Mouchreck.

Email: amaralkcosta@gmail.com

Curso: Odontologia

A relação entre gengivite e acúmulo de biofilme dentário foi evidenciada por Loe em 1965. Assim, a higiene bucal, especialmente a escovação dentária, é o principal método para controle do biofilme, do desenvolvimento de doenças periodontais e da ocorrência de cárie. A American Dental Association (ADA) preconiza que a escova dentária contenha tufo de mesmo comprimento arranjados em 3 ou 4 fileiras; cabeça e haste em um mesmo eixo, cerdas arredondadas e de náilon, seja leve e impermeável, ofereça facilidade de manipulação e limpeza, possua durabilidade, eficiência e baixo custo. No mercado, escovas de diferentes desenhos estão disponíveis, e a superioridade de uma à outra muitas vezes é inconclusiva. No entanto, estudos demonstraram que escovas com cerdas duras estão associadas à recessão gengival, enquanto as cerdas macias são mais flexíveis, podem alcançar regiões abaixo da margem gengival e interproximais. As escovas elétricas removem biofilme de maneira semelhante ou pouco melhor do que as escovas manuais, e podem ser opção para pacientes sem destreza manual. Dentre os dispositivos para limpeza interdentária têm-se: o fio ou a fita dental, escovas interproximais, que podem ser empregadas para superfícies irregulares adjacentes a espaços interdentários largos ou áreas de furca; e a escova unitufo, utilizada para limpeza dos espaços interproximais com ausência de papila e superfícies dentárias. A partir do exposto, verifica-se a importância de que o cirurgião-dentista conheça os principais dispositivos

disponíveis para a higiene bucal e, assim, possa indicar adequadamente aquele que ofereça maior facilidade e qualidade de limpeza ao seu paciente.

CIRURGIAS PERIODONTAIS RESSECTIVAS: DOS INSTRUMENTAIS A PRÁTICA CLÍNICA.

CASTRO, Igor Renault Marques*; DOS SANTOS, Reginaldo Victor Pereira; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena De Araújo Castro

Curso: Odontologia

Email: igorrenault@icloud.com

As cirurgias periodontais são aplicadas com diversas finalidades, desde estabelecer uma morfologia da área dento-gengival que facilite o controle do biofilme dentário, com finalidade restauradora, finalidade endodôntica, finalidade ortodôntica, correções mucogengivais e pré-protéticas, visando um excelente contorno gengival e muitas das vezes o restabelecimento das distâncias biológicas. Dentre as cirurgias periodontais ressectivas, as com finalidade de aumentar a coroa clínica, permitem a realização do preparo dentário apropriado, moldagens e ajuste das margens restauradoras e dos níveis gengivais, prezando a manutenção do espaço biológico. O espaço biológico é descrito em várias literaturas como a distância compreendida entre a margem gengival e o vértice da crista óssea alveolar, tendo como principais componentes: o sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, resultando numa média de 3 mm. Alterações nesse espaço são causadoras de desordens, como recessões e formação de bolsas periodontais. As cirurgias periodontais ressectivas, são aquelas onde o tecido gengival é removido, acompanhadas ou não de retalhos, ostectomias e osteoplastias. São utilizadas como precedentes de procedimentos restauradores ou para correções estéticas, como hiperplasias e aberrações gengivais. Em tais cirurgias são utilizados instrumentais próprios, compatíveis com a biologia dos tecidos e sua delicadeza, além de suturas próprias para o reposicionamento dos retalhos. É importante para o cirurgião-dentista e para o acadêmico o conhecimento sobre os instrumentais utilizados em periodontia, para realização correta do tratamento e manutenção da saúde bucal, possibilitando o restabelecimento completo (clínico e histológico) do periodonto e a manutenção da harmonia e da estética vermelha e branca.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E INDICAÇÕES CLÍNICAS DOS DENTIFRÍCIOS

SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira*; MARQUES, Larissa Falcão; NASCIMENTO, Caroline Martins; MACIEL, Andrezza Bastos; MARQUES, Tarcia Virginia Falcao

Email: ritarsouzaji@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O principal fator etiológico da cárie e da doença periodontal é a presença do biofilme dentário. Apesar do controle mecânico através da escovação e uso de fio dental serem os métodos mais efetivos para a remoção do biofilme, a pasta de dente, também chamada de creme dental ou dentifrício, é um produto químico utilizado juntamente com a escova de dente com o fim de proporcionar uma boa higiene bucal por meio do controle químico do biofilme dentário. Os dentifrícios são utilizados para levar várias substâncias à cavidade bucal, objetivando a redução da cárie, das doenças gengivais e periodontais, da hipersensibilidade dentinária e da halitose. Dentre estas substâncias, atualmente estão: sistemas abrasivos, detergentes, flavorizantes, solventes, umectantes, aglutinantes, edulcorantes, conservantes e princípios ativos. No mercado, é possível encontrar uma variedade de dentifrícios, com diferentes princípios ativos, tais como dessensibilizantes, fluoretos, triclosan, clorexidina, cloreto de cetilpiridíneo, com diversos sabores que promovem um hálito refrescante e com várias indicações clínicas. Este trabalho tem como objetivo mostrar de forma simples e didática, através de uma mesa demonstrativa, a composição dos dentifrícios atuais, seus princípios ativos e suas indicações clínicas.

CONTROLE BIOLÓGICO DAS HEMORRAGIAS

ARAUJO, Johnatan Reis Oliveira*; ALVES, Samylle Suzanny Farias; SILVA, Nathalia Marques; SOUZA, Luan Moraes; SILVA, Maiane Alves; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: johnatan.reis@hotmail.com

Cirurgias orais são procedimentos comumente vivenciadas na prática clínica de cirurgiões-dentistas em todo o mundo, como exodontias, biópsia de tecidos, implantes e cirurgias maxilofaciais maiores. Uma das complicações mais frequentes nesses procedimentos é a hemorragia, tanto no trans como pós-operatório. A hemorragia é caracterizada por uma intensa perda de sangue por algum orifício, ou corte, para dentro ou para fora do corpo. O meio mais eficiente para descobrir um possível problema é uma anamnese criteriosa para obtenção dos dados da história médica pregressa e atual do paciente, junto com um exame complementar, como: coagulograma, que são indispensáveis para prevenção da hemorragia e detecção de possíveis patologias sanguíneas que possam causá-las. A hemostasia é o conjunto de mecanismos que faz cessar uma hemorragia, é um processo fisiológico complexo, que envolve mecanismos físicos e biológicos. Os pacientes com desordens hemorrágicas podem apresentar defeitos em qualquer um desses mecanismos. Um modo de hemostasia é o de controle biológico, e são alguns deles: Esponja de fibrina, celulose oxidada, esponja de gelatina

absorvível, cola de fibrina. A prevenção das complicações deve ser o principal objetivo dos cirurgiões sendo que um detalhado planejamento associado ao conhecimento do profissional são fatores fundamentais. Diante do exposto, o trabalho tem como finalidade reunir informações disponíveis e evidenciar a importância em casos de hemorragias durante e após cirurgias, os meios que o profissional deve ter conhecimento das manobras.

CONTROLE MECÂNICO DAS HEMORRAGIAS

SANTOS, Antonio Marcos Gomes; NETO, José Nosque Bezerra Sampaio; PEREIRA, Paulo Winícios Silva; SOUSA, Ronnildson Lenne Ponte de; NUNES, Igor Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Prof. Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: antoniomarcos25@uol.com.br

Resumo : RESUMO Cirurgiões-dentistas clínicos e bucomaxilo-faciais realizam uma diversidade de procedimentos cirúrgicos, incluindo a remoção de dentes, biópsia de tecidos, implantes e cirurgias maxilofaciais maiores. Entre os acidentes referentes a esses procedimentos, a hemorragia, seja no trans ou no pós-operatório, constitui-se em um dos mais frequentes. A Hemorragia é caracteriza por perda de excessiva de sangue. Em cirurgias podem surgir complicações que acontecem apesar de todos os cuidados pré-operatórios que são tomados. Para uma cirurgia mais segura a anamnese deve ser um questionário sistemático, sendo indispensável a discussão direta e extensa entre o profissional e o paciente para descobrir detalhes que sugerem defeito hemostático. Caso o cirurgião dentista observar algum tipo de alteração sanguínea, solicitará um exame complementar como: coagulograma. A hemostasia é o conjunto de mecanismos que faz cessar uma hemorragia, é um processo fisiológico complexo, que envolve mecanismos físicos e químicos. Os pacientes com desordens hemorrágicas podem apresentar defeitos em qualquer um desses mecanismos. Alguns métodos de controle mecânico são: Compressão, Pinçagem, Ligadura, Sutura, Aplicação de frio. A prevenção das complicações deve ser o principal objetivo dos cirurgiões sendo que um detalhado planejamento associado ao conhecimento do profissional são fatores fundamentais. Diante do exposto, o trabalho tem como finalidade reunir informações disponíveis e evidenciar a importância em casos de hemorragias durante e após cirurgias, os meios que o profissional deve ter conhecimento das manobras. Palavras-chave: Hemorragia; Hemostasia mecânica; Cirurgia oral.

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PERFUMES

SARAIVA, Teandra Gomes*; FERNANDES, Taiany de Oliveira; CATARINO, Alderlan Brasil; SILVA, Jordan Michel Gomes; MUALEM, Michelle Villas Boas; CARVALHO, Laise Neves.

Email: teandra_gomes@hotmail.com

Curso: Farmácia

Os perfumes são compostos de fragrâncias, solventes e fixadores, que servem para proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. As essências podem ser naturais ou artificiais. As naturais são extraídas de vegetais, como flores, folhas, caules e raízes, ou de animais. Mas além de precisar de uma quantidade enorme de vegetais para se obter pequenos mililitros de essências, vários animais já foram quase extintos. Assim, a maioria das fragrâncias usadas nos perfumes atuais é sintetizada em laboratório. É uma contextualização da indústria química e desenvolvimento tecnológico da sociedade, tendo em vista que essa é uma ciência muito usada na produção de diversos produtos, como na indústria de cosméticos. Hoje em dia a indústria do perfume movimenta bilhões de dólares e emprega milhares de pessoas ao redor do mundo. Assim o objetivo dessa mesa demonstrativa é expor a composição dos perfumes.

DEMONSTRAÇÃO DO MÉTODO DE MANIPULAÇÃO DE UM HIDRATANTE PERSONALIZADO

SAMPAIO, Hellen Lobato*; MOREIRA, Hyngrid Carolinne Soares Ferreira ; DE MOURA, Tábata Maria Leite Machado; NUNES, Letícia Corrêa; PEREIRA, Caroline Zilma Kalil de Paula Costa; MUALEM, Michelle Villas Boas; CARVALHO, Laíse Neves

Email: hellenlsampaio@gmail.com

Curso: Farmácia

Resumo: O objetivo do presente trabalho é demonstrar um método de manipulação de um hidratante que possibilite a personalização da fórmula. A pele é o órgão humano mais amplo, tanto em extensão, quanto em variedade de espessura, pH e funções, sendo algumas delas: termo regulação; secreção; sensorial e defesa contra agentes químicos e físicos, como os que promovem a desidratação. Por isso, deve-se manter o máximo possível da integridade deste órgão, pois há, naturalmente, uma tendência da água presente nele se evaporar, visto que, a quantidade de água na pele é maior que no ambiente. Devido a isso, existem cosméticos hidratantes, que evitam a perda excessiva de água e o ressecamento da pele, e que são potencializados com a incorporação de ativos no creme base, como o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico, que conferem resultados cosméticos eficazes, como elasticidade, firmeza e luminosidade para a pele, além da hidratação.

DENTIFRÍCIO CLAREADORES

MOREIRA, Keila Soares*; MORAIS, Laura Santos de; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; GOMES, Isabella Azevedo; MAIA, Mariana Lopes e; KUSSANO, Sandro Carvalho; BRUZACA, Karoline Guará.

Email: keylla295@gmail.com

Curso: Odontologia

Um sorriso branco é tido como um dos itens no padrão de beleza na atualidade, recebendo atenção na tentativa de eliminar manchamentos de origem extrínseca ou intrínseca. Uma das alternativas utilizadas pelos pacientes é o uso de dentífrícios clareadores disponíveis no mercado. No entanto, não estão presentes em sua composição nenhum agente clareador, mas sim diferentes abrasivos. Como exemplos, pode-se citar a alumina, sílica, carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio, dentre outros, contribuindo apenas para a remoção de manchas superficiais que são resultado da absorção e incorporação de corantes contidos nos alimentos. A associação desses abrasivos potencializam seu efeito, podendo causar a longo prazo pequena redução da espessura do esmalte e, inclusive, maior saturação da cor dos dentes devido à maior transparência da dentina subjacente.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

SOUZA, Wenny Karolliny Moreira*; COSTA, Hugo Costa; QUEIROZ, Jefferson de Brito; PEREIRA, Ana Carolina Soares; DE SOUZA, Rafaela Luiza Kich; CORREA, Silvan; MADEIRA, Petrus Levid Barros

Email: wenny.moreira@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

O cirurgião-dentista enfrenta, no cotidiano de seu trabalho, o risco de presenciar eventos de emergenciais durante seu atendimento tais como, como: broncoaspiração, convulsão, síncope e parada cardiorrespiratória entre outros. Embora não sejam comuns, as situações de emergência médica odontológicas podem ocorrer durante o atendimento do CD de modo imprevisível, sem obedecer a regras ou padrões definidos podendo ocorrer com qualquer indivíduo, a qualquer hora e em todo lugar, assim como antes, durante e após o procedimento em odontologia. O profissional deve, portanto, estar preparado para resolvê-las. A avaliação do estado geral de saúde e a adoção de medidas preventivas aumentam a segurança clínica no atendimento de pacientes que requerem cuidados especiais. Por tanto o objetivo desse trabalho é fazer demonstração através de mesa clínica das principais emergências médicas odontológicas que podem ocorrer no ato de um atendimento, e as manobras que o mesmo deve fazer para controlar e reverter essas situações de emergência baseados nos protocolos da AHA

ETAPAS DA BIÓPSIA

COUTINHO, Matheus Felipe Veloso*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; NASCIMENTO, Heney Kayo Lima; PENHA, Ana Thereza Santos; SOUSA, Daniel de Aquino; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos

Email: matheuscoutinho60@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Na Odontologia, o uso de recursos complementares deveria ser uma rotina nos consultórios. Uma das limitações para o diagnóstico preventivo e tratamento de lesões bucais é a pouca incidência de cirurgiões dentistas que utilizam a Biópsia Oral como exame complementar. Deve-se ter a percepção de que o diagnóstico clínico pode muitas vezes ser equivocado ou duvidoso. A Biópsia Oral é um procedimento ainda pouco usufruído, talvez pela insegurança dos cirurgiões dentistas em realizar a técnica de maneira correta e segura. Para execução desse procedimento, o profissional deve possuir conhecimentos anatômicos, histológicos e além disso, da sequência das manobras cirúrgicas que são utilizadas. Os principais tipos de biópsia bucal são a Incisional, em que apenas uma parte da lesão é removida; Excisional, onde toda a lesão é removida; por Aspiração, que emprega uma agulha e uma seringa para penetrar numa lesão e fazer aspiração de seu conteúdo; por Curetagem, feita por meio de raspagem com uma cureta. Nesse sentido, o respectivo trabalho tem por objetivo apresentar a importância da realização desse procedimento pelo cirurgião dentista, além de fornecer orientações sobre suas etapas e recomendações para sua correta execução, a fim de se promover a melhoria no diagnóstico de lesões bucais.

GOSTARIA DE SABER COMO PRODUZIR UM SABONETE EM BARRA COM EXTRATO DE ALOE VERA?

SILVA, Jordan Michel Gomes*; MUALEM, Michelle Vilas Boas; CARVALHO, Laise Neves

Email: jordanmichell@hotmail.com

Curso: Estética

Resumo: O sabonete é um tipo de sabão fino utilizado para higiene pessoal. Possui solubilidade em água e é quimicamente representado pelos ácidos graxos. Tem propriedade alcalina, com Ph variando entre 9 e 10. Além da utilização na higiene corporal, pode apresentar aplicações adicionais se associado a substâncias terapêuticas. A Aloe barbadensis miller, popularmente conhecida como babosa, é uma planta utilizada desde os tempos antigos, datando sua primeira utilização no Egito, no ano de 400 a.C. Esta planta possui em sua composição entidades químicas que atuam como agentes coadjuvantes para o tratamento de inúmeras patologias, além de possuir propriedades antibacterianas, antifúngicas e antiinflamatória, por isso, tem sido utilizada

amplamente em cosméticos. Assim a proposta dessa mesa demonstrativa é apresentar etapas de elaboração do sabonete de Aloe Vera em barra.

IDENTIFICAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBIO INDIVIDUAL NA CORRIDA

SILVA, Angélica Gomes*; MENDONÇA, Adailton Tinoco; BARBOZA, Nayana Maria Lopes dos Reis; DE SOUZA, Angelita Bezerra; JÚNIOR, Fernando César Pestana Trovão; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes; DA CUNHA, Marcio Luis Araújo

Email: l.alexnunes@hotmail.com

Curso: Educação Física

Resumo: A corrida é a forma de exercício físico que mais conquistou adeptos nos últimos anos em nossa cidade. O motivo é que contamos com vários locais apropriados para esta prática, assim como seu baixo custo com as vestimentas. O objetivo desta mesa demonstrativa é identificar a velocidade de corrida que representa o limiar anaeróbio individual, zona de intensidade que compreende a transição aeróbia-anaeróbia. Para a coleta dos dados, serão utilizados uma esteira ergométrica e um monitor de frequência cardíaca. O protocolo será baseado no ponto de deflexão da frequência cardíaca e no princípio de Conconi, no qual os indivíduos correrão vários estágios ininterruptos de 3 minutos com aumento progressivo da velocidade da esteira. Esperamos com isto, ajudar os corredores encontrar a velocidade ideal de treinamento e alcançarem seus objetivos com mais eficiência, propiciando maior motivação ao praticante, assim como a manutenção da prática da atividade por um período mais prolongado.

O USO DE BIOMATERIAIS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PERIODONTAIS

BARBOSA, Daniele Vitoria de Sousa*; BARBOSA, Daniele Vitoria de Sousa; JÚNIOR, José Carlos Elias Moucherek ; NUNES, Lívia Helena Castro

Email: danielevsb@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O USO DE BIOMATERIAIS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PERIODONTAIS A periodontite é uma doença infecciosa, desencadeada por bactérias patogênicas e caracterizada pela formação de bolsa, perda de inserção e perda do osso alveolar na maioria dos casos afetando a sobrevivência do elemento dentário. Embora a terapêutica periodontal convencional consiga impedir a progressão da doença periodontal, a mesma muitas vezes não é capaz de recuperar os tecidos perdidos. Sendo assim, diversas técnicas cirúrgicas regenerativas foram criadas para devolver os tecidos perdidos e melhorar a estética e a função dos pacientes. Os biomateriais são materiais que podem ser implantados para substituir ou reparar tecidos em

falta. Podem ser de origem natural ou sintetizados em laboratório e são capazes de interagir com o corpo humano. Nessa perspectiva, diversos materiais foram desenvolvidos com as mais variadas indicações, tornando-se parte integrante de muitos protocolos que comprovadamente contribuem para a regeneração de tecido duro e mole.

OS TIPOS DE PRÓTESES PARA SAÚDE E BEM ESTAR DO PACIENTE

MUNIZ, Dayane Nascimento*; ABREU, Isabella Mayara Barbosa; DE JESUS, ADRIANA SANTOS DE MALHEIROS DE JESUS

Email: dayanenascimento20@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

No Brasil, o número de pessoas que já perderam dentes devido à cárie ou doença periodontal ainda é alto, segundo o IBGE (2013). Diferente do que muitas pessoas pensam os dentes significam muito mais do que um “sorriso bonito”, a perda desse órgão afeta a saúde do corpo em geral, além de prejudicarem a fala e a mastigação. A odontologia através da prótese dentária tenta reestabelecer a anatomia bucal visando a restaurar e manter a forma, função, aparência e saúde oral, fazendo a reposição adequada para as porções coronárias de um ou mais dentes naturais perdidos e também as partes circunvizinhas. Esse trabalho visa a demonstrar os vários tipos de próteses dentárias (prótese unitária, prótese parcial fixa, prótese parcial removível, prótese total e prótese sobre implantes), assim como, a indicação para cada uma delas.

P.A.M GUIA ANTERO POSTERIOR MARINHO

MELO, Natália Costa Oliveira*; CAVALCANTE, Walman Pereira; ROCHA, Francisca Safira Vale; SARMENTO, Paloma Muniz; SARAIVA, Livia Maria Pereira; LIMA, Saulo André de Andrade

Curso: Odontologia

Email: nataliamelo.95@hotmail.com

O objetivo do trabalho é expor, através de uma mesa demonstrativa a usabilidade, mecânica e benefícios do Guia Postero Anterior Marinho ou P.A.M. Estes aparelhos tiveram seu início no final de 1960 e foram evoluindo até hoje. Apoiaram-se nos aparelhos de OFM a exemplo dos clássicos Planas, Bimler, Bionator, Frankel e após usar estes aparelhos procurou-se alternativas que oferecessem mais liberdade nos movimentos bordejantes (não só abrir e fechar a boca). A cooperação dos pacientes que fazem uso de aparelhos ortopédicos é um problema constante entre os ortodontistas. Com o aparelho Guia Pósterio Anterior Marinho percebe-se maior colaboração por parte dos pacientes, devido ao menor tempo de tratamento, menor volume de resina, liberdade de movimentação mandibular e menor estresse muscular devido a mordida

construtiva bioprogressiva que elimina também a montagem dos modelos em articulador e a tomada da mordida construtiva.

QUEDAS: É PRECISO EVITÁ-LAS - PREVENÇÃO DE QUEDAS NA VELHICE.

CAMPOS, Jessica Kerly Garces*; DA SILVA, Lídia Maria Lopes; DE MATOS, Pâmella Mayara Ferreira; BELFORT, Iara Araújo; COSTA, Alexandar Charlas Ribeiro; SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro

Email: kerlycampos33@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

Resumo: Objetivo: Atuar junto a idosos da comunidade, na perspectiva de prevenir quedas e de ampliar suas possibilidades de lazer e de sociabilização contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Metodologia: O projeto transcorreu entre fevereiro a maio de 2016, na unidade de saúde da família Pirapora-São Luis-Ma, tendo como alvo, idosos acima de 60 anos. Os procedimentos foram divididos em quatro etapas: recrutamento, avaliação multidimensional dos fatores de risco às quedas, palestras sobre medidas preventivas de quedas, intervenção com exercícios e acompanhamento posterior no ano seguinte. Resultados: Participaram do projeto 35 idosos sendo, 31 mulheres e 04 homens com idade entre 62 e 78 anos, com média de $\pm 65,6$, sendo 88,57% do sexo feminino, com um nível de escolaridade que predominou o nível superior (48,5%) dos idosos. A assiduidade foi constante e o interesse na participação em todas as etapas foi o ponto alto. A maioria dos idosos desconhecia grande parte dos fatores de risco e não utilizava nenhuma medida preventiva para quedas. Conclusão: programas de intervenção multifatorial podem ser efetivos para redução de quedas em idosos da comunidade, principalmente se abordadas medidas de prevenção aos fatores de risco. Tais programas devem, além das informações, incluir exercícios físicos e pelo menos outra das seguintes estratégias: correção da visão e riscos ambientais, tratamento da hipotensão ortostática, revisão de medicamentos e aconselhamento sobre prevenção de quedas, visto que a maioria das participantes ignorava tais informações. A participação de uma equipe multidisciplinar é indispensável. Descritores: Quedas. Idosos. Prevenção de quedas.

REABILITAÇÃO ORAL COM COROAL TOTAL METALOCERÂMICA EM DENTES POSTERIORES

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Rocha*; MOFFA, Eduardo Buoizzi

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

Os elementos dentários podem sofrer danos oriundos da doença cárie, traumatismos mecânicos acidentais, erosão por alimentação rica em substâncias ácidas, parafunções, iatrogenias, dentre

outros. As restaurações indiretas surgem como uma opção terapêutica para a reabilitação dessas unidades dentárias destruídas, sendo a coroa total uma delas. Esse trabalho tem como objetivo apresentar de forma lúdica e didática, os princípios que norteiam os preparos para as coroas totais metalocerâmicas, elucidando o passo-a-passo para a realização de preparos em dentes posteriores e a sequência de tratamento em prótese fixa. Deve-se obedecer aos princípios biomecânicos com desgastes e inclinações apropriadas, respeitando todas as etapas da reabilitação oral a fim de se obter um preparo adequado, com a devida condição de receber uma coroa total estética e funcional. Desse modo, ressalta-se a importância dos princípios biológicos, mecânicos e estéticos em prótese fixa a fim de garantir longevidade no tratamento restaurador e satisfação do paciente.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE DANÇA: ENCONTROS DE RITMOS.

MARQUES, Sallomé Maphysa de Oliveira; BARROS, Fabiano Correia; SILVA, Evelyn Celice Almeida da; COSTA, Brenda Santana; SILVA, Islla Fernanda de Jesus Serra; PRAZERES, Jozimar

Curso: educação física

Email: sallome_mafisa@hotmail.com

Resumo: Trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho que foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de educação física de licenciatura da Universidade Ceuma, na disciplina de metodologia do ensino da dança, com o objetivo de vivenciar a própria dança através de uma proposta Educacional desenvolvida pelo professor e orientador Jozimar Prazeres, com duas turmas sendo respectivamente uma do turno vespertino e outra do noturno. A proposta vincula-se a uma produção corporal onde os alunos desenvolveram uma coreografia que foi apresentada no V simpósio de Atividades Físicas e Saúde no dia 7 de junho de 2016 no auditório Josué Montello da Universidade. O trabalho foi construído através de performances com os grupos da Universidade Ceuma e convidados. Que gerou um conhecimento à cada envolvido, na construção de seu próprio enredo e na auto superação de limites.

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR NA ESCOLA: UM FOCO DE DISSEMINAÇÃO.

BRITO, Adriano Marques*; NETO, Landri Antonio Gomes; NUNES, Joana Kátya Veras Rodrigues Sampaio; NUNES, Karine de Paiva Lima Nogueira; VERAS, Artur de Souza; SILVA, Flor de Maria Araújo Mendonça; MATTIOLI, Magali Kelli Nitz

Email: magalinitz@hotmail.com

Curso: Medicina

Introdução: Morte súbita é a Parada Cardiorespiratória definida como cessação de atividade mecânica cardíaca, ausência de sinais de circulação e de responsividade e pulso, apneia ou

respiração agônica (DATASUS, 2014; CARVALHO 2006). Objetivo: habilitar alunos do 6º ao 9º ano na intervenção precoce da PCR e no reconhecimento dos casos de PCR na U.E.B Olinda Desterro, São Luís-MA. Métodos: Participaram 115 alunos. Foram realizadas cinco ações estratégicas: aplicação do pré-teste de avaliação; exposição dialogada; demonstração da técnica de reanimação com o uso de manequins; atividades práticas com os participantes; distribuição de material educativo e aplicação de pós-teste. Resultados: Foi observado no pré-teste que a média geral de acertos do 6º ano (25%); Média geral do 7º ano (25%); Média geral do 8º ano (33%); Média geral do 9º ano (32%). Apenas 1 aluno do 9º ano acertou 70% das questões no pré-teste, 27 alunos acertaram 50% das questões no pré-teste e as melhores médias gerais no pré-teste se incluem o 8º ano (33%) e o 9º ano (32%). No pós-teste foi observada a média geral do 6º ano: 41%; Média geral do 7º ano: 35%; Média geral do 8º ano: 38%; Média geral do 9º ano: 44% de acertos. Conclusão: Na análise dos dados as melhores médias gerais no pós-teste se incluem o 6º ano (41%) e o 9º ano (44%).

SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

FERNANDES, Júlia Bezerra*; MONTEIRO, Maria Luiza Teixeira; MATTIOLI, Magali Kelli Nitz; NUNES, Karine de Paiva Lima Nogueira; VERAS, Artur de Souza; SILVA, Flor de Maria Araújo Mendonça; NUNES, Joana Kátya Veras Rodrigues Sampaio Nunes

Email: magalnitz@hotmail.com

Curso: Medicina

Introdução: As demências a partir dos 60 anos de idade aumentam exponencialmente a cada 5,1 anos, Após os 64 anos de idade a prevalência é de 5 a 10%, e a incidência anual é de 1 a 2%. Após os 75 anos de idade aumentam de 15 a 20% e 2 a 4%, respectivamente (MACHADO, 2002; FREITAS et al, 2002). Estima-se que 10% dos idosos com 65 anos ou mais e 50% com mais de 90 anos apresenta demência. No Brasil a prevalência é de 7,1% da população de idosos. (MARTINS et al, 2009). Objetivo: Rastrear a presença de sintomas de distúrbios neurocognitivos em pacientes idosos atendidos na atenção primária. Métodos: Foi utilizado o questionário MEEM de rastreamento de demência que é utilizado para a avaliação cognitiva e diagnóstico diferencial de demências. (LOPES, 2006). Resultados: Foram avaliados 50 idosos através do MEEM em oficinas realizadas na unidade de saúde e na comunidade, sendo que são 216 idosos cadastrados na UBS e 118 na área 037. Dos 29 idosos apresentaram o escore do MEEM baixos resultados (50). Foi observado que os idosos alfabetizados 25(50%) apresentaram alterações e 18(36%) não tiveram alterações neurocognitivas os idosos analfabetos 4(8%) apresentaram alterações e 3(6%) não obtiveram alterações. Conclusão: Cerca de 70% dos idosos avaliados obtiveram

alterações no MEEM, o que demonstrou a importância desse trabalho de intervenção social na comunidade.

SISTEMA DE FIXAÇÃO INTERNA RÍGIDA EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

JÚNIOR, Marcelo Mesquita Martins; SILVEIRA, Luíza Carneiro; AMORIM, Adalberto Paulo Varella; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; FERRAZ, Rodolfo Adriano Rocha

Curso: odontologia

Email: marcelomartins602@gmail.com

Resumo: Atualmente, os materiais mais utilizados para fixação de fraturas na área de Cirurgia Buco Maxilo Facial, são os sistemas de placas e parafusos confeccionados em ligas metálicas. É extremamente importante ter embasamento científico, conhecimento do profissional e a técnica cirúrgica a ser utilizada para a estabilização das fraturas em face. Tais sistemas, são fabricados em diferentes plataformas e tamanhos que aplicados de forma segura e correta, irão promover a fixação, contenção e estabilização das fraturas. O objetivo deste trabalho é apresentar os tipos de sistemas de fixação interna rígida e suas principais indicações.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EXTRA BUCAIS

LEÓDIDO, Victor Machado*; SILVA, Maressa Keila de Souza; BRAGA, Vinicius Guilherme Leitão Santos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; FRANCISCO, José Lima Maciel

Curso: Odontologia

Email: victorleodido@live.com

O nervo trigêmeo desempenha funções como inervação sensorial dos dentes, dos ossos e dos tecidos moles da cavidade oral. Este nervo é constituído por uma raiz motora (supre músculos mastigatórios, milo- hiódeo, ventre anterior do digástrico, tensor do tímpano e tensor do véu palatino), e por sua raiz sensorial (V1 divisão oftálmica, V2 divisão maxilar e V3 divisão mandibular.) O objetivo deste trabalho é apresentar uma mesa demonstrativa sobre técnicas anestésicas extra bucais. Elas são menos utilizadas na odontologia que as intra bucais porem são de suma importância, pois a sua utilização é necessária quando se há a impossibilidade de se fazer a técnicas anestésicas intra bucais, quer seja por trismo, inflamação, pequenas cirurgias estéticas, tecidos traumatizados ou pacientes pediátricos e não cooperativos. Dentre elas temos a anestesia do nervo supra orbitário, infra orbitário, nasopalatino, masseterino, nervo alveolar inferior, nervo mentoniano, nervo maxilar, nervo mandibular.

SISTEMA DIGITAL DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA

GARCEZ, Marcos Vinicius Maciel*; MELO, Natália Costa Oliveira; ARAÚJO, Raphael Kennedy Everton; SILVA, Natyla Maysa de Lima; DA SILVA, Marcos André dos Santos;
Email: nataliamelo.95@hotmail.com

Curso: Odontologia

Imagem digital é a decomposição da imagem convencional em uma matriz de pontos de imagem, transformada em uma função numérica – os dígitos binários (binary digit) – e traduzida em imagens pelo computador. Dentre os tipos de sensores direto está o sensor digital de estado sólido que recebe os fótons de raio-x e transmitem a informação para o computador, apresentando-se em diferentes modelos como CCD (charge coupled device, ou dispositivo de carga acoplada); CMOS (complementary metal oxide semiconductor, ou semicondutores de óxido de metal complementares), podendo esses serem a cabo, ou com sistemas sem fio (wireless). Outro tipo são os chamados sistemas indiretos com placas de fósforo fotoestimuláveis (PSP) que são sensores sem cabo, formados por placas revestidas com sais de fósforo compostos por flúor haleto de bário. Alguns recursos de imagem podem ser obtidos como, por exemplo: realce da imagem, filtros de nitidez e suavização, inversão de contrastes, pseudocolorização, cor âmbar, alto e baixo relevo entre outros. Apresentam como vantagens a redução da dose de exposição, realce da imagem, otimização do tempo de trabalho, eliminação de químicos no processamento entre outros. E como desvantagens, auto custo, fragilidade dos sensores, espessura do sensor e presença do cabo e adaptação do profissional à esse novo sistema. O objetivo do trabalho é apresentar, através de mesa demonstrativa a importância e benefícios do sistema digital de imagem em odontologia.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EXTRA-ORAIS

SOUSA, Maysa Kelly de Oliveira*; RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte; RODRIGUES, Natália Aguiar; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: maysasousa27@hotmail.com

O sucesso e a segurança do bloqueio anestésico local estão relacionados com a escolha e a execução correta da técnica anestésica. Várias são as técnicas anestésicas existentes para obtenção do bloqueio dos impulsos dolorosos das regiões da maxila e da mandíbula. A escolha de uma delas depende da região que se deseja anestésicar e do procedimento a ser realizado. Tendo em vista certas situações clínicas, onde são grandes as dificuldades para o uso das técnicas anestésicas intra-buciais na prática da cirurgia maxilo-facial, muitas vezes, torna-se aconselhável o emprego das anestésias por bloqueio de ramos nervosos, com acessos extra-buciais. As técnicas extra orais são de grande valia nos casos em que pacientes encontram-se

temporariamente impossibilitados de abrir a boca, como nos casos de trismo, constrictões maxilares, assim como nas complicações inflamatórias dos terceiros molares. Neste sentido, o presente trabalho visou esclarecer e demonstrar a execução das técnicas anestésicas extra-buciais em face, bem como transmitir conhecimentos anatômicos necessários para aplicação correta das mesmas.

PAINEL CASO CLÍNICO – GRADUAÇÃO

A CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO TERAPÊUTICO “RESGATANDO SONHOS” NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.

LEITE, Stênio Guilherme Ribeiro*; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Categoria: Graduação

Email: stenioguilherme29@gmail.com

A dependência química tem se tornado mais um evento relativo na nossa sociedade contemporânea, tendo em vista que o uso de substâncias ilícitas vem crescendo incontrolavelmente nos bairros e periferias de grandes cidades brasileiras, por consequência, atraindo como público-alvo: adolescentes e adultos. O objetivo deste estudo foi identificar a colaboração do grupo terapêutico: “Resgatando Sonhos” no tratamento de dependentes químicos no município de São José de Ribamar, Maranhão. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, tendo como procedimento técnico um estudo de caso. Para a coleta dos dados, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com um dependente químico, paciente do Centro de Atenção Psicossocial do referido município, sendo aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma, com a numeração 48475415.2.0000.5084. A pesquisa possibilitou uma

maior compreensão sobre a dependência química e suas nuances. Visto que a temática pesquisada reflete no âmbito contemporâneo, um dualismo cultural e político nos cidadãos, cujas opiniões permanecem divergentes sobre o assunto, ocasionando visões sistêmicas por um público mais experiente na área e visões difamatórias por um público mais hostil, enquanto o usuário químico permanece debilitado e impotente diante das situações apresentadas na sociedade quanto a sua patologia.

A LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DE COMPLICAÇÕES DE EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES - RELATO DE CASO

FERREIRA, Odalace Chaves*; PINHEIRO, Amanda Ferreira de Sousa; FERREIRA, Winnie Dandara Rocha; FURTADO, Guilherme Silva; LAGO, Andréa Dias Neves.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: odalace@gmail.com <mailto:melina-luna@hotmail.com>

A exodontia de terceiros molares apresenta indicações características e é importante tomar alguns cuidados para evitar possíveis complicações pós-operatórias, dentre elas a dor, edema, trismo e a parestesia. Uma opção de tratamento que auxilia na melhora destas complicações é a laserterapia. Paciente do gênero masculino, 28 anos, procurou o projeto de extensão “Laserterapia na Odontologia” da UFMA 6 dias após a exodontia dos dentes 18, 28 e 48 com queixa de edema, redução de abertura bucal, mucosa da região do túber e trígono retromolar com aspecto esbranquiçado, com equimoses no palato e falta de sensibilidade do lado direito da língua. Após a anamnese e o exame clínico constatou-se a presença de trismo, formação de tecido de granulação no palato e equimoses provenientes da fratura do túber e parestesia lingual. Utilizou-se então o laser de diodo de baixa potência para a redução do edema e trismo seguindo o protocolo: 808 nm, 100 mW, 4 J de energia por ponto, por 40 segundos. Foram irradiados 8 pontos extra-orais e 2 intra-bucais para diminuição do trismo e 2 pontos intra-bucais para a cicatrização com comprimento de onda 660 nm. Foram realizadas 10 sessões. Foi possível constatar que houve redução do edema e melhora na abertura bucal de 15 mm a 40 mm, além do restabelecimento sensitivo do lado direito da língua. Pode-se concluir que a laserterapia nos parâmetros utilizados foi eficaz no tratamento do trismo, parestesia, na redução do edema e na cicatrização pós-operatória.

ACOMPANHAMENTO POR 3 ANOS PÓS-TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE LESÃO PERIAPICAL CRÔNICA E CIMENTO EXTRAVASADO: RELATO DE CASO

JUNIOR, Wlisses Furtado Muniz*; DOS SANTOS, Rianna Marques; CASANOVA, Rayanne Ribeiro; ROSENDO, Joyce Karolyne dos Santos; FILHO, Etevaldo Matos Maia; RIZZI, Claudia de Castro; MARQUES, Tércia Virgina Falcão

Categoria: GRADUAÇÃO

Email: wlissesmuniz@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A periodontite apical crônica (PAC) é uma doença de característica inflamatória, cuja origem está relacionada, em sua maioria, com a ação microbiana e a resposta imunológica do hospedeiro, influenciada por uma reação aos microrganismos, seus produtos e subprodutos presentes no canal radicular. O objetivo deste trabalho é discorrer sobre um caso clínico de um paciente que compareceu a clínica de Endodontia da Universidade Ceuma queixando-se de um escurecimento no dente 22. No exame clínico o dente apresentava-se assintomático. No teste de sensibilidade pulpar a resposta foi negativa e radiograficamente observava-se rarefação óssea difusa. O diagnóstico foi de PAC e o tratamento realizado em única sessão. No momento da obturação ocorreu o extravasamento de cimento (AH Plus – Dentsply-Maillefer) para a região periapical, possivelmente devido a pressão exercida durante a condensação vertical. O acompanhamento pós-tratamento foi realizado anualmente, por um período de três anos observando-se a reabsorção parcial do cimento endodôntico e a regressão da lesão, o que fornece indícios de sucesso do tratamento endodôntico realizado.

AIDS E A PSICOSSOMÁTICA: O MAL... ESTÁ NA CIVILIZAÇÃO.

MANDU, Ana Carolina; ARAÚJO, Carla Matos de; PEREIRA, Débora Layanne; MONTEIRO, Ana Guaracy; BRAGA, Mariana Amélia; LIMA, Ana Beatriz Rocha;

Curso: psicologia

Categoria : graduação

Email: cacau.fortes@hotmail.com

Resumo : O presente artigo propõe dissertar sobre a Síndrome de Imunodeficiência Humana (HIV/AIDS), destacando sua expressão no universo psicossomático, no tocante ao momento histórico-social em que este cenário nos permite um aprofundamento em relação às diferentes formas de experiências vividas e vivenciadas pelos portadores do vírus. Realizar-se-á uma retrospectiva do desenvolvimento histórico da psicossomática e do HIV/ AIDS. Será realizada uma discussão sobre o grupo de risco, reações psicossomáticas e sobre o processo de intervenção. Ao final destacaremos alguns indicadores que permitem o perfil do paciente no processo de adoecimento. Com isso será possível compreender o HIV/AIDS como uma metáfora do momento humano, ela ultrapassa o âmbito orgânico de uma enfermidade infecciosa para se

inserir no imaginário individual e coletivo. Palavras-chave: Psicossomática, AIDS, Reações psicossomáticas.

ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL: NUTRIÇÃO E CÂNCER

JARDIM, Ana Tamires*; SILVA, Ane Caroline Silva; DE SOUSA, Rosangela Maria Lopes; NASCIMENTO, Joelma Ximenes Prado Teixeira

Curso: Nutrição

Categoria: Graduação

Email: a-tamires@hotmail.com

Introdução: A nutrição desempenha um papel importante no tratamento quimioterápico, desde o diagnóstico, durante o curso da doença e fundamental para recuperação do indivíduo. Relato de caso: Foi realizado uma ação de educação nutricional, em uma casa de apoio à pacientes com câncer em São Luís MA. Através da realização de uma palestra sobre alimentação saudável para pacientes oncológicos e realização de oficina de receitas funcionais. Durante a palestra foi abordado temas relacionados à alimentação saudável, a importância da alimentação para o sucesso do tratamento quimioterápico, as interações do câncer com estado nutricional, o controle higiênico sanitário no preparo e consumo dos alimentos, mitos e verdades acerca da interação câncer versus alimentação. Considerações finais: O encontro permitiu uma aproximação maior de pacientes e familiares com o profissional nutricionista em um ambiente descontraído, diferente do ambiente hospitalar, onde muitos se sentem desconfortáveis. Os residentes e seus acompanhantes foram receptivos com a abordagem nutricional, se envolvendo em todo o processo do encontro, participativos durante a palestra e no preparo das receitas. A educação nutricional contribuiu substancialmente no enfrentamento da doença, impactando em melhora do estado nutricional e por consequente melhor prognóstico e qualidade de vida.

ALVEÓLISE EM INCISIVOS E MOLARES DECÍDUOS: RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

FERRO, Amanda Costa*; VIEIRA, Clarissa Lopes; PASCHOAL, Marco Aurelio Benini; CARNEIRO, Lucas Almeida; MARQUES, Tarcia Virginia Falcão; RIZZI, Claudia de Castro; LEAL, Adriana Mara Araujo.

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: a.ferro1604@gmail.com

Alveólise é uma patologia que acomete elementos dentários decíduos anteriores ou posteriores e que clinicamente se apresenta com reabsorção da tábua óssea vestibular, e

consequentemente, exposição das raízes dentárias na cavidade oral. Sua etiologia não está totalmente elucidada, no entanto, acredita-se que há relação entre esta alteração e infecções crônicas locais e/ou traumatismos dentários. Esse estudo tem por objetivo discorrer dois casos clínicos realizados na Clínica de Odontopediatria da Universidade Ceuma, no qual os pacientes relataram dor na região dos dentes 85 e 61 e após serem submetidos ao exame clínico, foi constatado a presença de alveólise. O tratamento de escolha foi a remoção cirúrgica dos elementos comprometidos e acompanhamento clínico e radiográfico dos casos. Portanto, fica claro, a importância do conhecimento de sinais e sintomas associados a esta patologia e a conduta cirúrgica emergencial a ser tomada, assim, garantindo a integridade do elemento dental permanente e dos tecidos adjacentes.

ANÁLISE CLÍNICA E RADIOGRÁFICA NO TRATAMENTO DE LESÃO ENDOPERIODONTAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

RODRIGUES, Natália Aguiar*; MOUCHREK JUNIOR, José Carlos Elias; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro; MARQUES, Tércia Virgínia Falcão;

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: nataliaaguiarrodrigues@hotmail.com

O periodonto e a polpa possuem em comum sua origem embrionária no ectomesênquima. Apesar de serem duas estruturas anatômicas distintas, apresentam-se inter-relacionadas funcionalmente através dos canais laterais, canais acessórios, túbulos dentinários e forame apical. As lesões originadas de produtos inflamatórios são encontradas em vários níveis em ambos. Essas lesões podem se originar devido a uma infecção pulpar ou periodontal, e são classificadas em lesões endoperiodontais (LEP). O trabalho consiste no relato de caso, paciente do sexo masculino, melanoderma, quarenta e três anos de idade, encaminhado para atendimento odontológico periodontal com presença de mobilidade grau II nos dentes 31 e 15, e presença de trauma dentário. O tratamento consistiu na realização de contenções semirrígidas, ajuste oclusal, raspagem periodontal, medicação sistêmica e tratamento endodôntico coadjuvante. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo descrever um relato de caso, mostrando a inter-relação entre as doenças periodontal e endodôntica e a associação da conduta dos dois tratamentos no reparo das lesões endoperiodontais.

ASPECTOS PATOLÓGICOS DA SÍNDROME DE GOODPASTURE

FERREIRA, Juliana Abenante Fernandes*; FALCAI, Angela*

Curso: Biomedicina

Categoria: Graduação

Email: julianaabenante11@gmail.com

A síndrome de Goodpasture é uma patologia rara, a qual ocorre quando anticorpos iniciam processo inflamatório na membrana basal dos glomérulos renais e alvéolos pulmonares, levando a hemoptise, sintomas respiratórios, glomerulonefrite, evoluindo rapidamente para insuficiência renal progressiva, este trabalho objetiva alertar a população sobre a síndrome de Goodpasture, por ser grave e rapidamente progredir para óbito, além de ressaltar que mesmo sem cura existem tratamentos alternativos para portadores da doença a fim de aliviar os sintomas. Desenvolvimento: Cerca de 89% dos afetados com a imunopatologia são fumantes ativos, por volta dos 20 anos na maioria dos casos, e apresenta em comparação a outras patologias autoimunes a incidência em pessoas do sexo masculino. O principal fator que inicia os anticorpos ainda é desconhecido, porém suspeita-se de exposição a hidrocarbonetos, agressões ambientais como infecções virais serem os principais motivos para aparecimento da doença. O diagnóstico ocorre pela análise microscópica de sedimentos de biópsia do rins, identificando a presença de anticorpos característicos da síndrome. Conclusão: O tratamento alternativo consiste no uso da plasmaférese intensiva, levando a remoção de anticorpos, filtrando o plasma por via extracorpórea, esta técnica proporciona evolução do quadro clínico e bem-estar geral do paciente, aliviando os sintomas tanto hemorrágicos pulmonares quanto a glomerulonefrite, reduzindo cerca de 90% da motilidade em portadores da síndrome de Goodpasture.

ATUAÇÃO FONOUADILÓGICA EM GAGUEIRA: ESTUDO DE CASO

DE OLIVEIRA, Milena Vieira*; COUTINHO, Patricia Trinta e Farias;

Curso: FONOAUDILOGIA

Categoria: Graduação

Email: millenavieiradeoliveira@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A gagueira é uma alteração na fala que afeta a fluência e a comunicação, caracterizado por distúrbios no ritmo da fala, frequência de fala alterada, presença de prolongamentos, repetições e posições articulatórias rígidas, esforço motor e medo de falar. Existem diversos tratamentos disponíveis contra a gagueira. O tratamento deverá ser compatível com a idade da pessoa e com as necessidades de comunicação específicos de cada um, especialmente se a pessoa for adulta. **OBJETIVO:** Relatar caso clínico de um indivíduo com gagueira submetido a tratamento fonoaudiológico. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Paciente, 34 anos, sexo masculino, apresentou como queixa principal gagueira durante a fala. O paciente foi submetida a 30 sessões fonoaudiológicas, 2 vezes por semana durante 50 minutos com o

objetivo de aprimorar a fluência durante fonação. Inicialmente foram realizados exercícios de relaxamento como: massagens com massageador elétrico e rotação de cabeça e ombros a fim de reduzir tensões cervicais. Para coordenar a respiração, foi instalada respiração do tipo costodiafragmática, com emissão de fricativos. Exercícios articulatórios. Para aprimorar a fluência, foram propostas estratégias de leitura como: lentificação da leitura, prolongamento de vogais, leitura com sobrearticulação, com ruído e com a utilização do metrônomo. RESULTADOS: As tensões cervicais foram reduzidas e, gradativamente, houve coordenação da respiração. Ocorreu melhora articulação, com a paciente produzindo mais claramente os fonemas. A fluência foi aprimorada com os exercícios, havendo redução dos episódios de gagueira. CONCLUSÃO: É de suma importância o tratamento fonoaudiológico a fim de otimizar a fluência durante a fonação e garantir qualidade de vida ao indivíduo.

AUMENTO DE COROA "FLAPLESS" UTILIZANDO LASER DE ALTA POTÊNCIA E PIEZOCIRÚRGICO

NASCIMENTO, Caroline Martins*; AHID, Vinícius Pires; ARAUJO, Maydson Marques Meneses; SOUZA, Amanda Márcia Maia; SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira; AHID, Fernando Jorge Mendes

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: carolmartins@hotmail.com.br

Sabe-se que, atualmente, a literatura sugere que o laser pode ser utilizado de diversas formas. Isto abrange as cirurgias periodontais de tecido mole como gengivectomias, gengivoplastias, frenotomias, “curetagem subgengival a laser” e também, na redução bacteriana, como coadjuvante no tratamento das periodontites e periimplantites. Algumas das vantagens da utilização do laser são: aparelho portátil, promoção de hemostasia tecidual, redução do tempo operatório, menor formação de cicatriz e redução bacteriana. Sabe-se então que o laser de alta intensidade é indicado para utilização em alguns procedimentos periodontais, atuando com segurança, rapidez e garantindo uma melhora no tempo de reparo tecidual. O caso clínico trata de paciente do sexo masculino, 24 anos, que queixava-se da estética de seu sorriso. Fotografou-se o caso intra e extra-oral, para que pudesse ser feito o planejamento. Concluiu-se que o paciente necessitava de aumento da dimensão vertical, pois era portador de amelogenese imperfeita e seus dentes encontravam-se altamente desgastados. Como coadjuvante ao tratamento estético proposto com laminados cerâmicos metal free, foi realizada cirurgia periodontal de plastia gengival acompanhada de aumento de coroa clínica, utilizando laser de alta potencia e ultrassom para desgaste ósseo e restabelecimento do espaço biológico com a técnica “Flapless”. Aguardou-se 30 dias após a cirurgia, e notou-se que a cicatrização era efetiva.

Então seguiu-se com a reabilitação funcional e estética proposta ao paciente. Pode-se então concluir que o laser é uma excelente alternativa nos tratamentos periodontais, auxiliando ainda na redução do tempo de tratamento quando se pretende lançar mão de procedimentos de outras especialidades odontológicas.

AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM INFANTIL

DE GALIZA, Sarah Teixeira*; SILVA, Mabile Francine Ferreira

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: sarah_stg@outlook.com

INTRODUÇÃO: O mundo da escrita para as crianças é muito complexo, pois se apresenta de modo mais objetivo e requer muita atenção ao elaborar um pensamento e expressar sob um papel, sendo necessário atender as normas gramaticais. **RELATO DO CASO:** A partir dessas informações foi proposta a gravação de um vídeo com uma criança de 6 a 8 anos para avaliar a linguagem escrita, levando em consideração como ela escreve e desenha. O participante foi uma criança de 8 anos, estudante do 3º ano do Ensino Fundamental que após ser solicitado pelo avaliador, redigiu sobre o tema: “Como foram suas férias?”. Neste momento não houve interferência do terapeuta, deixando o entrevistado à vontade para expor seus pensamentos. Durante a execução do trabalho, foi observado que o entrevistado apresentou dúvidas já previstas dentro do contexto, como por exemplo, a procura pela grafia correta de algumas palavras, ao tentar associar a escrita com a pronúncia. Mas o principal objetivo não era identificar se o participante escrevia sem erros, e sim como ele construía suas ideias a partir de um tema proposto. Apesar da falta de conectivos na construção textual, a ideia foi repassada de maneira inteligível aos leitores. **CONCLUSÃO:** Infere-se, portanto, a importância de deixar a criança redigir o texto do jeito que ela souber e criar situações desafiadoras para que ela possa solucioná-las.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

SILVA, Angelica Gomes*; LEITE, Tiago Gomes; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; SAUAIA, Bismark; GOMES, Emmanuel De Carvalho; ALMEIDA, Fabiano De Jesus Furtado.

Categoria: Graduação

Modalidade: PCC

Email: maninhogomes13@hotmail.com

Curso: Educação Física

Introdução: Nas últimas décadas observou-se as mudanças de comportamento da sociedade, sobretudo diante da mecanização do trabalho e o estilo de vida das populações que apresentam uma crescente diminuição da prática de atividade física. A academia oportuniza ao aluno, especialmente de educação física uma posição de destaque na sociedade, a partir da obtenção de conhecimento sobre hábitos saudáveis em seu cotidiano e durante a sua formação, contemplados por disciplinas curriculares que preconizam conceitos de educação, promoção em saúde e importância da manutenção de um estado fisicamente ativo e saudável. A condição sedentária e das doenças crônicas degenerativas, com maior predisposição em populações de índices baixos na prática de atividade física, fato que justifica a presente pesquisa. **Objetivo:** O estudo objetivou avaliar o nível de atividade física de acadêmicos de educação física em uma Universidade particular. **Metodologia:** Para avaliação da atividade física foi utilizado o questionário (IPAQ) versão curta. O estudo foi do tipo descritivo, analítico, prospectivo e transversal. Para verificar a normalidade dos dados foi efetuado o teste de Shapiro-Wilk. O Teste Qui-Quadrado foi aplicado para comparar as frequências semanal e o nível de atividade física entre os gêneros, o teste de correlação de Spearman para analisar a relação entre idade e o tempo de descanso durante a semana e no final de semana. Quanto ao tempo de atividade física, descanso e quantidade de sessões foram utilizados o teste de T de Student. **Resultados:** Na amostra estudada (n = 180) prevaleceram indivíduos do sexo masculino (n = 120; 66,67%). O sexo feminino apresentou (n = 60; 33,33%). Os resultados também demonstraram que quanto ao nível de atividade física, prevaleceram acadêmicos ativos e muito ativos em ambos os sexos, sem diferença matemática significativa. **Conclusões:** A atividade física é condição importante na prevenção das doenças crônicas e degenerativas e deve obedecer a uma prática regular, em todas as idades e gêneros, para garantir um estado de vida saudável em particular ao estudante de educação física, menor custo individual e social ao Sistema Público de Saúde.

AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DO PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA

DE OLIVEIRA, Millena Vieira*; SILVA, Mabile Francine F.

Curso: Fonoaudiologia

Categoria: Graduação

Email: millenavieiradeoliveira@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As fissuras labiopalatinas são uma das malformações mais comuns no ser humano. O indivíduo portador de fissura labiopalatina pode apresentar alterações nas áreas de fala, voz, linguagem e fluência. Diante desses fatores, a pesquisa tem por OBJETIVO descrever condutas fonoaudiológicas necessárias para avaliar aspectos vocais e de motricidade orofacial

do paciente portador de fissura labiopalatina. MÉTODO: análise teórica das condutas fonoaudiológicas na avaliação de pacientes com fissura labiopalatina. RESULTADOS: É primordial levar em conta, na avaliação, se as cirurgias reparadoras foram realizadas antes ou depois do desenvolvimento da fala. Quando ocorrem antes desta aquisição, a criança tem maior chance de adquirir pressão intra-oral, equilíbrio de ressonância e articulação das consoantes. Já na cirurgia ocorrida depois da aquisição da linguagem, a criança terá mais chance de ter uma fala mais nasalizada e com compensações. Na avaliação da fala é analisada a coordenação e praxia de fala, realizada com repetição de sílabas isoladas. Os distúrbios articulatorios decorrentes dos defeitos anatômicos são: fraca pressão em fonemas plosivos e fricativos, o escape de ar nasal durante a produção de fonemas orais e hipernasalidade. CONCLUSÃO: foi possível observar que apesar da literatura relativa ao tema ser ampla, esses aspectos merecem maior aprofundamento. Através deste estudo, percebe-se a importância de o fonoaudiólogo compreender o que a malformação acomete no indivíduo e o que pode ser trabalhado em sua terapia, para que ela seja a mais eficiente possível.

CÁRIE OCULTA: DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO – RELATO DE CASO CLÍNICO

NONATO, Rammon de Faria Nonato; BEZERRA, Tacíria Machado; DIAS, Laercio Santos

Curso: odontologia

Categoria : graduação

Email: rammon_faria@hotmail.com

Resumo : Cárie Oculta: Diagnóstico e Alternativa para Tratamento – Relato de Caso Clínico Rammon de Faria Nonato Laercio Santos Dias Tacíria Machado Bezerra O restabelecimento da forma, função e estética dental é um grande desafio na odontopediatria. A réplica oclusal é uma técnica que viabiliza a reconstrução anatômica e funcional, sendo indicada em casos de cárie oculta. Este trabalho teve o objetivo de relatar um caso clínico de diagnóstico de cárie oculta com recuperação da anatomia dentária por meio da técnica da réplica oclusal. Criança de 8 anos, do sexo masculino, após exame clínico visual associado à técnica de transluminação, foi diagnosticada cárie oculta no elemento dentário 36 e confirmada radiograficamente. Diante do caso optou-se pela técnica da réplica oclusal para restauração do elemento pelo excelente acabamento e reprodução anatômica final. Após a seleção de cor, foi feita a cópia da superfície oclusal do dente 36 (index oclusal) com resina acrílica incolor. Procedeu-se com a remoção de cárie e em consulta posterior foi executada a restauração em resina composta, sendo aplicado sob o último incremento o index oclusal, seguido de fotoativação. Por meio desta técnica foi obtida excelente recuperação da anatomia dentária, não havendo necessidade de acabamento.

Concluiu-se que a réplica oclusal apresenta-se como uma técnica útil em casos de restauração de cárie oculta, podendo ser bem indicada perante os seus bons resultados estéticos e funcionais. Palavras-chave: Dentistas. Estética dentária. Ortodontia. Sorriso.

CLAREAMENTO EM DENTES VITAIS: RELATO DE CASO CLÍNICO AFERIDO COM MÉTODO ÓPTICO

BELCHIOR, Lucas Contente*; DINIZ, Ana Carolina Soares; KUSSANO, Sandro Carvalho; LIMA, Suellen Nogueira Linares; BANDÉCA, Matheus Coelho; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: lucascbelchior@hotmail.com

Dentes mais claros traduzem algo positivo e em especial representam saúde, vitalidade e jovialidade, razões pelas quais o clareamento dental tem sido muito procurado atualmente. O clareamento realizado no consultório possibilita resultados mais rápidos, devido à maior concentração dos peróxidos presentes no gel clareador. Deste modo, o objetivo deste estudo foi relatar o caso clínico de uma paciente de 19 anos, que desejava clarear seus dentes. O clareamento dental foi realizado em duas sessões com o gel de peróxido de hidrogênio 35%, sem fonte de luz ativadora. Foi confeccionada uma guia com silicona de condensação, a fim de auxiliar na aferição de cor com o espectrofotômetro Easyshade. As aferições de cor foram realizadas na baseline, antes da segunda sessão, 07 e 15 dias após a segunda sessão. A cor também foi aferida com a escala de cor Vita Classic. Foram observadas as seguintes alterações de cor: A2 para A1, da primeira para segunda sessão; e de A1 para B1 da segunda sessão para 7 dias após, permanecendo B1 15 dias após a segunda sessão. Quanto à aferição com o Easyshade, foi observado que a média da luminosidade de canino a canino superiores (L), passou de 85.46 para 87.7, da primeira para segunda sessão; de 87.7 para 88.60, da segunda sessão para 07 dias depois; e passados 15 dias da segunda sessão o L foi para 89.73. Nesta perspectiva, o tratamento clareador realizado demonstrou-se eficaz, além de apresentar resultados rápidos e de modo seguro.

CONDUTA TERAPÊUTICA EM DENTE COM INSTRUMENTO FRATURADO E LESÃO PERIAPICAL REFRAATÁRIA A TRATAMENTO ENDODÔNTICO: UM RELATO DE CASA

GUIDA, Thamires*; TEXEIRA, Ludmila Miranda Araujo; PAULO, Anderson de Oliveira; TORRES, Henrique Ruella; PAULO, Anderson de Oliveira; TORRES, Henrique Ruella

Email: tham_guida@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

O sucesso do tratamento endodôntico depende de inúmeros fatores, requer que todos os passos sejam realizados com esmero, desde o diagnóstico e seleção do caso até as etapas operatórias. Esse sucesso, é determinado após alguns anos de sua realização, e apesar das taxas de insucesso terem atualmente um percentual, a maior causa de insucesso de tratamento é a iatrogenia. frente ao fracasso do tratamento endodôntico, devido a infecção bacteriana, obturação inadequada, falha e dificuldades na técnica, desde que haja condições viáveis, deve-se sempre indicar o retratamento do canal radicular. Esse tipo de tratamento tem por finalidade a remoção completa do material obturador, facilitando a limpeza e a modelagem do sistema de canais radiculares. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico sobre retratamento endodôntico de dente com lima fraturada, onde constava uma lesão periapical. O caso em análise é de um paciente do gênero masculino, idade 37(trinta e sete) anos, que se apresentou na Clínica Odontológica da Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT, relatando que havia procurado um Dentista particular para trocar a restauração quebrada do dente. Na ocasião, o Dentista que lhe atendeu, através do exame radiográfico, observou que no dente já tinha sido tratado endodonticamente, porém, estava insatisfatório, havendo necessidade de realizar retratamento endodôntico. Após a execução da terapia de escolha e preservação e acompanhamento posterior, concluiu-se que o resultado foi satisfatório para o paciente, caracterizando sucesso no tratamento realizado.

CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL PELA TÉCNICA CIRÚRGICA DE RECONTORNO GENGIVAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

RIBEIRO, Kessiane Silva *; LIMA, Thays Pontes; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; HELENA Livia; NUNES, Araujo Castro

Curso: Odontologia

Email: khessyanne@hotmail.com

A estética gengival é tão importante quanto a estética dental para o sorriso, que depende de uma harmonia entre os dentes, a gengiva e os lábios. O sorriso gengival pode variar de pessoa para pessoa de acordo com fatores genéticos, esqueléticos, inflamações gengivais ou alguns tipos de medicamentos, podendo interferir de maneira direta no sorriso ideal. O contorno gengival pode modificar o tamanho aparente das coroas afetando também a simetria do sorriso. A correção do sorriso gengival pode ser feita através de procedimentos cirúrgicos plásticos periodontais minimamente invasivos. O recontorno gengival é umas das técnicas cirúrgicas usadas para realizar esta correção, que consiste na remodelação do contorno e anatomia gengival corrigindo as imperfeições do sorriso. Diante disso a busca por um sorriso perfeito vem crescendo, fazendo com que as pessoas procurem o consultório odontológico muito mais por

motivos estéticos do que a promoção da saúde. Este trabalho objetiva através da apresentação de um caso clínico sobre uma cirurgia periodontal de recontorno gengival, descrever o passo a passo da técnica desde o pré-operatório, transoperatório até o pós-operatório.

DIAGNOSTICANDO CORRETAMENTE A MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL

SERAFIM, Mayara Farah Dallin*; BRAMANTE, Fausto Silva; GURGEL, Júlio de Araújo; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini; PINZAN-VERCELINO, Célia Regina Maio

Email: farahmayarad@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A mordida cruzada posterior caracteriza-se por uma deficiência no relacionamento vestibulolingual entre os dentes superiores e inferiores no sentido transversal. Esta má oclusão pode acometer o arco uni ou bilateralmente, sendo que a maior ocorrência é a de mordida cruzada posterior unilateral, a qual pode ser verdadeira ou funcional. Será verdadeira quando acometer realmente um único lado da arcada dentária, e funcional, quando for causada por uma interferência oclusal, tal classificação tem influência direta no protocolo de tratamento da mordida cruzada posterior unilateral, uma vez que, na má oclusão verdadeira, a correção é realizada de forma assimétrica, visando restabelecer a normalidade do lado envolvido. Enquanto que, na funcional, o tratamento deverá ser simétrico, corrigindo a mordida cruzada de topo bilateral. O propósito deste painel é o de apresentar um caso clínico que demonstra a necessidade de efetuar um preciso diagnóstico da mordida cruzada posterior unilateral, com o intuito de se estabelecer corretamente o protocolo de tratamento, a fim de se obter a correção transversal necessária do arco superior.

DIFICULDADES ARTICULATÓRIAS EM ADOLESCENTES PORTADORES DE APARELHO ORTODÔNTICO FIXO

MOREIRA, Maria De Nazaré Freitas*; DA SILVA, Mabile Francine Ferreira

Curso: Fonoaudiologia

Email: nazarefreitas02@hotmail.com

Introdução: A articulação dos músculos fonoarticulatórios coordenados promovem uma atividade motora complexa que envolve uma série de movimentos motores orais sequenciais para a produção dos fonemas, compreendendo uma relação equilibrada entre os aspectos funcionais, estruturais e morfológicos de todo sistema estomatognático. Sendo assim, o uso de qualquer aparato na região bucal, poderá causar, de alguma forma, alterações na articulação normal dos fonemas. O objetivo desse estudo foi descrever condutas fonoaudiológicas necessárias para avaliar as principais dificuldades articulatórias decorrentes do uso de aparelho

ortodôntico fixo. Métodos: Este estudo tratou de uma análise teórica das condutas fonoaudiológicas nas alterações articulatórias causadas pelo uso do aparelho ortodôntico fixo. Resultados: A avaliação clínica em motricidade orofacial deve desempenhar um papel crucial no processo de diagnóstico fonoaudiológico, já que possibilita o entendimento sobre as condições anatômicas e funcionais do sistema estomatognático. Permitindo, ainda, a promoção do raciocínio terapêutico e a definição de encaminhamentos necessários, além de fornecer dados em relação ao prognóstico do caso. Conclusão: O fonoaudiólogo poderá auxiliar na identificação e recuperação de alterações miofuncionais e de fala decorrentes do uso do aparelho ortodôntico fixo. Palavras-chave: Fonoaudiologia, Articulação Temporomandibular, Fonética, Ortodontia.

ETAPAS DA CONFEÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL RELATO DE CASO

BEZERRA, Ana Paula Gonçalves*; PAIXÃO, Vaguilene Ferreira Lopes; BORBA, Wendy; CARVALHO, Luenna; LIMA, Jayne; SOUSA, Luana Carneiro Diniz; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Email: aninhapaula_bezerra@hotmail.com

Apesar do número crescente de reabilitações orais com implantes osseointegrados, a confecção de uma Prótese Parcial Removível (PPR) tem por finalidade a reposição das unidades dentárias perdidas, incorporando-as ao sistema estomatognático, sem ferir o equilíbrio biomecânico, além do grande desafio, na atualidade, de aliar a função à estética. Para que a terapia com PPR tenha sucesso é necessário que exista conhecimento da técnica de confecção por parte do cirurgião dentista e do técnico em prótese dentária e que haja comunicação entre estes dois profissionais. Trata-se de um estudo tipo relato de caso, foi realizado a confecção de uma prótese parcial removível classe III modificação 3, seguindo todas as etapas do preparo bucal (nichos, retenções, planos guia) e recuperação da dimensão vertical. Obteve-se a reabilitação funcional e estética do paciente.

FESTIVAL DE MINI BASQUETE: INCLUSÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL

NASCIMENTO, Romulo Cristiano Alves*; COSTA, Monica Santos; MACIEIRA, Eduardo Araújo; PRAZERES, Jozimar

Curso: Educação Física

Email: ROMULOCRISTIANON@GMAIL.COM

No Festival de Minibasquete, é uma atividade pedagógico-educacional, pois incentiva o esporte sem caráter de competição, fizeram-se presentes 200 crianças divididas em vinte escolas, sendo sete públicas e treze particulares. O evento é uma oportunidade oferecida aos alunos do Curso de Educação Física. Para que eles vivenciem a realidade que será encontrada no trato

pedagógico do esporte escolar. E um momento lúdico para as crianças que participam, é uma manhã de lazer quando oferecemos integração e socialização para que elas tenham a noção de tempo e espaço do outro”. O Mini Basquetebol é jogado sob a forma de festivais, com regras adaptadas as crianças até 12 anos, onde as equipes se enfrentam, mas não há um vencedor, todos participam se necessidade de pontuação ou placar. Estes festivais foram criados a partir de um evento dos escoteiros chamado Jamborê, onde escoteiros de vários lugares se encontram e dividem suas barracas no acampamento. Num festival de Minibasquete, a metodologia é que: equipes se misturam, para que o clima de competição seja amenizado. Os jogos acirrados nesta fase podem trazer prejuízos no desenvolvimento global da criança, pois além do stress competitivo, há, em função da busca do título, uma preparação inadequada dos jogadores. Diante deste contexto o mini basquetebol se insere no esporte de inclusão onde o principal objetivo é a participação de todos.

FREIO LINGUAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

Matheus Felipe Veloso COUTINHO*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; NASCIMENTO, Heney Kayo Lima; COUTINHO, Anna Karoline Ramos; JUNIOR, Jurandir Burgos Ribeiro; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: matheuscoutinho60@hotmail.com

O Freio Lingual é considerado uma inserção fibromuscular localizado abaixo da língua e insere na parte posterior da gengiva inferior. Por razões ainda desconhecidas pode estar inserido e atuando de forma errada. Embora os pacientes possam conviver com essa anomalia, isso pode trazer sérios problemas de fonação, deglutição, além de bullying. Durante a cirurgia de remoção do freio, Frenectomia Lingual, alguns marcos anatômicos devem ser respeitados, como as artérias linguais, com o objetivo de evitar complicações no ato operatório. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico, elucidando a técnica cirúrgica afim de proporcionar um melhor tratamento.

FREQUÊNCIA CARDÍACA COMO PROGNÓSTICO DE SAÚDE EM PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO “MEDIDA CERTA – CEUMA”

GOMES, José Jorge Silva*; AMORIM, Hudson Santos; SANTOS, Ítalo Jadson Lima Moraes; MACHADO, Igor Luís Ferreira; SILVA, Francisco José Sousa; PESTANA, Ezequias Rodrigues.

Curso: Educação Física

Email: jjorgejesusmesalvou@hotmail.com

Uma baixa frequência cardíaca de repouso (FCrep) entre (60-80bpm) reflete uma boa condição de saúde, enquanto valores maiores desta variável estão associados a um pior prognóstico de saúde. O projeto “Medida Certa” visa oportunizar a prática esportiva aos discentes da instituição. Participaram do estudo oitenta e seis universitários de ambos os sexos (35 homens e 51 mulheres), representando 17 cursos nos 3 turnos e envolvidos em 4 modalidades esportivas: 1-Futsal (19), 2-Handebol (9), 3-Atletismo (33) e 4-Natação (25). Os motivos revelados pelos alunos foram o sedentarismo e a oportunidade de vivenciar e/ou aprimorar os fundamentos das modalidades oferecidas. Foram desenvolvidas atividades de conhecimentos das regras, fundamentos técnicos e táticos para prática dos esportes. Os alunos realizaram atividades 2 vezes por semana, durante 1 hora por sessão. Para tanto, foi estimado o peso e estatura através de uma balança antropométrica digital (welmy w300®), a FCrep foi estimada através de um monitor Cardíaco Polar. Para a análise dos dados foram utilizadas ANOVA e o post-hoc de Scheffé para comparação entre as médias e desvio padrão das modalidades. O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$. A amostra apresentou idade 23.4 ± 4.6 anos, peso 64.0 ± 11.2 e FCrep 78.5 ± 12.2 . Quando analisados por estratificação dos esportes 1, 2, 3, e 4, observamos médias: 85.5 ± 11.8 ; 75.5 ± 8.5 ; 74.0 ± 11.7 e 80.2 ± 12.0 , respectivamente. Observou-se normalidade da FCrep para 3 modalidades, além de caracterizar os participantes da modalidade atletismo com melhores parâmetros em relação ao handebol e natação e estatisticamente significativo em relação ao futsal $P=0,01$.

IMPORTÂNCIA DA RADIOGRAFIA NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE CANAIS EXTRAS

ABREU, Isabella Mayara Barbosa; MUNIZ, Dayane Nascimento; DUARTE, Karlinne Maria Martins; PINHEIRO, José Marcos de Matos

Curso: odontologia

Email: isabella_barbosaa@live.com

Resumo: Mesmo com limitações, as radiografias periapicais são esclarecedoras em certos acidentes anatômicos de raízes dentais, proporcionando o planejamento operatório e o tratamento correto. Apresenta-se um tratamento endodôntico que não respondia à sanificação e medicação intracanal, persistindo a sintomatologia dolorosa provocada e a fístula mucosa. Ao exame radiográfico, constatou-se a não acessibilidade de uma raiz adicional no canino infero esquerdo. Infere-se a necessidade de tomada radiográfica periapical com incidência oblíqua no momento do exame e ou da odontometria.

INTRUSÃO DE MOLAR COM MINI-IMPLANTE ORTODÔNTICO: RELATO DE CASO

CAMPELO, Ricardo Gabriel Calvet*; BRAMANTE, Fausto Silva; VERGANI, Eliane Cristina Carrera Eleres; GREGÓRIO, Rosyane de Souza; GURGEL, Júlio de Araújo; PINZAN-VERCELINO, Célia Regina Maio; FIALHO, Melissa Proença Nogueira;

Curso: Odontologia

Email:ricardo_cal_vet@hotmail.com

A extrusão de molares superiores devido a perda de um dente antagonista pode ocasionar alterações periodontais e interferências oclusais. Para restabelecer a oclusão ideal na região posterior e manter a saúde periodontal, em muitos casos torna-se necessário um tratamento interdisciplinar. Entre as alternativas para intrusão dos molares encontram-se a utilização dos mini-implantes. Relatos recentes têm demonstrado sua eficiência clínica em fornecer ancoragem suficiente para forças ortodônticas intrusivas. O caso clínico relata a correção da extrusão do primeiro molar superior utilizando-se uma técnica simples e direta, com o uso de mini-implantes, previamente ao tratamento reabilitador. A intrusão se deu em 5 meses de tratamento e o reestabelecimento do espaço vertical foi suficiente para adequada reabilitação protética.

LAVAGEM ARTROSCÓPICA DAS ATMS E VICOSSUPLEMENTAÇÃO COM HIALURONATO DE SÓDIO

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte; ABREU, Wagner Costa Seixas; COSTA, Fabio dos Santos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Email: marina.salomao25@hotmail.com <mailto:stenioguilherme29@gmail.com>

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma doença amplamente pesquisada na literatura, posto acomete grande parcela da população e é frequentemente associada a dor crônica e limitação funcional da articulação temporomandibular (ATM), resultando em diminuição da qualidade de vida para os pacientes. Devido à sua etiologia complexa alguns procedimentos cirúrgicos têm sido estudados na tentativa de melhorar os sintomas clínicos e restauração da função. Uma modalidade cirúrgica menos invasiva é a artroscopia da ATM, que tem por objetivo permitir um mais acurado diagnóstico clínico por meio visual, bem como lavagem intra articular e técnicas cirúrgicas intra articulares. Esta modalidade cirúrgica é uma alternativa quando o tratamento conservador não obtiver resposta satisfatória. Trata-se de um procedimento simples e minimamente invasivo, comumente usado para remover o infiltrado inflamatório que se associa a processos nociceptivos dentro do fluido sinovial. O procedimento pode ser associado a injeção de várias drogas, dentre elas o hialuronato de sódio (SH). Ainda há controvérsia na literatura sobre os benefícios do uso de intraarticulares injeções de ácido hialurônico no

tratamento da DTM, bem como no estabelecimento de um protocolo ideal e técnica para restaurar funcionar e promover o alívio da dor para os pacientes. Porém, a literatura mostra que injeções intraarticulares de ácido hialurônico (HA) são benéficos para melhoria da dor e/ou sintomas funcionais da DTM. Portanto, a associação de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas e injeções intra articulares de HA em ATM são de grande valia.

LENTE DE CONTATO: UMA ALTERNATIVA MINIMAMENTE INVASIVA EM REABILITAÇÃO ORAL

DE CARVALHO, Thaylla Sabino Nascimento*; SILVA, Antônia Cláudia Gonçalves; MELO, Natália Costa Oliveira; E MAIA, Mariana de Figueiredo

Curso: Odontologia

Email: thayllasabine_sabino@hotmail.com

A harmonia do sorriso mostra-se cada vez mais um fator essencial para busca do ideal estético. Em meio aos avanços tecnológicos na odontologia, surgem as lentes de contato dentárias, facetas ultrafinas em espessura e consideradas ótimas opções restauradoras. São altamente estéticas e de grande longevidade clínica e, quando aderidas à superfície dos dentes, lhes confere uma nova forma. A inovação neste produto se dá, entre outros fatores, por sua técnica possuir um menor desgaste dentário, podendo ser nulo em alguns casos, preservando, portanto, a integridade do dente. O presente trabalho tem como objetivo a apresentação de um caso clínico sobre as lentes de contato dentárias para a solução de problemas funcionais e estéticos, analisando a técnica e suas vantagens e desvantagens, planejamento e protocolo de atendimento.

LESÃO PERIRRADICULAR: RELATO DE CASO CLINICO ATENDIDO NO PROJETO DE URGÊNCIA.

QUEIROZ, Jefferson de Brito* ; ZAMIGNAM, Kalleney; DOS SANTOS, Rianna Marques; RODRIGUES, Thaís da Costa; FILHO, Etevaldo Matos Maia; MARQUES, Tércia Virginia Falcão; CORREA, Silvan

Email: jeffqueirozodonto@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

As lesões perirradiculares são comuns aparecerem no dia dia dos atendimento odontológicos, tão quanto como outros tipos de lesões que podem acometer a cavidade oral, na maioria das vezes essas lesões causam ao paciente dor e desconforto que ao sentir os sintomas procuram o tratamento odontológico, o objetivo do trabalho e mostra o relato de um caso clinico atendido no projeto de urgência na clinica de odontologia da universidade ceuma , onde foi feito ficha clinica, anamnese onde o paciente relatou sua queixa principal que foi de fortes dores no local, e na sua historia dental passada relatou trauma na regiação há mais ou menos 2 anos, exame

clínico observou-se uma mudança de cor no elemento 21 e o aumento na região de palato, radiográfico onde foi identificada uma lesão perirradicular extensa nos dentes 21 e 22 e um aumento no palato na região apical dos referidos dentes, ao fazer a abertura coronária houve drenagem via canal de secreção purulenta onde foi feita a drenagem, pre-instrumentação do canal e medicação intracanal.

MACROPLAQUETAS: RELATO DE CASO

DOS REIS, Alina Nascimento*; SAUAIA, Bismarck Ascar

Curso: Odontologia

Email: alinadosreis@gmail.com

Paciente do sexo feminino, 20 anos, com sinais de hematomas nos membros. Em exame de rotina para rastrear coagulopatia ficou definido um quadro de plaquetopenia na faixa de 30 a 40 mil, acompanhado da ausência de sangramento. A investigação parental possibilitou definir um quadro de herança genética em primeiro grau de macroplaquetas sem sinal hemorrágico.

MALFORMAÇÃO DE ARNOLD CHIARI: ESTUDO DE CASO

LIMA, Vanderson Antonio Moreno*; SILVA, Ana Lidia Mesquita; SERRA, Wandenice Virgulino; PRAZERES, Victtoria; PIMENTEL, Mara Izabel Carneiro; MARINHO, Mavi Lima

Email: wandersonantonio@hotmail.com

Área / Especialidade: Enfermagem

A malformação de Arnold Chiari é uma projeção do bulbo e do cerebelo que se estende através do forame occipital para dentro do canal medular cervical. Essa anomalia é rara acomete 01 em 10.000 a 15.000 pessoas predominantes no sexo masculino. O comprometimento das estruturas bulbares manifesta-se por disfagia, déficit motor, atrofia da língua, do esternocleidomastoideo piramidal, trapézio. Para diagnóstico o exame de escolha é a ressonância magnética. O tratamento é cirúrgico. O caso clínico da cliente I.M.S, 45 anos, feminino, solteira, parda, lavradora, analfabeta, evangélica, natural e residente Santo Antonio dos Lopes, MA com queixas de parestesia e parestesia em MSE e MIE, admitida em um Hospital de referência na cidade de São Luís-MA, no dia 19/08/16. Necessidades básicas afetada. Ingera água filtrada, 1,5litros/dia, praticava exercício físico (caminhada); reside com mãe e filho. Ao exame Físico: PA 120X80 mmhg, FR 17 irpm, TAX 37,6, FC 76bpm, peso 64kg, altura 1,62, estado geral estável. O caso apresentou quadro clínico compatível ao referido na literatura pesquisada sobre a Malformação de Arnold Chiari tipo I, de parestesia e parestesia. A literatura refere que a cirurgia não garante a resolução do problema. Por fim, compreende-se que essa malformação pode provocar alterações no modo de vida das pessoas portadoras. O processo de enfermagem é um

instrumento orientador das ações de cuidado que os enfermeiros devem manter no cotidiano da prática clínica para garantir aos pacientes ações de saúde seguras e eficazes e fomentar a pesquisa.

MELANOPLASTIA (PEELING GENGIVAL): RELATO DE CASO CLÍNICO

VASCONCELOS, Brenda Andrade*; MOUCHREK JUNIOR, José Carlos Elias;

Curso: Odontologia

Email: brendinhaandradevasconcelos@gmail.com

A melanoplastia, também conhecida por peeling ou clareamento gengival, é um procedimento cirúrgico estético que tem como finalidade a remoção de pigmentos escurecidos da gengiva, e consequentemente, irá uniformizar a cor da região. A pigmentação gengival é causada por uma deposição excessiva de melanina pelos melanócitos, principalmente na camada basal do epitélio, prejudicando muitas vezes a estética do sorriso. Relato de caso: Paciente M.V. S. R, 27 anos de idade, sexo masculino, melanoderma, procurou atendimento odontológico com queixa de manchas enegrecidas na gengiva. Ao exame clínico foi observada pigmentação gengival que compreendia toda a faixa de gengiva queratinizada na região vestibular do arco superior e inferior. O tratamento indicado foi a técnica da melanoplastia (peeling gengival), para a retirada das manchas e falhas de coloração, procedimento que envolve a raspagem ou remoção da camada pigmentada. Conclusão: A técnica proposta mostrou-se efetiva na remoção da pigmentação melânica, resultando em uma estética satisfatória para o paciente.

OS DESAFIOS NO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR

ALMEIDA, Jéssica Cardoso Sirlan*; DE OLIVEIRA, Alessandra Cardoso; MENDES, Roberto Guimarães

Curso: Psicologia

Email: sirlanzinha@hotmail.com

Este trabalho é resultado de uma experiência prática vivenciada no estágio profissional, vinculado a disciplina Processos de Prevenção e Promoção a Saúde, realizado em uma Escola Municipal de São Luís. As constantes visitas ao local de estágio e o contato com todos os sujeitos inseridos, possibilitou a identificação do fenômeno da violência era presente naquele contexto. Segundo a Cartilha de Violência nas Escolas produzida pela UNICEF (2002), para compreender o fenômeno da violência nas escolas, é necessário levar em conta que é um fenômeno com diversas facetas que devem ser percebidas para serem solucionadas, levando em consideração os indivíduos envolvidos, pois afeta a integridade física, emocional e psicológico. A partir do enfoque multidimensional optamos por criar uma rede de apoio, constituída por instituições

que faziam parte daquele território subjetivo. Foram elas: CRAS, CREAS, UBS (AMAR), CAPSI, DPCA Conselho Tutelar, Narcóticos Anônimos, Associação de moradores, Igreja e o PROERD. Inicialmente realizamos um mapeamento prévio e posteriormente o contato com as instituições que atenderiam a Escola com intervenções mensais e, por meio de um cronograma organizamos atividades e palestras que seriam efetivadas. Outro fator preponderante para o levantamento dessa discussão foi a falta de conhecimento no combate aos atos violentos. Vale ressaltar que os resultados dessa estratégia metodológica são de difícil mensuração, entretanto, alcançaram-se mudanças. Sendo assim, a intersetorialidade constituída através da rede de apoio, é uma possibilidade de intervenção eficaz de combate a violência, por meio de uma cobertura assistencial.

PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS NA NATAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSES

PEREIRA, Natanael Soares*; MENDONÇA, Gabriel de Almeida; NASCIMENTO, Romulo Cristiano Alves Sousa; RIBEIRO, Daniela Alves Flexa; ALMEIDA, Fabiano De Jesus Furtado.

Email: danielaflexa@hotmail.com

Curso: Educação Física

Os Jogos Escolares Maranhenses representam a máxima expressão do esporte no Estado, e, um número crescente de participantes, indica sua evolução exponencial. A natação, especialmente, desperta grande interesse. Contudo, o status socioeconômico tem relação direta com o acesso a locais e equipamentos adequados. Por outro lado, a motivação, o alcance de benefícios, a percepção de saúde e aptidão, o senso pessoal de competência e a integração social são resultados inerentes do esporte independente de qualquer situação de prática, o que vem contrapor-se a uma percepção de necessidade de condições ótimas para a sua prática. Assim, isso permite que venha se tornando progressivamente popular e acessível a qualquer esfera da sociedade, por conta de projetos sociais e esportivos inclusivos, cada vez mais frequentes. Isto percebe-se através de um aumento da participação de adolescentes oriundos de escolas públicas municipais e estaduais nos Jogos Escolares Maranhenses, obtendo performances significativas nas competições de natação. Foram analisados os resultados das 22 provas individuais da categoria infantil (12 a 14 anos), observando-se que 36% das medalhas de ouro disputadas em 2016, foram conquistadas por estudantes de escolas públicas. Até então, as instituições públicas somente tinham participações sem significativos resultados. Ao buscar-se entender essa mudança de perfil, conclui-se que o fomento a projetos sociais de práticas esportivas tem gerado resultados para além do seu objetivo primordial de transformação social.

O esporte cria novas perspectivas sociais, despertando para geração de um novo contexto de educação pelo esporte - um dos princípios fundamentais dos Jogos Escolares Maranhenses.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE PRATICANTES DO FUTSAL NO PROJETO MEDIDA CERTA DA UNIVERSIDADE CEUMA

MENDONÇA, Adailton Tinoco*; PRIVADO, Wellerson Pedro Sousa; GOMES, Ítalo Jadson Lima; SOUSA, Anaxímenes Albert Ferreira Melo; GOMES, José Jorge Silva; CUNHA, Márcio Luis Araujo; PESTANA, Ezequias Rodrigues.

Curso: Educação Física

Email: adailtonsntco@hotmail.com

O futsal faz parte da cultura brasileira e sua visibilidade tem chamado atenção para sua prática enquanto fenômeno social estabelecendo mudanças no comportamento de seus participantes. Assim futsal tem se apresentado como prática esportiva, qualidade de vida e como meio de socialização na comunidade acadêmica universitária, relatando um bom perfil nutricional dos alunos, pois não basta mostrar suas características e sim mostra-las e identificar como as mesmas podem ser direcionadas aos aspectos que geram o desenvolvimento. A pesquisa tem caráter descritivo exploratória de abordagem quantitativa, os dados coletados foram: massa corporal, IMC, F.C e percentual de gordura, foram investigados 19 pessoas sendo 3 do sexo masculino e 16 do sexo feminino com massa corporal Média 58,760kg, desvio padrão de 8,17, IMC com média de 21,600 e desvio padrão de 2,980, F.C com média 85,83 e desvio padrão de 11,829 e percentual de gordura com média 18,58 e desvio padrão de 7,676. Os resultados relatam que dentre os 19 acadêmicos investigados 1 se encontra em estado de magreza, 12 atroficos e 3 apresentam quadro de sobre peso. Diante dos estudos, concluímos que o futsal valoriza a interpretação do real através da identificação dos fatos e eventos socioculturais que aplicados à sua realidade, contribuem como percepção da cultura.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE UNIVERSITÁRIOS INSERIDOS NO PROJETO DE EXTENSÃO “MEDIDA CERTA” DA UNIVERSIDADE CEUMA

AMORIM, Hudson Santos*; GOMES, José Jorge Silva; SANTOS, Ítalo Jadson Lima Moraes; MACHADO, Igor Luís Ferreira; SILVA, Francisco José Sousa; PESTANA, Ezequias Rodrigues; CUNHA, Márcio Luís Araújo

Email: HUDSONAMORIIM@gmail.com

Área / Especialidade: Educação Física

Os principais benefícios à saúde, advindos da prática de atividade física, referem-se entre outros componentes, aos aspectos antropométricos. O projeto “medida Certa” visa oportunizar a

prática esportiva aos discentes da instituição. Participaram do estudo oitenta e seis universitários de ambos os sexos (35 homens e 51 mulheres), representando 17 cursos nos 3 turnos e envolvidos em 4 modalidades esportivas: 1-Futsal (19), 2-Handebol (9), 3-Atletismo (33) e 4-Natação (25). Os motivos revelados pelos alunos foram o sedentarismo e a oportunidade de vivenciar e/ou aprimorar os fundamentos das modalidades oferecidas. Foram desenvolvidas atividades de conhecimentos das regras, fundamentos técnicos e táticos para prática dos esportes. Os alunos realizaram atividades 2 vezes por semana, durante 1 hora por sessão. Para tanto, foi estimado o peso e estatura através de uma balança antropométrica digital (welmy w300®), o IMC foi obtido através da razão entre peso (Kg) e o quadrado da altura (m). O SPSS 19.0 produziu estatísticas descritivas em média e desvio padrão. A amostra apresentou idade 23.4 ± 4.6 anos, peso 64.03 ± 11.2 , estatura 1.60 ± 0.7 , IMC 23.1 ± 3.2 e % de gordura 16.8 ± 8.1 . Quando analisados por estratificação dos esportes 1, 2, 3, e 4, apresentaram idade 22.5 ± 3.5 , 22.1 ± 3.4 , 24.8 ± 5.8 , 23.1 ± 3.6 anos, peso 58.7 ± 8.1 , 70.8 ± 13.8 , 67.9 ± 11.4 , 60.4 ± 9.2 e IMC 21.6 ± 2.9 , 24.7 ± 4.5 , 24.2 ± 3.1 , 22.3 ± 2.2 , respectivamente. Assim, foram observados parâmetros de normalidade para todos os aspectos antropométricos dos discentes. Os achados sugerem que o projeto “Medida Certa” através da prática esportiva, contribui de forma relevante para prognósticos antropométricos importantes relacionados à saúde dos praticantes.

PERFIL NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO “MEDIDA CERTA” DA UNIVERSIDADE CEUMA.

MACHADO, Igor Luís Ferreira*; GOMES, José Jorge Silva; AMORIM, Hudson Santos; SANTOS, Ítalo Jadson Lima Moraes; SILVA, Francisco José Sousa; PESTANA, Ezequias Rodrigues

Email: jjorgejesusmesalvou@hotmail.com

Área / Especialidade: Educação Física

As medidas antropométricas na avaliação do estado nutricional tem se tornado, apesar das limitações, a forma mais prática e de menor custo para análise de indivíduo e população. O projeto “medida Certa” oportunizar a prática esportiva aos discentes da instituição. Participaram do estudo oitenta e seis universitários de ambos os sexos (35 homens e 51 mulheres), representando 17 cursos nos 3 turnos e envolvidos em 4 modalidades esportivas: 1-Futsal (19), 2-Handebol (9), 3-Atletismo (33) e 4-Natação (25). Os discentes relataram o sedentarismo, vivência e aprimoramento dos fundamentos das modalidades como motivos à procura do projeto. Foram desenvolvidas atividades de conhecimentos das regras, fundamentos técnicos e táticos para prática dos esportes. Os alunos realizaram atividades 2 vezes por semana,

durante 1 hora por sessão. Para tanto, foi estimado o peso e estatura através de uma balança antropométrica digital (welmy w300®). O IMC foi obtido através da razão entre peso (Kg) e o quadrado da altura (m). O estado nutricional teve referência do percentil do IMC: baixo peso (BP):<18,5; eutrófico (E):18,5-24,9; sobrepeso (SP):25-29,9 e obeso-I (O):30-34,9. O SPSS 19.0 produziu estatísticas descritivas em média, desvio padrão, valores absolutos e relativos. A amostra apresentou idade 23.4±4.6 anos e estado nutricional (BP:3=3,5%; E:62=72%; SP:20=23,5%; O:1=1%). Quando analisados por estratificação dos esportes 1, 2, 3, e 4, apresentaram médias: (BP: 3=15,8%, E:12=63.2%, SP:4=21.1%); (E:5=55.6%, SP:4=44.4%); (E:23=69,7%, SP: 9=27.3, O:1=3%); (E:22=88%, SP:3=12%), respectivamente. Assim, foi identificada alta prevalência de eutrofia da amostra 72%, com maior relevância para a natação com 88% dos participantes.

PROJETO DE URGÊNCIA: RELATO DE CASOS

QUEIROZ, Jefferson De Brito*; MARQUES, Tércia Virginia Falcão; RODRIGUES, Thaís Da Costa; CAVALCANTE, Walman Pereira; OLIVEIRA, Thaynara Josanne Borges; RIZZI, Claudia De Castro; MAIA FILHO, Etevaldo Matos

Curso: Odontologia

Email: jeffqueirozodonto@gmail.com

O projeto de Urgência é desenvolvido nas Clínicas de Odontologia da Universidade CEUMA, desde o ano de 2014. Neste projeto estão envolvidos professores e alunos da instituição com o intuito de atender pacientes que comparacem a clinica com dores na cavidade oral. O serviço de urgência funciona nos horários matutinos e vespertino de segunda a sexta . No atendimento é realizado o diagnóstico e estabelecido o tratamento que vise a retirada da dor e o restabelecimento do paciente.Com o objetivo de exemplificar os casos mais frequentes que foram atendidos selecionamos um único período para analisar os casos clínicos. Os tratamentos foram realizado por acadêmicos selecionados para o projeto e pela equipe de endodontia. No total de 41 dentes tratados, 25 eram molares, 10 eram pré-molares, 4 incisivos e 2 caninos. No preenchimento das fichas foi feito a anamnese, exame clinico e radiográfico, teste de vitalidade, percussão vertical e horizontal para se chegar a uma provável diagnostico onde a maioria foi pulpíte irreversível, seguido de necrose pulpar, abscesso fênix, periodontite apical e pulpíte reversível. O objetivo deste trabalho e relatar alguns casos ocorridos nas clinicas e a importância do Atendimento de Urgências é de como ele e extrema importância para a comunidade, pois proporciona o alívio da dor de forma imediata, possibilitando a manutenção do dente na cavidade oral e também o reestabelecimento da saúde geral do paciente. Além disso, direciona

o paciente para o tratamento definitivo adequado. Contribuindo de forma extremamente relevante para a prática clínica do aluno e na sua formação profissional.

REABILITAÇÃO ADESIVA ESTÉTICA E FUNCIONAL ATRAVÉS DA TÉCNICA DE DUPLA FACETA – RELATO DE CASO

NASCIMENTO, Caroline Martins*; AHID, Vinícius Pires; SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira; SOUZA, Amanda Márcia Maia; ARAÚJO, Maydson Marques Meneses; AHID, Fernando Jorge Mendes

Email: carolmartins@hotmail.com.br

Curso: Odontologia

Resumo: No planejamento para reabilitação em dentes anteriores, é de fundamental importância que se valorize a necessidade do reestabelecimento de guias que sustentarão uma oclusão ideal. O posicionamento correto dos dentes possibilita uma correta distribuição de forças mastigatórias entre as estruturas de suporte, permitindo preservação e longevidade a todos os elementos que compõem o sistema estomatognático. Nos procedimentos estéticos contemporâneos, é possível que se crie o padrão desejado pelo paciente a partir de laminados cerâmicos extremamente finos, e, com eles, simultaneamente obter-se tamanho e forma dental desejadas para devolver ao paciente as características ideais das guias anterior e canina. O caso clínico envolve paciente do gênero feminino, 21 anos, que queixava-se da estética do seu sorriso. Foi feito registro fotográfico, seguido de planejamento digital utilizando a ferramenta Digital Smile Design (DSD) para guiar o enceramento diagnóstico. Quando o mock-up foi realizado e a estética estava satisfatória à paciente, foi feito o escaneamento para uso do sistema CAD/CAM, e os preparos minimamente invasivos foram feitos em esmalte dos elementos 14 ao 24, incluindo as faces palatinas dos elementos 13 e 23, pois estes não realizavam os movimentos excursivos em guias canina, uma vez que se encontravam girovertidos e não ocluíam com seus antagonistas. Com os laminados prontos, foi possível observar que a confecção das lentes de contato proporcionou estética desejada à paciente, além de reestabelecer as guias que são fundamentais para uma oclusão ideal.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR UTILIZANDO O DIGITAL SMILE DESIGN E PLASTIA GENGIVAL – RELATO DE CASO

NASCIMENTO, Caroline Martins*; AHID, Vinícius Pires; ARAÚJO, Maydson Marques Meneses; SOUZA, Amanda Márcia Maia; LOPES, Mayara de Sena; AHID, Fernando Jorge Mendes

Email: carolmartins@hotmail.com.br

Curso: Odontologia

Resumo: Dentre os fatores essenciais no planejamento de reabilitação que envolve dentes anteriores, a estética é considerada primordial. Visando preservar o máximo da estrutura dental, preparos minimamente invasivos associados à restaurações cerâmicas extremamente finas (as “lentes de contato”), tem sido amplamente indicados para remodelação dental. A incorporação do planejamento Digital Smile Design (DSD) permite a realização de tratamentos personalizados e a previsibilidade dos resultados a serem obtidos. Este trabalho objetiva apresentar um caso utilizando DSD, com plástica gengival, preparo conservador e cimentação de “lentes de contato”. O caso clínico envolve paciente do gênero feminino, 22 anos, queixando-se da estética do seu sorriso. Foi feito registro fotográfico para o planejamento. Através de software foi realizado o DSD, guiando o enceramento de diagnóstico. Em seguida, foi realizado o mock-up para posterior aprovação do planejamento pelo paciente. Após a aprovação, realizou-se a plástica gengival e aguardou-se 30 dias. Os preparos dentários limitaram-se à remoção de áreas retentivas em esmalte. Então, foram cimentadas as “lentes de contato” dos dentes 14 ao 24. Através deste caso clínico, foi possível concluir que o DSD é uma ferramenta que auxilia no tratamento restaurador estético e que o tratamento minimamente invasivo possibilitou estética satisfatória à paciente.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM PRÓTESES FIXAS METALOCERÂMICAS – RELATO DE CASO

NASCIMENTO, Caroline Martins*; SOUZA, Amanda Márcia Maia; SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira; ARAUJO, Maydson Marques Meneses; AHID, Fernando Jorge Mendes; SOUZA, Erick Miranda

Curso: Odontologia

Email: carolmartins@hotmail.com.br

A exigência pela utilização de restaurações estéticas têm tido crescente procura pelos pacientes. O restabelecimento da função e da estética são essenciais e, através do uso da metalocerâmica, consegue-se grande sucesso clínico e longevidade, devido a suas propriedades com alta resistência e biocompatibilidade, além do menor custo se comparadas às atuais lâminas de cerâmica pura. O caso clínico envolve paciente do sexo feminino, 56 anos, que compareceu à Clínica IV do curso de Odontologia da UFMA relatando que “queria ajeitar os dentes da frente”. Após exame clínico e radiográfico, constatou-se que esta apresentava tratamentos endodônticos satisfatórios nos elementos 11, 21 e 22 e apresentava diastema entre os dentes

11 e 12 que incomodavam a paciente. Estes (11 e 12) apresentavam extensas restaurações em resina composta, o 21 estava escurecido e com destruição coronária, e o 22 com um núcleo metálico fundido. Optou-se então por coroas metalocerâmicas nestes elementos, com reforço de pinos intracanaís de fibra de vidro, além da confecção de um pântico suspenso para preencher o diastema entre os dentes 11 e 12. Concluiu-se com a reanatomização dos dentes adjacentes em resina composta. Pôde-se concluir que as restaurações do tipo metalocerâmica são uma excelente opção ao paciente, uma vez que unem características estéticas satisfatórias, ótima resistência e custo mais baixo frente às restaurações cerâmicas puras.

REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA DE CANINOS INFERIORES

MUNIZ, Dayane Nascimento*; MARQUES, Tércia Virginia Falcão; ABREU, Isabella Mayara Barbosa; RIZZI, Claudia de Castro; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Email: dayanenascimento20@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A reabsorção radicular pode ser um fenômeno patológico, decorrente de injúrias traumáticas e/ou irritação do ligamento periodontal ou tecidos pulpaes e caracteriza-se por perda de tecido mineralizado, dentina e cimento. O diagnóstico precoce e preciso dessa lesão é importante para um bom prognóstico e o avanço do processo de reabsorção pode acarretar na perda do dente. Para melhor elucidar esse assunto faremos uma breve revisão de literatura e o relato de caso de um paciente que compareceu a clínica de odontologia do UNICEUMA seis meses após sofrer um acidente de motociclístico apresentando os dois caninos inferiores com reabsorções externas acentuadas, nos quais foi colocada medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio e posteriormente realizada a obturação final.

REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA DE CANINOS INFRIORES

MUNIZ, Dayane Nasciemnto*; ABREU, Isabella Mayara Barbosa; MARQUES, Tércia Virginia Falcão; RIZZI, Claudia de Castro; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Email: dayanenascimento20@hotmail.com

Curso: Odontologia

A reabsorção radicular pode ser um fenômeno patológico, decorrente de injúrias traumáticas e/ou irritação do ligamento periodontal ou tecidos pulpaes e caracteriza-se por perda de tecido mineralizado, dentina e cimento. O diagnóstico precoce e preciso dessa lesão é importante para um bom prognóstico e o avanço do processo de reabsorção pode acarretar na perda do dente. Para melhor elucidar esse assunto faremos uma breve revisão de literatura e o relato de caso de um paciente que compareceu a clínica de odontologia do UNICEUMA seis meses após sofrer

um acidente de motociclístico apresentando os dois caninos inferiores com reabsorções externas acentuadas, nos quais foi colocada medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio e posteriormente realizada a obturação final.

RECOBRIMENTO RADICULAR COM O USO DE ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO

ALMEIDA, Jessika Coelho de Almeida; ALMEIDA, Keliane Neres de; BRITO, Eduardo Santos; SILVA, Wheslitan Leite da; ARAÚJO, Larissa Ellen Gomes; MOREIRA, Ana Regina Oliveira

Curso: Odontologia

Email: jessikacoelho2@gmail.com

Resumo: A recessão gengival é definida como a condição em que a margem gengival está localizada apicalmente à junção cimento-esmalte, resultando em uma superfície radicular exposta ao meio bucal. A doença periodontal e escovação traumática compreendem as principais causas do processo de recessão gengival, comprometendo não apenas a estética do sorriso do paciente, como também pode resultar em maior suscetibilidade a cáries radiculares, lesões não-cariosas e hipersensibilidade dentinária. A técnica de recobrimento radicular com enxerto subepitelial de tecido conjuntivo é considerada a técnica padrão-ouro para a correção estética de recessões gengivais devido os resultados clínicos favoráveis e previsibilidade, apesar da necessidade de um segundo sítio cirúrgico para obtenção do tecido a ser enxertado. Assim, o objetivo do presente trabalho, é relatar um caso de tratamento de recessão gengival Classe I de Miller por meio da técnica de retalho posicionado coronariamente (RPC) associado ao enxerto subepitelial de tecido conjuntivo autógeno (ESTC). O acompanhamento pós-operatório demonstrou adequada cicatrização do tecido, redução significativa da recessão gengival e estabilidade da margem gengival, resultando em uma estética favorável. Dessa forma, pôde-se observar que a associação RPC ao ESTC é uma técnica cirúrgica que apresenta resultados previsíveis no tratamento de recessão gengival, devolvendo uma estética adequada. Palavras-chave: Retração Gengival; Cirurgia Plástica; Tecido Conjuntivo; Enxerto

RECONTORNO GENGIVAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos*; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; SILVA, Maressa Keila De Souza; DA SILVA, Gabriela Barbosa Bezerra; COELHO, Aline Rocha; MOUCHREK, José Carlos; NUNES, Livia Helena De Araújo Castro.

Email: sidney-12@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Nos dias atuais, a busca por um sorriso bonito está cada vez mais frequente. Os pacientes buscam tratamentos estéticos que por si só não trarão os resultados desejados, por isso, devem

ser complementados, comumente, por tratamentos periodontais. O Recontorno Gengival consiste em uma técnica cirúrgica do tipo ressectiva, que realiza uma plástica alterando o formato gengival. De maneira geral, é uma técnica simples, com cicatrização por primeira intenção, onde não há a exposição do tecido conjuntivo e não necessita de suturas. Além de devolver o espaço biológico, esse procedimento tem como finalidade facilitar o controle da higiene bucal. Toda cirurgia é contraindicada quando o paciente não possui uma boa higiene bucal, uma vez que pode acarretar em complicações no pós-operatório. Logo, o Recontorno Gengival só pode ser realizado após a avaliação do cirurgião dentista. Desta forma o objetivo desse trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente, elucidando a técnica cirúrgica afim de demonstrar suas vantagens e desvantagens.

REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA NA REPARAÇÃO DE DEFEITO DE FURCA CLASSE II - RELATO DE CASO

FERRO, Amanda Costa*; CARNEIRO, Lucas Almeida; BARROS, Elvira Oliveira de Carvalho; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araujo Castro.

Curso: Odontologia

Email: a.ferro1604@gmail.com

A lesão de furca ocorre em decorrência da progressão da Doença Periodontal (DP) e do envolvimento dessa estrutura de inserção periodontal presente em dentes multirradiculares. Dessa forma, novas modalidades cirúrgicas vêm sendo aprimoradas com o intuito de reparar estes defeitos. Dentre estas técnicas, a Regeneração Tecidual Guiada (RTG) tem sido amplamente utilizada também no tratamento de sequelas da DP, já comprovado por diversos estudos clínicos que demonstram resultados favoráveis ao seu uso. Este estudo tem como objetivo descrever um relato de caso clínico que se sucedeu na Clínica de Periodontia Clínica da Universidade Ceuma em que a paciente relatou fratura do elemento dentário 36 que clinicamente apresentava lesão de furca classe II e destruição coronária parcial que se estendia para a região subgengival. No ato cirúrgico se optou por realizar a técnica cirúrgica de RTG utilizando osso xenógeno bovino (Bio-oss®) e membrana de colágeno reabsorvível (Bio-Guide®) com a finalidade de reparo do defeito ósseo, além do que, por fins protéticos, houve a necessidade de uma cirurgia de cunha distal para aumento de coroa clínica e restabelecimento de espaço biológico. O caso clínico apresentado reafirma o que a literatura assegura, a técnica executada tem resultados previsíveis e eficácia comprovada pelos indícios clínicos e radiográficos.

SENSIBILIDADE DENTINÁRIA PÓS-OPERATÓRIA

DA SILVA, Mariana Aroucha*; ARAÚJO, Leanderson Cutrim; AQUINO, Gabriela Desterro de Aquino; SILVA, leila campos; ARAÚJO, Tayane Freitas; MAIA, Mariana Figueiredo Lopes; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Email: leo.cutrim@icloud.com

Área/Especialidade: Odontologia

A sensibilidade dentinária pós-operatória é uma condição clínica considerada relativamente comum, podendo gerar desconforto tanto ao paciente quanto ao profissional. Ela pode ser definida como uma dor associada a mastigação ou ao contato com estímulos como frio, quente, doce ou azedo, que ocorre após algum tratamento restaurador e se manifesta clinicamente como dor aguda, de curta duração que desaparece quando removido o estímulo. As causas da sensibilidade pós-operatória podem ser causas pré-operatórias, como condição pulpar, trincas e fraturas do dente e áreas de exposição dentinária cervical; causas operatórias, como: calor friccional e desidratação da dentina, contaminação da cavidade, negligência com a proteção dentinopulpar, realização do condicionamento ácido e/ou aplicação do adesivo de forma incorreta, inserção inadequada da resina, contração de polimerização e falta de material nas margens da restauração; e causas pós-operatórias, como interferências oclusais. Portanto, observa-se que grande parte das causas de sensibilidade pós-operatória podem ser evitadas ou minimizadas pelo cirurgião dentista através do conhecimento e domínio adequado das técnicas restauradoras e cuidados durante o procedimento restaurador, principalmente o domínio da técnica adesiva e conhecimento das propriedades do material restaurador utilizado e sua correta indicação. Palavras-chave: Sensibilidade da dentina; Restauração dentária permanente, Falha de Restauração Dentária

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MUCOCELE EM LÁBIO INFERIOR

JÚNIOR, Francisco Valcy Moreira De Oliveira; ARAÚJO, Eric Johnsons Costa; SILVEIRA, Luiza Carneiro; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; OLIVEIRA, Thais Bezerra Da Maceno; BENSON, Samuel; SOUSA, Grazianne Mendeiros Carvalho de Sousa

Curso: odontologia

Email: VALCYJUNIOR94@hotmail.com

Resumo: A mucocele é uma lesão que é ocasionada após algum tipo de injúria nos ductos salivares das glândulas salivares menores. Esses traumas geralmente ocorrem por mordidas no lábio ou ferimentos que ocorrem abaixo da superfície da mucosa e tem por consequência o extravasamento do muco, resultando assim, um aumento de volume no interior do tecido conjuntivo. É uma lesão benigna, normalmente assintomática mas que podem causar

desconforto para o paciente ao falar ou se alimentar. O objetivo deste trabalho é abordar um relato de caso clínico de um paciente diagnosticado com mucocele no lábio inferior. Paciente D.P.M, gênero masculino, 22 anos de idade, deu entrada no hospital universitário presidente Dutra - HUUFMA com lesão no lábio inferior, durante a anamnese não foi constatado nenhum distúrbio sistêmico do paciente, o mesmo não apresentava alergia e não fazia uso de nenhum tipo de medicamento. Foi realizado a remoção cirúrgica através de uma excisão total da lesão. O paciente foi orientado sobre os cuidados pós-operatórios e orientado para retornar com 7 dias após a cirurgia nova avaliação das condições gerais do paciente.

TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM PACIENTE SUBMETIDO À CRANIOTOMIA TRANSTEMPORAL: RELATO DE CASO

SOUZA, Amanda Marcia Maia*; FILHO, Julio Pereira; COSTA, Pedro Gil Farias; NASCIMENTO, Caroline Martins; ARAÚJO, Maydson Marques Meneses; FERNANDES, Frederico Silva de Freitas; FERREIRA, Silvia Carneiro De Lucena.

Email: amandapb@msn.com

Introdução: A craniotomia transtemporal é realizada para tratamento de aneurismas e remoção de tumores. Nesse procedimento, a articulação temporomandibular (ATM) pode sofrer luxação e o músculo temporal é deslocado e seccionado. O traumatismo dessas estruturas pode levar a cefaléia pós-craniotomia e a disfunção temporomandibular (DTM). Embora existam estudos a respeito do controle da dor pós-craniotomia, nenhum protocolo de tratamento para as sequelas funcionais no aparelho mastigatório foi estabelecido. **Objetivo:** Relatar o tratamento de DTM em uma paciente de 37 anos, sem estabilidade oclusal e que foi submetida a uma craniotomia transtemporal. **Relato de caso:** Tendo em vista a severidade da DTM, foi planejada, como tratamento de urgência, a instalação de uma PPR provisória superior e uma placa oclusal estabilizadora inferior. A paciente foi recomendada a utilizar os dispositivos durante todo o dia, devendo remover a placa apenas durante as refeições e para higienização. Após 20 dias de tratamento, foi observada uma redução considerável da sintomatologia da DTM, não apresentando mais dores na cabeça e pescoço e nem durante a realização das funções orais. **Conclusão:** o tratamento minimamente invasivo e de baixo custo empregado foi eficaz no tratamento da DTM.

TRATAMENTO DA MORDIDA CRUZADA ANTERIOR: RELATO DE CASO CLINICO

FREIRE NETO, Mário Lopes*; BRAMANTE, Fausto Silva; VERCELINO, Celia Regina Maio Pinzan; GURGEL, Julio;

Curso: Odontologia

Email: mario.f_lopes@hotmail.com

A mordida cruzada anterior (MCA) caracteriza-se por uma relação vestibulo lingual inadequada entre os dentes anteriores superiores com os inferiores. Sua prevalência situa-se entre 8 a 12% da população com algum tipo de má oclusão. Além do envolvimento funcional que faz com que o paciente tenha dificuldade em cortar os alimentos nos dentes anteriores, apresenta o caráter estético que pode comprometer a vida social do paciente. A MCA pode ser classificada em dentária, quando há apenas o envolvimento de má posição dos dentes anteriores superiores e inferiores, ou esquelética quando além dos dentes anteriores cruzados há o envolvimento de estrutura óssea da face. Quando diagnosticada, deve ser tratada o mais precoce possível evitando o agravamento do problema e consequente intervenção mais invasiva e mais complexa. Este trabalho tem o objetivo apresentar uma paciente do gênero feminino com 7 anos de idade que apresentava mordida cruzada anterior. Foi tratada com expansão maxilar seguida da máscara de tração reversa e posteriormente nivelamento 4 X 2. Ao fim devolveu-se a oclusão adequada e estética dentária e facial a paciente.

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO EM DISARTROFONIA: UM CASO CLÍNICO

MOREIRA, Maria de Nazaré Freitas; SILVA, Caroline Ferreira da; OLIVEIRA, Jonhnathan Bruno Ferreira; COUTINHO, Patricia Trinta Farias e

Curso: Fonoaudiologia

Email: nazarefreitas02@hotmail.com

Resumo : INTRODUÇÃO: Considerada uma patologia resultante de problemas neurológicos, a disartrofonía pode ser entendida com alterações no controle motor dos músculos envolvidos no processo da produção fonoarticulatória. Está associada a lesões cerebrais corticais responsáveis por tal produção, logrando sintomas básicos como imprecisão articulatória, qualidade vocal rouco-soprosa e velocidade de fala reduzida. OBJETIVO: Descrever o caso clínico de um paciente com disartrofonía. METODOLOGIA: Estudo descritivo, retrospectivo e qualitativo do tipo estudo de caso. APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 76 anos com diagnóstico médico de AVE hemorrágico e diagnóstico fonoaudiológico de disartrofonía flácida difusa. Foi submetido a fonoterapia 2x por semana com duração de 50 minutos por um período de 4 meses totalizando 26 sessões. Na fonoterapia utilizou-se exercícios respiratórios; massagem orofacial passiva isométrica; exercícios isométricos, isotônicos e isocinéticos (lábios, bochecha e língua); exercícios articulatórios; e técnicas vocais. RESULTADOS: Paciente após fonoterapia apresentou respiração costodiafragmática com amplitude dos ciclos respiratórios, melhor ajuste da tonicidade orofacial, aprimoramento da dinâmica da deglutição e articulação mais precisa. CONCLUSÃO: A fonoterapia aplicada aos quadros de disartrofonías auxiliam o paciente na

retomada parcial de tais funções respeitando o limite terapêutico do mesmo e visando sua melhor qualidade de vida

TRAUMATISMO DENTÁRIO: UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA

ROSA, Caroline Sampaio; FILHO, Etevaldo Matos Maia; LEAL, Adriana Mara de Araújo; RIZZI, Cláudia de Castro; GOMES, Isabella Azevedo

Email: casampaiorosa@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

Nos consultórios odontopediátricos o traumatismo dentário é um atendimento de urgência rotineiro, podendo variar de uma simples fratura no esmalte até a avulsão dentária e envolver o terço apical, médio e/ou cervical do elemento dentário. Além disso, é uma experiência dramática para os pais e as crianças envolvidas. Suas consequências afetam função, estética, fonética e o convívio social da criança. Neste caso clínico, paciente J.K, 10 anos, compareceu a clínica de endodontia da Universidade Ceuma queixando-se de dor. Na anamnese relatou ter caído há 4 meses. No exame clínico observou-se fratura da coroa e tecidos adjacentes edemaciados e com auxílio do exame radiográfico constatou-se fratura do terço médio da raiz e região apical com lesão periapical crônica. O tratamento endodôntico foi realizado seguindo todos os protocolos e após ser finalizado o paciente foi encaminhado para a clínica de dentística. Após avaliação do caso, optou-se por realizar a restauração do elemento dentário com resina composta através da técnica direta eliminando a sensibilidade e devolvendo função, estética, fonética e condição de retornar ao convívio social. O acompanhamento clínico e radiográfico foi realizado após um ano e a lesão periapical regrediu radiograficamente, o paciente apresenta-se sem sintomatologia dolorosa, com estética, fonética e função satisfatórias comprovando o sucesso do tratamento endodôntico e restaurador.

TUBERCULOSE OSSEA EM MAXILARES

ARAÚJO, Leanderson Cutrim*; LUNA, Melina Vale; MACIEL, Francisco José Lima Maciel; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos Maciel

Email: leo.cutrim@icloud.com

Área/Especialidade: Odontologia

A tuberculose está entre uma das principais causas de morte dentre as doenças infecciosas, tendo cerca de 1,8 milhões de óbitos por ano, de acordo com a OMS. Seu agente transmissor é o *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch que surgiu a cerca de 15.000. Embora, primariamente seja considerado uma doença pulmonar, a tuberculose pode atingir quase todos os órgãos por disseminação linfo-hematogênica durante a infecção pulmonar inicial. Neste

trabalho será especificado um destes tipos de tuberculose extrapulmonar que é a tuberculose óssea, onde o bactéria se instala no osso em forma de uma osteomielite, resultado de um processo inflamatório em resposta a presença desta bacilo, causando sintomas como dor e inflamação que pode evoluir para dificuldade de movimento e perda de massa óssea localizada. O trabalho a seguir trata-se de um relato de caso de um paciente com tuberculose óssea localizada no osso da maxila, onde ocorrem cerca de 4% apenas dos casos, no qual o paciente era portador do vírus HIV e acabou adquirindo uma comunicação oronasal por conta de grande perda de sua massa óssea maxilar. O tratamento inclui antibióticos e fisioterapia por longos períodos.

UTILIZAÇÃO DO LASER DE ALTA POTÊNCIA NA REMOÇÃO DE FREIO LABIAL: RELATO DE CASO

FURTADO, Guilherme Silva*; FERREIRA, Odalace Chaves; PINHEIRO; Amanda Ferreira de Sousa; FERREIRA, Winnie Dandara Rocha; LAGO, Andréa Dias Neves.

Curso: Odontologia

Email: gfurtado.ufma@hotmail.com

O freio labial é uma estrutura anatômica que quando apresenta hipertrofia pode restringir movimentos labiais, dificultar a higienização, prejudicar a fonética, além de ocasionar diastema interincisais gerando insatisfação estética ao paciente. A frenectomia é uma boa resolução cirúrgica. Esta técnica pode ser efetuada da maneira convencional ou com bisturi elétrico ou ainda com laser de alta potência, apresentando diferenças na sua execução, na cicatrização e no pós-operatório. Paciente do gênero feminino, 30 anos, sem alteração sistêmica, procurou o projeto de extensão “Laser na Odontologia da Universidade Federal do Maranhão”, relatando insatisfação com o seu sorriso. O diagnóstico foi clínico, a partir de uma anamnese minuciosa e um detalhado exame físico da região. Optou-se por realizar a frenectomia labial com laser de diodo de alta potência. Após 3 dias, a paciente retornou para a realização da laserterapia, seguindo os parâmetros: 100 mW, 2 J de energia por ponto, com comprimento de onda 660nm, por 20 segundos em cada ponto. Foram irradiados 6 pontos nas bordas da cirurgia para acelerar a cicatrização, num total de 3 sessões com intervalo de 48 h entre elas. A paciente não relatou dor nem edema pós-cirúrgico. Portanto, a utilização do laser de alta potência associado ao laser de baixa potência nos parâmetros utilizados foi eficaz na remoção do freio labial, no conforto pós-operatório e na ausência de dor.

USO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE FOURNIER: ESTUDO DE CASO

LOPES, Márlío Rodrigues*; SANTOS, Natália Nascimento de Oliveira; LOBATO, Merismar Souza dos Santos; PIRES, Analice Maria Franco; CARVALHO, Tatiana De Sousa Sobral; FONTENELE, Rafael Mondego

Email: marlio.lobes@hotmail.com

Área / Especialidade: Enfermagem

Síndrome de Fournier é uma patologia infecciosa grave, rara, de rápida progressão, que acomete a região genital e áreas adjacentes evoluindo para necrose caracterizada por uma intensa destruição tissular, envolvendo o tecido subcutâneo e a fáscia, devido à ação conjunta das bactérias aeróbias e anaeróbias. O presente estudo apresenta o relato de caso do paciente P.N.D.F, 63 anos, sexo masculino, casado, portador de Hipertensão Arterial. O mesmo admitido em um Hospital de Referência na cidade de São Luís – MA no dia 08-08-2016 com diagnóstico de Síndrome de Fournier. Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso, visando demonstrar o uso do alginato de cálcio e prata no tratamento desta patologia. As medidas terapêuticas envolveram desbridamento cirúrgico, antibioticoterapia de amplo espectro, curativos realizados pela Enfermagem e cirurgia plástica reparadora. Nesse contexto, apesar da gravidade desta patologia, a continuação na assistência prestada pela equipe de Enfermagem, através das ações e intervenções realizadas e o uso de materiais especiais, a exemplo, o alginato de cálcio e prata, demonstraram-se eficazes para a recuperação do paciente.

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DE CANAIS CALCIIFICADOS :

ARAÚJO, Ione Haldiah Gomes*; DOS SANTOS, Aline Silva; DO LAGO, Eulla Pamela Nascimento; OLIVEIRA, Thais Bizerra Damasceno; PEREIRA, Paulo Winícios Silva; RIZZI, Claudia; MAIA, Etevaldo.

Email: yonny.hala@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

A deposição de tecido mineralizado na cavidade pulpar pode ser um processo fisiológico ou patológico. O trauma dental é um dos fatores que pode favorecer a deposição e causar obliteração parcial ou total da câmara pulpar e canal radicular. Geralmente esses dentes acometidos por trauma apresentam-se assintomáticos e são diagnosticado por meio das investigações clínicas e radiográficas. Uma outra consequência do trauma pode ser a necrose pulpar. No entanto, o teste de sensibilidade não pode ser um parâmetro para confirmar a necrose pulpar, tendo em vista que a calcificação pode influenciar na resposta ao teste. Desta forma, o tratamento endodôntico geralmente é indicado após a visualização por meio de exames de imagem da rarefação óssea (Periodontite Apical Crônica). O objetivo desse trabalho

é relatar o tratamento endodôntico, com auxílio de recursos tecnológicos, de um canal calcificado após trauma. Relato de caso: Paciente F. J. 32 anos, sexo masculino, compareceu a clínica Universidade CEUMA tendo como queixa principal má posicionamento dental e relatando ter traumatizado os dentes 11 e 21 há 15 anos. Foi solicitado documentação ortodôntico e Tomografia Computadorizada Cone Beam dos dentes anteriores, com as quais foi possível visualizar a calcificação quase que total da câmara pulpar e parcial do canal radicular e Periodontite Apical Crônica. Optou-se então pelo tratamento endodôntico, devido a extensa rarefação óssea. O tratamento foi realizado com microscópio eletrônico da marca Opto Eletrônica S.A. (São Carlos, São Paulo, Brasil) e pontas ultrassônicas. Após a localização da câmara pulpar o canal foi neutralizado e colocada medicação intracanal á base de hidróxido de cálcio por 15 dias e em seguida foi realizada a obturação do canal. As calcificações podem dificultar severamente os tratamentos endodônticos, no entanto os recursos tecnológicos disponíveis como a tomografia, o microscópio e as pontas ultrassônicas, possibilitam que esses tratamentos sejam realizados com maior segurança.

PAINEL CASO CLINICO – PÓS GRADUAÇÃO

APLICAÇÕES CLÍNICAS DE MODELOS DE CONTENÇÕES PÓS-TRATAMENTO ORTODÔNTICO

MADEIRA, Perla Dalei Barros*; VERGANI, Eliane Cristina Carrera Eleres; GREGÓRIO, Rosyane de Souza; BRAMANTE, Fausto Silva; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; GURGEL, Júlio de Araújo

Curso: Odontologia

Email: rosygregorio14@yahoo.com.br

Introdução: A manutenção da correção após o término do tratamento ortodôntico é uma etapa desafiadora para o profissional, pois os dentes movimentados têm a tendência a recidiva em graus variados, nesse contexto as contenções tem como finalidade eliminar essa tendência; logo o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura para descrever os diferentes tipos de contenções utilizados pós – tratamento ortodôntico e discutir suas aplicações, bem como as vantagens e desvantagens. Segundo Zachrisson (2015) contenção é a fase do tratamento que objetiva manter os dentes numa posição ideal e estética, obtida com o

tratamento ortodôntico ativo, evitando a tendência natural de movimentação fisiológica dos dentes. Para Assumpção (2012) diversos estudos abordam diferentes tipos de contenção e preconizam sua utilização por períodos de tempo distintos. Sendo possível encontrar na literatura, desde a sua contra-indicação até a indicação do uso permanente. Existem vários dispositivos empregados para contenção ortodôntica e a frequência de indicação de determinados aparelhos ainda é um ponto controverso, uma vez que pode ser diversificada com base em alguns fatores que incluem a região geográfica e as características dos pacientes. Conclusão: dentre as diferentes contenções ortodônticas apresentadas ao longo do trabalho, escolher o melhor tipo de contenção dependerá das indicações e vantagens para cada paciente, onde o profissional deverá levar em consideração as particularidades de cada caso de acordo com o tratamento realizado. Quando a contenção é bem orientada e os aparelhos são devidamente selecionados, os resultados de pós-contenção podem ser altamente satisfatórios, inclusive nos casos de diastemas.

CASO CLÍNICO: RECANALIZAÇÃO DO DUCTO SALIVAR DA GLÂNDULA PARÓTIDA POR LESÃO DE PAF EM FACE

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*; COSTA, Fábio;

Email: jessicaskarlas@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: As glândulas salivares apresentam-se em dois grupos: são três pares de glândulas salivares maiores (parótidas, submandibulares e sublinguais) e glândulas salivares menores. As glândulas salivares são responsáveis pela produção de saliva, que participa da digestão e promove limpeza e a lubrificação da cavidade da boca. Participa do sistema imune com células de defesa na saliva. São anexos do sistema digestório. A glândula parótida é a maior glândula, produz cerca de 25% do volume total de saliva. É encapsulada e se divide em parte superficial e parte profunda. A sialocele parotídea é o extravasamento de saliva para os tecidos circunvizinhos à glândula, neste caso oriundo por trauma por PAF. Resulta perda de integridade do ducto ou do parênquima glandular. Se não tratada, pode causar grande edema facial com formação de fístula, gerando áreas de necrose e cicatrizes. O tratamento preconizado no presente caso foi a punção do conteúdo e o uso de cateter via intraoral para drenar a saliva e evitar a formação de fístula e curativo compressivo. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi analisar a recanalização do ducto salivar da glândula parótida, através da adaptação de um CATETER e curativo compressivo para um novo redirecionamento do ducto em paciente sequelado por PAF.

MARSUPIALIZAÇÃO DE FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR SUBLINGUAL: RELATO DE CASO

COSTA, Fabio Santos; MORAIS, Hélio Clauber Freitas; GONÇALVES, Leticia Machado; MACIEL, Andreza De Almeida Bastos

Curso: odontologia

Email: fabicoosta@hotmail.com

Resumo : As glândulas salivares podem ser acometidas por diversos processos patológicos, sejam eles de caráter inflamatório (de natureza viral ou bacteriana), alérgico (sialadenite alérgica), neoplásico (lesões benignas ou malignas), auto-imune (Síndrome de Sjogren), cístico (dermóide) ou genético (fibrose cística). De acordo com o tipo de afecção, a incidência será maior ou menor em um grupo determinado de glândulas salivares. Entre as lesões benignas que acometem a cavidade oral, estão os fenômenos de retenção salivar, os quais se apresentam como lesões que envolvem as glândulas salivares e seus respectivos ductos, podendo apresentar-se, clinicamente como mucocele. Essas lesões são semelhantes, sendo a rânula um fenômeno de retenção salivar de localização especificamente em assoalho de boca. O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de tratamento de rânula através de marsupialização. Este procedimento teve como vantagem ser um procedimento pouco invasivo, pouco traumático e que proporcionou ao paciente mais segurança e principalmente preservação das estruturas nobres adjacentes à glândula sublingual que fora marsupializada para tratar o fenômeno de retenção salivar existente.

RETRATAMENTO ORTODÔNTICO EM DENTES COM REABSORÇÃO RADICULAR, UMA REALIDADE CLÍNICA: CASO CLÍNICO

LIMA, Kleist Christian Costa*; MADEIRA, Perla Dalei Barros; GURGEL, Júlio De Araújo; BRAMANTE, Fausto Da Silva; VERCELINO, Célia Regina Maia Pinzan;

Email: kleistlima@hotmail.com

Os pacientes que apresenta reabsorções radiculares severas por vezes encontram restrições para a realização de tratamento ortodônticos. Como uma das principais causas de reabsorção radicular é o uso de forças para movimentação dentária, muitos profissionais condenam o uso do aparelho ortodôntico. Contudo, a observação de princípios biomecânicas e cuidados adicionais tem tornado possível a realização de correções de más-oclusões nestes pacientes. A descrição deste caso clínico alertar para os aspectos que devem ser observados para o retratamento de casos com reabsorção radicular prévia.

REVASCULARIZAÇÃO PULPAR: RELATO DE CASO

CARDOSO, Olinto Santos*; DE SOUZA, Patrícia Oliveira; DA SILVA, Samaélica; LUCIANO, Luanda Cristina Oliveira; CARVALHO, Ceci Nunes; RIZZI, Cláudia

Curso: Odontologia

Email: olinto-santos@uol.com.br

Os traumas dentários são uma das principais causas da perda de vitalidade dos dentes e interrupção da apicigênese. O tratamento endodôntico de dentes necrosados com rizogênese incompleta é um dos principais desafios enfrentados na Endodontia. Estes apresentam características que dificultam o procedimento convencional, como canais amplos e paredes dentinárias delgadas. A modalidade de tratamento convencional é a apicificação com hidróxido de cálcio ou o plug apical com MTA, mas essas técnicas possuem algumas desvantagens, como a não indução do desenvolvimento radicular. Na busca por um tratamento que estimulasse o desenvolvimento tecidual e que desse continuidade à maturação radicular surgiu um novo tratamento chamado revascularização pulpar, embasado nos avanços científicos sobre engenharia tecidual. Este relato de caso tem como objetivo descrever um caso clínico de revascularização pulpar realizado em paciente com 16 anos de idade com histórico de trauma e rizogênese incompleta com necrose pulpar não recente nos incisivos centrais superiores, utilizando material reparador biocerâmico para selamento cervical. Mais estudos clínicos longitudinais ainda são necessários para aperfeiçoar a técnica de revascularização pulpar, a fim de permitir ao profissional maior controle e mais segurança dos resultados. Casos de pacientes com mais de 12 anos, com histórico de trauma antigo e dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar, podem ainda ser considerados aptos para tentativa da revascularização pulpar

TRATAMENTO COMPENSATÓRIO DA CLASSE II COM USO DE ELÁSTICOS INTERMAXILARES

COSTA, Ana Carla Souza Costa; GURGEL, Júlio de Araújo; BRAMANTE, Fausto Silva; PINZAN, Arnaldo; VERCELINO, Célia Regina Maio Pinzan; GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: odontologia

Email: anacarla.scosta@yahoo.com.br

Resumo : Os protocolos de tratamento da má oclusão de Classe II podem ser influenciados por algumas características do paciente – como a idade, a gravidade da má oclusão instalada e o grau de colaboração – ou, ainda, por fatores relacionados à conduta do profissional – como a escolha do protocolo de tratamento. Quando o paciente não se encontra no período de crescimento, recursos cirúrgicos e compensatórios devem ser instituídos a fim de se conseguir a correção da má oclusão devolvendo ao paciente estética dental, facial e funcionalidade oclusal. Embora o tratamento ortodôntico-cirúrgico seja o mais indicado em alguns casos, devido à severidade da má oclusão, o paciente pode optar por tratamentos compensatórios,

como extrações e uso de elásticos. O paciente RA, apresentou-se para tratamento ortodôntico aos 17 anos e 5 meses, queixando-se da protrusão dentária no arco superior. A avaliação clínica e radiográfica do paciente demonstrou uma retrusão mandibular acentuada com um perfil facial convexo. Como primeira opção propôs-se um tratamento combinado ortodôntico-cirúrgico para permitir a correção da oclusão e a melhora do perfil facial e como segunda opção o uso de propulsor mandibular fixo. No entanto, por razões econômicas, o paciente recusou estas opções e optou pelo tratamento compensatório com elásticos intermaxilares. . O tratamento foi concluído em 21 meses, observando-se a correção na relação dentária, porém sem melhora no perfil facial. O caso foi acompanhado anualmente, durante 4 anos, demonstrando boa estabilidade oclusal do protocolo de tratamento utilizado.

TRATAMENTO DE FÍSTULA ORO-ANTRAL DECORRENTES DE MANIFESTAÇÕES ORAIS DA TUBERCULOSE: RELATO DE CASO

FERRAZ, Rodolfo Adriano Rocha*, BARRETO, Samuel benson Lima; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza Bastos

Email: rodolferraz@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A fístula buco-sinusal é uma ocorrência patológica comum, onde há comunicação do seio maxilar com a cavidade bucal, decorrentes de complicações patológicas, traumas, defeitos do desenvolvimento, iatrogenias, infecções odontogênicas e exodontias. Dentre os fatores patológicos, a Tuberculose, por ser uma doença infecciosa causada por um microorganismo denominado Bacilo de Kock, podem acometer vários órgãos, como rins , ossos, e meninges, embora os órgãos mais acometidos são os pulmões. Apesar de ser uma doença do sistema pulmonar, a manifestações bucais secundárias raramente são observadas. Acredita-se que a maioria das lesões ocorra no contato da saliva contaminada com áreas levemente traumatizadas. Embora a área intrabucal mais comum seja a parte posterior da língua, podem ocorrer lesões nos ossos maxilares. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de tratamento de fístula oro-antral decorrente de sequelas ocasionadas pela doença da tuberculose.

TRATAMENTO DE FRATURA PANFACIAL ACOMPANHAMENTO DE CASO APÓS 2 ANOS

SOUSA, Alison Cruz*; MORAIS, Helio Clauber Freitas; AGOSTINHO, Cicero Newton Lemos Felicio; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos Maciel

Email: alisonjc7@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

As fraturas panfaciais também denominadas fraturas múltiplas da face, constituem as mais complexas e destrutivas afecções traumáticas do esqueleto facial, envolvendo todos os seus pilares e anéis de sustentação ou pelo menos dois dos três terços faciais. Geralmente acometem a maxila, a mandíbula, os complexos zigomático e naso-órbito-etmoidal, além do osso frontal. São normalmente associadas a graves lesões de partes moles e levam a importantes deformidades estético-funcionais com desestruturação da fisionomia facial e sintomas oculares e de oclusão dentária. Sendo o tratamento extremamente complexo, pois por muitas vezes não há uma estrutura estável que possa ser usada como arcabouço para restabelecer a continuidade óssea. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do hospital Dr Clementino Moura (Socorro II). Paciente G.B. 28 anos deu entrada no serviço referindo ser vítima de acidente motociclístico dia 23-08-2014 onde a mesma não usava capacete, após exames clínicos e radiográficos (tomografia computadorizada com reconstrução 3D) paciente foi diagnosticada com fratura Panfacial sendo fratura Le Fort III a direita Le Fort II a esquerda e fratura de mandíbula. A cirurgia foi realizada dia 03-09-14 sendo utilizadas sistema de fixação interna rígida 1,5mm e 2,0mm.

TUMOR ODONTOGÊNICO DE CÉLULAS GRANULARES EM MAXILA: RELATO DE CASO CLÍNICO

CARVALHO, Roberta Furtado*; HASS, Viviane; PONTES, Helder Antônio Rebele; SILVA, Bruno Thiago Cruz; DE ABREU, Michele Carvalho; BANDECA, Matheus

Curso: Odontologia

Email: betafcarvalho@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O tumor odontogênico de células granulares é uma rara neoplasia odontogênica benigna composta de variável quantidade de células granulares e epitélio odontogênico aparentemente inativo em um estroma colágeno. Clinicamente, tende a ocorrer na região posterior de mandíbula como uma pequena tumefação assintomática, em mulheres de 50 anos de idade, com um aspecto radiográfico radiolúcido ou misto, bem definido. Lesões em maxila são bastante raras. O tratamento consiste em enucleação ou curetagem. **RELATO DE CASO:** Paciente, sexo feminino, 41 anos, melanoderma, apresentava-se com disfagia e uma tumefação indolor na região posterior de maxila esquerda com 2 anos de evolução. Ao exame clínico uma lesão firme, lisa e não ulcerada era palpável na região maxilar esquerda causando expansão das corticais maxilares. O exame de tomografia computadorizada demonstrou uma massa bem circunscrita na região maxilar esquerda com extensão para o tecido mole adjacente e presença de corpos calcificados dentro da lesão. A avaliação microscópica revelou uma neoplasia composta de células poligonais com grânulos eosinofílicos no citoplasma associadas com ilhas de epitélio odontogênico. Áreas com calcificação distrófica e corpos cementiformes foram

também notados. Procedeu-se a excisão cirúrgica da lesão. A paciente encontra-se sob acompanhamento regular de 2 anos, livre de recorrência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tumor odontogênico de células granulares é uma neoplasia extremamente rara, com poucos casos relatados na literatura. Em relação as origem das células granulares, alguns estudos foram realizados, porém devido ao reduzido numero de casos relatados, apenas especula-se uma possível linhagem histiocítica mesenquimal. Além disso, lesões com aspectos agressivos são bastante raros.

SARCOMA DE EWING: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA E RELATO DE CASO

CARVALHO, Roberta Furtado; HASS, Viviane; DE ABREU, Michele Carvalho; PONTES, Helder Antônio Rabele; BANDÉCA, Matheus

Curso: Odontologia

Email: betafcarvalho@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Sarcoma de Ewing é um tumor maligno primário do osso que geralmente ocorre na infância e adolescência, com 80% dos casos sendo descobertos em pacientes com menos de 20 anos de idade. Sua histogênese permanece incerta, no entanto, estudos recentes apresentam motivos para se acreditar em uma origem neuroectodérmica. Observa-se predileção pelo gênero masculino e a maioria de pacientes afetados são da raça branca. O tumor acomete ossos longos, pélvis e costelas com maior frequência. O envolvimento dos ossos gnáticos e craniofaciais é raro, sendo a região posterior de mandíbula a localização mais comumente afetada, podendo estar associada à parestesia, tumefação, dor e mobilidade dentária. Sintomas sistêmicos como febre, cansaço e fraqueza podem estar presentes, bem como leucocitose e aumento na velocidade de sedimentação dos eritrócitos, podendo levar a um diagnóstico errôneo de osteomielite. **RELATO DE CASO:** Jovem de 15 anos de idade, leucoderma, apresentando aumento volumétrico na região posterior da mandíbula, causando dor e assimetria facial. Radiograficamente foi observado uma lesão osteolítica difusa, com bordas irregulares e mal definidas no ascendente de mandíbula do lado esquerdo, provocando flutuação e reabsorção radicular do dente envolvido. Para fechar o diagnóstico e fazer distinção entre outros tumores de origem mesenquimal, foram realizadas reações de imuno-histoquímica com os anticorpos CD99, Enolase e Vimentina. **RESULTADOS:** As proteínas expressaram-se positivamente no espécime permitindo a confirmação diagnóstica de Sarcoma de Ewing. Após o resultado do exame histopatológico, o mesmo fora encaminhado para um hospital de referência em oncologia da região para o início do tratamento poliquimioterápico e cirúrgico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A análise imuno-histoquímica é uma ferramenta imensamente útil para confirmar o diagnóstico morfológico e estabelecimento do prognóstico da lesão. O

tratamento do Tumor de Ewing é dividido em três etapas: quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e quimioterapia ou radioterapia pós-operatória. O paciente permanece em acompanhamento e tratamento quimioterápico, após ter sido submetido excisão cirúrgica radical do tumor.

PAINEL PESQUISA - GRADUAÇÃO

A PERCEPÇÃO DO PSICOLOGO ACERCA DOS DESAFIOS NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

SILVA, Patrícia Oliveira*; GUIMARÃES, Roberto Mendes; SANTOS, Angelo Augusto De Macêdo

Curso: Psicologia

Email: paaty.oliveira@hotmail.com

Tendo em vista que a inserção do psicólogo no sistema foi reconhecida a partir da promulgação da Lei de Execuções Penais em 1984, este artigo tem como objetivo compreender a percepção do psicólogo que atua no sistema penitenciário de São Luis - MA acerca dos desafios para a realização de um trabalho de ressocialização com apenados. Apresenta-se o trabalho do psicólogo no âmbito prisional e a importância das ações propostas durante o cumprimento da pena para posterior reinserção social do preso. Para tanto, foram entrevistados 8 (oito) psicólogos do sistema penitenciário da referida cidade e o critério previamente estabelecido foi

que tivessem o mínimo de seis meses de atuação no sistema prisional. Para atingir tal objetivo proposto foi utilizada uma pesquisa qualitativa, em que o instrumento de coleta de dados deu-se por entrevista semiestruturada e para a análise dos dados, utilizou-se da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Através das informações obtidas neste estudo, foi possível identificar quais desafios que dificultam a atuação do psicólogo, e quais abordagens proporcionam maiores chances de sucesso no processo de ressocialização de detentos.

ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE

GALVÃO, Maria de Fátima Pacheco; AMORIM, CAMILA MALCHER TEIXEIRA

Curso: Fonoaudiologia

Email: maria_fatima79@hotmail.com

Resumo: Pacientes com insuficiência renal crônica são submetidos a tratamentos através da hemodiálise e de uso de medicamentos ototóxicos que podem comprometer a função auditiva de maneira irreversível, causando perda auditiva neurosensorial, em uma ou mais frequências na faixa de 250Hz a 8000Hz. Assim esta pesquisa teve como objetivo avaliar a audição periférica de pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) submetidos a tratamento de hemodiálise por mais de um ano. Serviram de sujeitos quinze pacientes de uma unidade ambulatorial particular de Serviço especializado em Nefrologia, em São Luís – MA de ambos os sexos e idades variadas, os quais realizaram avaliação auditiva (audiometria tonal e vocal) e seguindo o protocolo específico da Clínica Escola de fonoaudiologia da Universidade Ceuma. Como resultado foi possível concluir que 53,33% (08 pacientes) apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, 20% (03 pacientes) apresentaram perda auditiva neurosensorial unilateral, e 26,66% (04 pacientes) apresentaram limiares auditivos compatíveis com perda auditiva sensorineural bilateral nas frequências agudas. O grau das perdas variou de acordo com o tempo de utilização dos medicamentos e de hemodiálise, onde encontramos 01 paciente com tempo de HD associada a tratamento medicamentoso superior a 5 anos com grau moderado a severo na audiometria. Não houve diferença estatisticamente significativa em relação a sexo e idade. Conclui-se portanto que a hemodiálise associada ao uso de medicamentos ototóxicos no tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica é capaz de provocar alterações auditivas irreversíveis ao indivíduo. Esta pesquisa obteve aprovação no CEP da Universidade ceuma sob número 058729/2016.

ADOLESCENTES GRÁVIDAS RECEBEM ORIENTAÇÃO SOBRE SAÚDE BUCAL DURANTE O PRÉ-NATAL?

MORAES, Gabriel Felipe de Oliveira; THOMAZ, Erika Bárbara Abreu Fonseca; LAMY, Zeni Carvalho; FERNANDES, JULIANA DE KÁSSIA BRAGA; MARTINS, Rafiza Felix Marão

Curso: odontologia

Email: gabrielmoraes17@outlook.com

Resumo: A gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública. Cárie e periodontopatias podem ser favorecidas por questões biológicas e sociais relativas à gravidez precoce. A assistência pré-natal de qualidade pode minimizar algumas destas consequências negativas. Neste estudo, foram avaliadas as orientações sobre saúde bucal recebidas por adolescentes grávidas durante o pré-natal. Foi realizado um estudo qualitativo com adolescentes grávidas de baixa renda. A técnica empregada para a obtenção dos dados foi grupo focal. A análise de conteúdo foi utilizada na modalidade temática. Das falas, emergiram as unidades temáticas: a fragilidade do pré-natal na mudança de hábitos; grávida não vai ao dentista; e a equipe não tem dentista! Ficou evidente a forte influência familiar na determinação dos hábitos e dos comportamentos em relação à saúde bucal. As crenças e mitos dificultaram a busca pelo atendimento odontológico. Orientações básicas de saúde bucal, como a escovação regular com dentífrico fluoretado e a diminuição do consumo de açúcar, não foram encontradas nas entrevistas. As orientações sobre saúde bucal no pré-natal mostraram-se inconsistentes, pouco contribuindo para a saúde bucal das adolescentes grávidas. CEP: 004417/2010-20
Palavras-chaves: Gravidez na adolescência; Saúde Bucal; Cuidado Pré-natal.

ANÁLISE FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS HIDROALCOÓLICO E CLOROFÓRMICO DAS CASCAS DA EUGENIA LUSCHNATHIANA

COSTA, Marcus Vinícius Lindoso*; MENEZES, Andleyse Santos Sá; TORRES, Gabriela Fernandes; CARNEIRO, Stefany Tamilla Dos Santos; SALOMAO, Rondineli Seba.

Email: marcusslindoso55@gmail.com

Área / Especialidade: Farmácia

A pitomba (*Eugenia luschnathiana*) é uma planta nativa do Brasil encontrada na região Amazônica até a Mata Atlântica, sendo cultivada no nordeste, principalmente em Pernambuco. Sua polpa é protegida por casca de coloração marrom que, apesar de dura, é quebradiça. É uma excelente fonte de Vitamina C, Vitamina A, Ferro e Cálcio possuindo diversas finalidades terapêuticas. O fruto ajuda no fortalecimento do sistema imunológico agindo também na proteção do sistema vascular. Possui metabólitos secundários em várias partes da planta, como taninos, existentes nas folhas da árvore. As amostras vegetais foram coletadas em uma propriedade privada na cidade de Mirinzal- MA. O extrato foi produzido com 300g de casca seca da pitomba, triturada manualmente e macerada com solução hidroalcoólica (etanol 70%) 1.075

mL, por 2 dias. Após esse período, o material foi filtrado e concentrado com o secador, obtendo-se 250 mL do extrato concentrado. Particionou-se o extrato, separando em fração polar (hidroalcoólico) e a apolar (clorofórmio) do extrato. A prospecção fitoquímica foi realizada através da metodologia proposta por Matos (2009) para as duas frações, os resultados foram classificados com fracamente (+), moderadamente (++) e fortemente (+++). A prospecção fitoquímica detectou a presença de cinco classes de metabólitos secundários, sendo os principais deles os Fenóis (+++), Flavonas, Xantonas e Flavonóis (++) , além de Chalconas e Auronas (+), Taninos Condensados (+), Flavononas (+). A análise das cacas da pitomba nos leva a concluir que tal parte pode ter um potencial terapêutico como antioxidante ou para problemas circulatórios, devido aos constituintes fitoquímicos encontrados.

ANÁLISE DA CAPACIDADE ATENCIONAL DE IDOSOS SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO CINESIOTERAPEUTICO DE DUPLA TAREFA COMO MEDIDA PREVENTIVA DO RISCO DE QUEDAS.

DE MATOS, Pâmella Mayara Ferreira*; CAMPOS, Jessica Kelly Garceis; DA SILVA, Lidia Maria Lopes; SOARES, Karla Virginia Bezerra De Castro.

Email: pamellamatos@hotmail.com

Área/Especialidade: Fisioterapia

Objetivo: do estudo foi analisar os efeitos de um protocolo de dupla tarefa na melhora da capacidade atencional como medida preventiva de quedas em idosos. Pesquisa aprovada pelo parecer de numero 541.619. Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da Universidade CEUMA. Estudo realizado na Universidade Ceuma em São Luís, MA com amostra aleatória composta por 42 mulheres iniciantes no projeto Uniceuma sem fronteiras. Para coleta de dados utilizou-se os seguintes instrumentos avaliativos: Timed Up And Go , Timed Up And Go Cognitivo e Fluência Verbal – Categoria animal. Posteriormente foi aplicado um protocolo de dupla tarefa explorando exercícios físicos e cognitivos simultaneamente, com duração de dezesseis semanas, em uma frequência de duas vezes por semana durante 50 minutos por sessão. Os resultados mostraram que (88%) da amostra sofreu variação média de (15,27 s) pré-teste e (12,35 s) pós- testes migrando da categoria de risco relativo de quedas para baixo risco. As médias para o teste Time Up And Go, assim como o Timed Up And Go Cognitivo confirmaram o baixo risco de queda para toda amostra com valor aproximado de (13,38) segundos após a intervenção. Observou-se também uma melhora discreta nas análises avaliativas de fluência verbal para o pós-teste com variação regular de (22,7) para (23,5) palavras (nome de animais) por minuto. Conclui-se que houve melhora relevante na capacidade atencional e fluência verbal de idosos quando submetidos ao protocolo cinesioterapeutico de dupla tarefa, o que passou a diminuir o risco de

quedas da amostra otimizando assim sua qualidade de vida. Palavra chave: Saúde. Atenção. Capacidade. Idoso. Queda.

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

VERAS, Treyce Pinheiro*; BOAS, Renata França; GONÇALVES, Maria Claudia; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar.

Email: treyceveras@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

A dependência funcional da criança com paralisia cerebral acarreta sobrecarga física e emocional que resulta na diminuição da qualidade de vida de seu cuidador. Assim, esta pesquisa objetivou avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de crianças com paralisia cerebral moderada à grave. Foi realizado um estudo descritivo, transversal e quantitativo, com 10 cuidadores de portadores de paralisia cerebral da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de São Luís – MA, sendo utilizando para coleta de dados um questionário sócio demográfico e o WHOQOL-Bref. Os dados foram digitados e analisados no SPSS 18.0, utilizando estatística descritiva e teste de Mann Whitney, considerando $p \leq 0,05$. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética através do Parecer número 1.422.865. Todos os cuidadores estudados eram as mães das crianças com paralisia cerebral. Elas tinham média de idade de 29,7 anos, sendo maioria casada (60%) e com renda compatível com classe C ou D (80%). Foi identificado que os cuidadores apresentaram tanto o Índice Geral de Qualidade de Vida, quanto todos os domínios separadamente (físico, psicológico, social e meio ambiente), classificados como regular. Considera-se que a qualidade de vida dos cuidadores pode refletir na qualidade de vida das crianças assistidas. Assim, estes dados apontam a necessidade de implantação de programas de apoio direcionados aos cuidadores de crianças com paralisia cerebral e a capacitação de profissionais de saúde que possam realizar uma assistência integral, envolvendo a criança e seus familiares próximos, e estimulando os aspectos referentes aos quatro domínios da qualidade de vida destes indivíduos.

ANÁLISE DA ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS SEM LACTOSE EM UM SUPERMERCADO DE SÃO LUÍS – MA

CARDOSO, Gracy Kelle Ferreira*; SOUZA, Angela Tamara Lemos; DOS SANTOS, Alexsandro Ferreira; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu; DE CARVALHO, Carolina Abreu; DA SILVA, Eliziane Gomes Da Costa Moura

Email: kellecardoso.nutri@outlook.com **Área / Especialidade:** Nutrição

Esse estudo teve como objetivo analisar os rótulos dos alimentos “sem lactose” em um supermercado de São Luís - MA. A rotulagem de alimentos possui um papel importante para garantir aos consumidores informações corretas sobre o produto, além de ser um canal essencial de comunicação entre a empresa produtora e o consumidor final. No Brasil não existe a obrigatoriedade de informar na rotulagem a presença ou ausência, ou ainda a quantidade de lactose presente no alimento. Essa medida simplificaria o controle e a prevenção dos sintomas de quem tem intolerância à lactose. Estudo descritivo, realizado nos meses de abril e maio de 2016 em um supermercado de grande porte na cidade de São Luís – MA. Foram analisados 23 produtos de tipos e marcas diferentes, adquiridos pela pesquisadora na qualidade de consumidora. Analisou-se nos rótulos as informações obrigatórias: lote; validade; origem; denominação de venda; instruções de preparo e uso; lista de ingredientes; conteúdo líquido, conforme resolução nº 259/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dos produtos analisados 57% apresentaram pelo menos uma irregularidade. Sendo o item identificação do lote ausente ou irregular com um maior percentual de 30%. Conclui-se que apesar de existir legislação específica sobre rotulagem, pode-se notar falhas por parte das indústrias de alimento em seguir as normas e por parte das empresas de fiscalização em se fazer cumprir a legislação.

ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS DE ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA SOBRE HANSENÍASE

TORRES, Denise Carvalho*; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; PINHO, Kelyanne dos Santos; SANTOS, Alisson Sousa; BORGES, Claudio Karone da Silva; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; GONÇALVES, Maria Cláudia.

Modalidade: PP Email: denise_torres@outlook.com

Curso: Fisioterapia

A hanseníase tem cura, e no Brasil seu tratamento é realizado pelo Sistema Único de Saúde. Entretanto, dentre os fatores que dificultam o controle desta doença, cita-se o desconhecimento de profissionais e estudantes da área de saúde. Neste sentido, o objetivo deste estudo é analisar o conhecimento dos acadêmicos de fisioterapia sobre a hanseníase. Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 68 acadêmicos do primeiro período de fisioterapia da Universidade CEUMA, em São Luís-Ma. Os dados foram obtidos através de ficha de avaliação sociodemográfica e questionário validado sobre o conhecimento de hanseníase. O estudo foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa pelo parecer número 516.267. Os discentes apresentaram média de idade de 18.9 anos, sendo a maioria (61,8%) do gênero feminino. Quanto ao conhecimento sobre hanseníase, 97,1% já tinham ouvido falar sobre a doença, sendo que 80,90% nunca tiveram contato com algum paciente com hanseníase. A maioria indicou o aparecimento de manchas (89,7%) e a perda de sensibilidade (88,90%) como

sintomas da doença. No entanto, apenas 25% responderam que a hanseníase era transmitida pelo sistema respiratório, e 57,4% que a hanseníase tem cura. Identificou-se que a maioria dos discentes estudados já ouviu falar sobre hanseníase e seus principais sintomas, no entanto apresentou conhecimento restrito quanto ao meio de transmissão e a cura da doença. Percebe-se assim a necessidade de se realizar ações de conscientização sobre a hanseníase, para evitar estigmas relacionados à doença, já que se trata de uma condição que apresenta tratamento eficaz. Palavras chave: hanseníase, conhecimento, discentes.

ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO LEITE INTEGRAL UHT EM UM SUPERMERCADO DE SAO LUIS

OLIVEIRA, Thacylla Wanessa dos Santos de*; DANTAS, Hildelene Amélia de Araujo; OLIVEIRA, Anne Caroline Costa de; BRANDÃO, Igor Vinícius de Andrade; OLIVEIRA, Paula de Lourdes Lauande; FERREIRA, Cristiane Dominice.

Email: thacylladeoliveira2014@gmail.com

Curso: Farmácia

É necessário conhecer as características nutricionais do leite sendo ele uma bebida bastante consumida pelo mundo todo. Os testes físico-químicos são métodos eficientes no controle de sua qualidade e de fundamental importância no aspecto de segurança alimentar. Este projeto visa analisar o fator físico-químico comparativo de duas marcas de leite integral UHT comercializados em um supermercado de São Luís – MA, tomando como parâmetros suas características organolépticas e analisando se ambas estão dentro dos padrões exigidos. Foi realizado um estudo analítico do tipo experimental descritivo qualitativo em um supermercado escolhido ao acaso na cidade de São Luís – MA. Foram utilizadas duas marcas diferentes de leite integral UHT, ambas identificadas como marca A e B. A coleta das amostras e os experimentos foram realizados no período de Maio de 2016, onde foram avaliadas 10 amostras de leite UHT, sendo 5 da marca A e 5 da marca B. Os resultados da marca A afirmam que todos os testes físico-químicos atendem aos padrões exigidos pela IN51 e Portaria nº 146, apresentando: aspectos visuais característicos do leite e estando aptos para o mercado e consumo diário. Diferentemente do leite da marca B que estavam em todos os testes físico-químicos em desacordo com a normativa, estavam fora dos padrões no quesito cor, mas nas outras características estava dentro das normas estabelecidas, apresentando irregularidades, uma vez que não são seguidas as normas estabelecidas.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE UM AÇUDE EM VARGEM GRANDE, MARANHÃO

FERNANDES, Taiany de Oliveira*; SILVA, Camilla dos Santos; DOS SANTOS, João Augusto Pereira; CASTRO, Taciana Melo; CASTRO, Vanessa Thalene Garros; SILVA, Maria Raimunda Chagas.

Email: taiany.tof@gmail.com

Área/Especialidade: Farmácia

O açude foi decretado como balneário pelo projeto de lei nº 005/97, é usado principalmente para recreação, enquadrado na classe 2 segundo (CONAMA nº357/05). O objetivo do estudo é analisar a qualidade da água de um açude em Vargem Grande por meio dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos com a realização de coletas em cinco pontos distintos no período chuvoso e seco, determinando os parâmetros físico-químicos (Turbidez, EC, pH, OD, nitrito, nitrato), Multiparâmetro HANNA, método Winkler para OD, espectrofotometria para NO₂- e NO₃- e as análises bacteriológicas pelo método Colilert (PHA,2005). Os resultados obtidos nas amostras da água variaram entre (19,7 °C a 22,30°C) para temperatura e apresentaram faixa de pH entre (7,71 a 8,63) o que caracteriza alcalinidade. A concentração do OD variou entre (6,85 a 7,2 mg/L); a condutividade (82 a 105 µS/cm); NO₂-(<0,01 a 0,01); NO₃-(<0,01 a 0,3); turbidez entre (2,18 a 9,18 NTU) e para bacteriologia, todos foram detectado presença de Escherichia coli. Considerando as resoluções nº274/00 e nº357/05 CONAMA, a qualidade da água está própria para balneabilidade.

A MONITORIA ACADÊMICA NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM DO CURSO DE ENFERMAGEM

COSTA, Shirley Marina Ribeiro*; FERREIRA, Ana Maria Nunes; ANDREADE, Izabelle Socorro Costa Mota; LIMA, Sara Fiterman; NORONHA, Francisca Maria Ferreira Noronha

Email: shirleymarina780@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A monitoria possibilita ao aluno a oportunidade de preparação como futuro docente, pois o processo de ensino e aprendizagem trás a responsabilidade de planejar e organizar-se como um acadêmico instrutor e auxiliador. Esse exercício de estudo do conteúdo contribui para que o monitor adquira conhecimentos, preparando-se de melhor forma para vivenciar o compartilhamento dessas informações com outros discentes, em sala de aula. Objetiva-se com este estudo relatar o olhar do acadêmico de enfermagem sobre a monitoria no processo de ensino e aprendizagem em uma instituição de ensino superior do Maranhão. A monitoria é realizada uma vez por semana em espaço da própria instituição, como laboratório e sala de aula. Os encontros presenciais acontecem sob a supervisão e orientação de um docente e, são realizadas atividades inerentes ao conteúdo passado pelo professor com posterior revisão complementar pelo monitor que deve tornar-se apto para repassar informações, esclarecer

possíveis dúvidas. Durante o processo de ensino e aprendizagem o monitor tem oportunidade de refletir sobre a importância de seu papel. Destaca-se este momento como aspecto positivo e de impacto na formação acadêmica do aluno-monitor. A aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e o contato com a rotina do docente também são experimentações advindas da monitoria acadêmica com reflexo na formação profissional.

ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO NA CLÍNICA ESCOLA DA UNIVERSIDADE CEUMA

CORDEIRO, Ludimila Masette*; CALDAS, Érica Alessandra;

Curso: Fonoaudiologia

Email: ludimila.masette@hotmail.com

A perda auditiva caracteriza-se por uma diminuição na capacidade de se perceber os sons. Em relação ao gênero, estudos apontam que as mulheres possuem audibilidade melhor que os homens. Nesse sentido, é de suma importância analisar as características audiológicas em indivíduos do sexo masculino. Objetivo: Analisar os achados audiológicos em pacientes do sexo masculino que realizaram exames na Clínica Escola da Universidade Ceuma no ano de 2015. Métodos: Foi realizado um estudo do tipo descritivo retrospectivo, transversal com uma abordagem quantitativa. Foram analisados 93 exames, todos de pacientes do sexo masculino. Resultados: Num total de 240 exames realizados na Clínica Escola no ano de 2015, 93 exames são do sexo masculino, com faixa etária entre 5 a 80 anos de idade, sendo em sua maioria com limiares auditivos normais para a média tritonal, e em segundo lugar, aparecem as perdas neurossensoriais, sendo em sua maioria bilaterais e de grau profundo. Conclusão: Diante desses dados, conclui-se que os achados audiológicos do sexo masculino na Clínica Escola da Universidade Ceuma, obtiveram como resultados em sua maioria normais e tiveram como maior perda, a neurossensorial de grau profundo, podendo ter múltiplas causas, dependendo da faixa etária, tais como: PAIR, hereditariedade, otites, genéticas e presbiacusia.

AUTISMO, PSICANÁLISE E MÚSICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL

SOUSA, Karen Regina Pinto*; SOUZA, Marina Batista; PRAZERES, Adrienne; PEREIRA, Maria do Socorro Santos; RODRIGUES, Sandro Eduardo; SILVA, Mae Soares

Email: karensousap@gmail.com

Área / Especialidade: Psicologia

O autismo foi definido pela primeira vez em 1943, por Leo Kanner, que, em 1956, destacou apenas dois sintomas considerados patognomônicos: o isolamento autístico e a necessidade de imutabilidade. Nas últimas décadas, os critérios diagnósticos para o autismo tiveram uma

ampliação considerável, assim como os dispositivos de tratamento. O presente estudo pretende tecer reflexões a respeito do tratamento oferecido aos sujeitos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tomando por base uma pesquisa realizada no município de São Luís – MA (Aprovação do CEP nº 766726), entre 2014 e 2015, na qual um ateliê musical foi oferecido como proposta de tratamento para crianças diagnosticadas com TEA. A partir da Psicanálise podemos pensar o autismo como consequência de uma falha no estabelecimento do laço entre a criança e outro, uma falha na instauração do circuito pulsional. Considerando que caberia ao psicanalista, com base na transferência, intervir na instauração das estruturas que suportam o funcionamento do inconsciente, coube-nos pensar a música como um agente catalisador do processo transferencial. A pesquisa buscou avaliar como a música pode favorecer o desenvolvimento da linguagem e a intensificação de laços sociais em crianças diagnosticadas com TEA. Os resultados obtidos com a utilização da música corroboram os de outras pesquisas, que demonstram a necessidade do emprego de uma pluralidade de abordagens no tratamento do autismo, no intuito de favorecer a autonomia dos sujeitos, proporcionando um tratamento com a ativa participação das crianças e seus familiares.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VIVO DO ÓLEO ESSENCIAL DE SYAGRUS CORONATA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS

BARROS, Thayná Fernandes*; SANTOS, Joice Castelo Branco; SANTOS, Bruno Souza; FILHO, Clovis Macedo Bezerra; PAIVA, Patrícia Maria Guedes; SILVA, Luís Cláudio Nascimento; SILVA, Márcia Vanusa

Email: thata.fernandesbarros@hotmail.com

Área / Especialidade: Farmácia

Syagrus coronata é uma espécie vegetal de extrema importância na economia de comunidades do nordeste devido sua grande aptidão biotecnológica (principalmente de seus óleos). Recentemente, nosso grupo demonstrou a atividade anti-*Staphylococcus* do óleo essencial de *S. coronata*, que é capaz de inibir linhagens de *S. aureus* multirresistentes. Neste trabalho foi avaliada a ação antimicrobiana in vivo do óleo essencial extraído de folhas de *Syagrus coronata* utilizando larvas de *Galleria mellonella* como modelo. Folhas de *Syagrus coronata* foram coletadas no Parque Nacional do Catimbau, área de preservação da Caatinga (Buíque, Pernambuco). O óleo essencial foi obtido através da técnica de hidrodestilação. Larvas de *Galleria mellonella* foram infectadas com 10 µL de uma suspensão de *S. aureus* ATCC 25923 (1,0 x 10⁵ UFC em PBS), através de injeção na região próxima à última “pro-leg” esquerda. Após 2 horas, o óleo essencial (10 µL) foi adicionado na concentração de 624 µg/mL. Larvas inoculadas apenas com a linhagem ou PBS foram usadas como grupos-controle. As larvas foram mantidas

à 37°C e as taxas de mortalidade e de bactérias na hemolinfa foram medidas diariamente. Após 3 dias de infecção todas as larvas estavam mortas no grupo sem tratamento, enquanto óleo aumentou a viabilidade das larvas em 60%. As larvas tratadas com o óleo também apresentaram menores taxas de bactérias na hemolinfa. Os resultados deste trabalho reforçam o potencial terapêutico do óleo essencial de *Syagrus coronata* e sua possibilidade de uso para desenvolvimento de novos agentes antibacterianos.

AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM UM GRUPO DE IDOSAS

<mailto:michellecrys14@hotmail.com>

LIMA, Uiana Fábria da Cruz*; CALDAS, Érica Alessandra; CALDAS, Patricia Andreia.

Curso: Fonoaudiologia

Email: limauifabia@hotmail.com

O envelhecimento ocorre concomitantemente com a evolução cronológica, ou seja, os fenômenos biológicos, associados aos psíquicos e sociais importantes para a percepção da idade. O processo de envelhecimento no indivíduo ocasiona o declínio de certas funções orgânicas entre elas, as habilidades auditivas de detecção, memória, localização, entre outras. A necessidade de pesquisar e realizar o diagnóstico precoce do DPA em idosos torna-se de importância fundamental para a qualidade de vida desta faixa etária, já que, a partir do momento em que diagnosticada, o Treinamento auditivo é a alternativa que gera melhora significativa no comportamento. A pesquisa apresentou como objetivo identificar possíveis alterações de memória, localização e sequencialização sonora em um grupo de idosas. Este trabalho está vinculado ao projeto “Processamento Auditivo Central em Idosos” aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Ceuma, segundo o parecer substanciado nº1.632.370. Foi realizado estudo transversal, quantitativo, prospectivo, com base em amostra aleatória composta por 14 idosas participantes de um grupo, do sexo feminino com idade acima de 50 anos apresentando acuidade auditiva dentro dos padrões de normalidade ou déficit auditivo leve. Foi aplicado o teste diótico para triagem do Processamento Auditivo Central (PAC). Os dados foram analisados através de estatística descritiva e os resultados demonstram que existe um índice significativo da prevalência de alteração das habilidades auditivas testadas para os idosos acima de 50 anos.

ASSOCIAÇÃO ENTRE A HIGIENE ORAL E HÁBITOS DIETÉTICOS E A CÁRIE DA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTUDO DE COORTE

SILVA, Caroline Araujo*; FIALHO, Remy Rodrigues da Silva; FERNANDES, Juliana de Kássia Braga; MARTINS, Rafiza Felix Marão.

Curso: Odontologia

Email: cacsaraujo@hotmail.com

A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) define Cárie da Primeira Infância (CPI) ou Early Childhood Caries (ECC), como a presença de um ou mais dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou não), perdidos (devido à cárie) ou restaurados com 71 meses de idade ou mais jovem. Dentre os fatores associados listados na literatura estão à higiene oral deficiente, consumo de doces e uso de mamadeira noturna. Considerando a CPI como um importante problema de saúde pública, objetivo desse trabalho foi avaliar a associação de possíveis fatores causais, relativos à higiene e a dieta, com a doença. Método: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo a partir de uma amostra de 1861 crianças de 12 a 32 meses. As diferenças nas frequências foram estimadas por meio do teste Qui-Quadrado, bem como entre médias por meio do teste de Mann-Whitney. As associações foram estimadas por risco relativo (RR) com intervalos de confiança a 95% (IC95%). Resultados: Dentre as variáveis analisadas, o “Sangramento gengival” e o “Índice de Placa Visível (IPV)” foram associados a CPI ($P < 0,05$). As variáveis “Acrescenta açúcar nos alimentos”, “Mamadeira noturna”, “Frequência de escovação”, “Escovação noturna” e “Dentifício” não demonstraram associação. Conclusão: Nesse estudo, as variáveis que se mostraram associadas à CPI foram às relativas à higiene oral; as variáveis de hábitos dietéticos, não interferiram na doença. Este último achado pode ter sofrido viés em função da metodologia empregada para coleta desse dado. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HU/UFMA (parecer nº 223/2009).

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIBIOFILME DE SENNA SPLENDIDA CONTRA ISOLADOS CLÍNICOS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

SANTOS, Joice Castelo Branco*; BARROS, Thayná Fernandes; DA SILVA, Tiago Fonseca; DA SILVA, Márcia Vanusa; CORREIA, Maria Tereza dos Santos; DA SILVA, Luís Cláudio Nascimento; MONTEIRO, Andrea de Souza

Curso: Biomedicina

Email: joic.cast@hotmail.com

Staphylococcus aureus é um patógeno com capacidade elevada de produzir fatores de virulência e adquirir resistência aos antimicrobianos. Logo, há necessidade de desenvolver novas estratégias anti-S. aureus. Senna splendida é uma espécie endêmica da Caatinga que pertence à família Fabaceae. Ainda não há relatos de seu uso para fins terapêuticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação antimicrobiana e antibiofilme de diferentes extratos provenientes de folhas de S. splendida contra isolados clínicos de S. aureus. Folhas de S. splendida foram

coletadas no Parque Nacional de Catimbau (Buíque, Pernambuco). O material foi submetido à extração no aparelho Soxhlet seguindo a série eluotrópica, originando os extratos: ciclohexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol. Foram determinadas as concentrações mínima inibitória (CMI) e bactericida (CMB) de cada extrato contra a linhagem padrão de *S. aureus* ATCC 25923 e cinco isolados clínicos. A atividade antibiofilme foi avaliada contra as seis linhagens utilizando concentrações subinibitórias dos extratos ativos (CMI/2 e CMI/4). Os extratos metanólicos e acetato de etila inibiram todas as linhagens com valores de CMI de 0,78 mg/mL e 1,56 mg/mL, e CBM de 1,56 mg/mL e 3,12 mg/mL, respectivamente. Estes resultados denotam uma ação bactericida de ambos os extratos. Os extratos foram inibiram significativamente a formação do biofilme em concentrações subinibitórias. Os melhores valores foram encontrados utilizando o extrato de acetato de etila. Este trabalho destaca o potencial anti-*S. aureus* de *S. splendida*, encorajando novos estudos para identificar composto(s) ativo(s) e elucidar o(s) mecanismo(s) de ação envolvido(s).

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO BRUTO DE AMENDOEIRA DA PRAIA (TERMINALIA CATAPPA L.) CONTRA CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE

DUTRA, Rodrigo Bênetton da Conceição*; FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo; SABBADINI, Priscila Soares;

Curso: Biomedicina

Email: bennetton_89@hotmail.com

Terminalia catappa L., também conhecida como amendoeira da praia e amêndoa, é uma árvore tropical nativa das florestas da Índia, sendo também encontrada no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste. Estudos farmacológicos diversos confirmam sua capacidade anti-inflamatória, antidiabética, antioxidante, hepatoprotetora, anticancerígena e antimicrobiana, corroborando com o uso tradicional. Devido a utilização indiscriminada de antibióticos e a contínua resistência dos micro-organismos às drogas de escolha para o tratamento, estudos relacionados a novos compostos antimicrobianos são necessários. A fim de avaliar a atividade antibacteriana contra amostras de *Corynebacterium diphtheriae* isoladas no Maranhão de casos de difteria, doença que acomete primariamente o trato respiratório, extrato bruto hidroalcoólico (EBH) foi obtido das folhas secas da amendoeira após maceração com etanol 70%. O EBH (92mg/ml), utilizando-se o método de ágar difusão preconizado pelo CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) para antimicrobianos, foi efetivo em diferentes graus e independente da produção de toxina diftérica pelas amostras, na inibição de todas as bactérias testadas: MA23 (28,50±0,5mm), MA52 (27,00±0mm), MA131 (31,00±1mm), MA136 (34,00±1mm), MA150 (16,00±1mm), ATCC 27010 (26,00±1mm) e ATCC 27012 (24,00±1mm). Os

resultados acima validam outros estudos relacionados a capacidade antimicrobiana das folhas de amendoeira, mas contra o agente etiológico da difteria.

AVALIAÇÃO PÓS TRATAMENTO ENDODÔNTICO ÚNICA OU DUAS SESSÕES EM DENTES PERMANENTES COM PERIODONTITE APICAL CRÔNICA

SILVA, Amanda Matos Maia*; FALCÃO, Tércia Virginia; LEAL, Adriana Mara de Araújo; RIZZI, Cláudia de Castro; FILHO, Etevaldo Matos Maia

Email: amandinhaf11@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O reparo das lesões periapicais crônicas pode ser influenciado por inúmeros fatores, dentre os quais podemos citar a técnica selecionada para o tratamento. A pesquisa teve como objetivo avaliar, por meio do exame de radiografia periapical, o reparo das lesões periapicais 24 meses após a realização do tratamento endodôntico realizados em única ou duas sessões com uso de hidróxido de cálcio. Entre os autores estudados não houve um consenso sobre qual técnica teria um resultado mais favorável ao tratamento. Foram selecionados 10 pacientes, com dois dentes necessitando de tratamento endodôntico e com lesão periapical crônica, que procuraram a Clínica de Endodontia do Curso de Odontologia da Universidade Ceuma, na cidade de São Luís. Em cada paciente, em um dente o tratamento realizado foi em uma única sessão, ou seja, os dentes foram instrumentados, obturados e restaurados na mesma sessão, enquanto que o segundo dente, após a instrumentados, foram submetidos à medicação com pasta à base de hidróxido de cálcio por 14 dias. Decorrido esse período, o curativo foi removido e o canal radicular obturado e o dente restaurado. As radiografias foram realizadas antes, 12 e 24 meses após o tratamento e foi analisada a redução no tamanho da lesão comparando por meio da medida de área. Após avaliação radiográfica, no período de 24 meses, houve uma redução significativa da lesão entre as medidas iniciais, no entanto, não houve diferença significativa entre as técnicas empregadas. As duas técnicas provocaram redução significativa da lesão sem, no entanto, apresentar diferença entre elas. CEP: 29.058/2013

AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA DOENÇA PERIODONTAL EM PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA UNICEUMA

DA SILVA, Bruna Letícia Rosa*; MOUCHERECK, Adriana Quinzeiro; MENDES, Saulo José; PEREIRA, Domingos Magno Santos; FERNANDES, Elizabeth Soares

Curso: Odontologia

Email: brunarosa_sl@hotmail.com

A doença periodontal é caracterizada por placas subgengivais e por uma série de alterações inflamatórias no periodonto, com destruição tecidual em decorrência da liberação de diversos mediadores inflamatórios. São poucos os estudos sistemáticos de severidade da doença e portanto, dados acerca deste parâmetro são relevantes para para que se possa identificar e contribuir para a criação de estratégias de saúde individuais e comunitárias de prevenção, tratamento e controle da doença periodontal. Avaliou-se 28 pacientes com doença periontal atendidos na Clínica Uniceuma em São Luís, e classificou-se os mesmos em relação à severidade da doença, através de uma pesquisa de campo observacional, exploratória, documental e de abordagem quantitativa. Os pacientes foram avaliados clinicamente e classificados quanto à severidade da doença periodontal através da avaliação do periograma, índice de nível gengival, índice de placa e radiografias periapicais. Observou-se que 39% dos pacientes avaliados apresentam periodontite crônica leve, sendo 8 mulheres e 7 homens; com idade média de 32 anos. Ainda, 21% dos pacientes apresentam periodontite crônica moderada, acometendo apenas mulheres com idade média de 38 anos. Por outro lado, 39% dos pacientes apresentam periodontite crônica severa, acometendo 8 mulheres e apenas 3 homens, com idade média de 45 anos. Estudos anteriores sugerem que a doença periodontal acomete homens de forma mais severa. Entretanto, observou-se que a doença periodontal acomete um número maior de mulheres, independente da serevidade da doença. Estudos acerca dos fatores influenciadores desta incidência são necessários afim de se definir o melhor manejo da doença de pacientes atendidos pela clínica.

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE MEIOS DE TRANSMISSÃO E TRATAMENTO DA HANSENÍASE

MARQUES, Mônica Victória Duarte*; PIMENTEL, Ysla Vieira; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; GONÇALVES, Maria Claudia

Curso: Farmácia

Email: monica.vic77@gmail.com

Atualmente, o serviço de Atenção Básica de Saúde tem suporte para fazer o diagnóstico simplificado na hanseníase. No entanto, faz-se necessário que a população conheça a hanseníase para que possa procurar assistência à saúde precocemente. Esta pesquisa objetivou analisar o conhecimento dos usuários da Unidade da Família Pirapora sobre os meios de transmissão da hanseníase. Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e transversal, realizado na sede da Unidade de Saúde da Família Pirapora na cidade de São Luís – MA, onde foram selecionados uma amostra de 50 usuários do serviço de atenção básica, de ambos os

gêneros, com idade superior a 18 anos. Os dados foram obtidos através de ficha de avaliação sociodemográfica e questionário validado sobre o conhecimento de hanseníase. O estudo foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa pelo parecer número 516.267. A amostra foi composta em sua maioria por usuários do gênero feminino (66,7%), a mediana de idade foi de 36 (19-60) anos, 93,3% dos usuários já ouviram falar de hanseníase e 25% relatou já ter tido contato com um portador da doença. Quanto aos meios de transmissão, 46,7% indicaram contato com objetos pessoais, 43,3% por contato com a pele, 31,7% pelo sistema respiratório, 23,3%, por hereditariedade e outros 23,3% indicaram a relação sexual. No que se refere a eficácia do tratamento, 83,3% concluíram que há cura após a conclusão do tratamento. O presente estudo indica que a maioria dos pesquisados, embora saiba que hanseníase tem cura, desconhecem os verdadeiros meios de transmissão desta doença.

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DA ROMÃ EM CAMUNDONGOS COM LESÃO PULMONAR AGUDA

GONÇALVES, Jaciara Sá*; PINHEIRO, Aruanã Joaquim Matheus Costa Rodrigues; ALVES, Ádylla Willena; NETO, Lídio Gonçalves Lima; DE SOUSA, Eduardo Martins

Curso: Farmácia

Email: jaci_sag@hotmail.com

A inflamação é um processo essencial e natural do organismo em resposta a um agente de infecção. Relaciona-se com o aumento de proteínas inflamatórias, tais como, fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), interleucina 10 (IL-10) e com extravasamento de albumina. Este trabalho avaliou o efeito da fração acetato de etila (AcOEt) obtida a partir da folha de *Punica granatum* L. (romã) sobre as citocinas inflamatórias e os níveis de albumina em camundongos com inflamação pulmonar aguda (LPA). Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão do CEUMA Universidade de Ética sob o protocolo número 107/14. Camundongos Swiss machos (4-8 semanas) receberam uma administração oral com veículo (PBS; 10 ml / kg), AcOEt (30, 100 e 300 mg / kg), ou dexametasona (5 mg / kg) 1 hora antes da indução da inflamação (30.000 IU / 10 mg / 50 mL / animal (25 ul / narina) por lipopolissacarídeo (LPS), obtido a partir de *Pseudomonas aeruginosa* por instilação intranasal. Seis horas após a indução, os animais foram anestesiados e o lavado broncoalveolar (LBA) foi colhido por punção traqueal. Os níveis de TNF- α e IL-10 no LBA foram quantificados por ELISA e albumina foi avaliada pelo reagente Bradford. Os níveis de albumina diminuíu pelo tratamento com AcOEt (100 mg / kg), ou dexametasona. Por outro lado, os níveis da proteína TNF- α não foram alterados em camundongos tratados com AcOEt. Conclui-se que AcOEt da romã pode ser utilizada para tratar doenças inflamatórias, considerando que o extrato reduziu o extravasamento de proteínas do plasma.

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA DE MANICURES NOS DISTRITOS SANITÁRIOS COROADINHO E TIRIRICAL, SÃO LUÍS-MA

ALMEIDA, Isabella de Sousa*; CARVALHO, Alan Costa; FELIPE, Ilana Mirian Almeida; NUNES, Serlyjane Penha Hermano

Curso: Enfermagem

Email: isabella.s.a@hotmail.com

A imagem pessoal e beleza, sempre foram uma preocupação entre homens e mulheres. Práticas de embelezamento como retirada de cutículas pelos serviços de manicure e pedicure, podem ser consideradas um fenômeno social e coletivo, popular entre os brasileiros. Porém, os serviços de biossegurança são essenciais nesta prática, pois sem eles, aumentam os riscos de contágio de vírus: HBV, HCV e HIV. O objetivo deste trabalho foi avaliar os procedimentos de biossegurança adotados por manicures e pedicures em salões de beleza. Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo de corte transversal. A pesquisa foi realizada nos salões de beleza dos Distritos Sanitários Coroado e Tirirical, do município de São Luís, MA. A pesquisa foi aprovada pelo CEP de nº 072572/2013. A amostra da pesquisa foi constituída por 25 manicures/pedicures. De acordo com a análise dos dados, observou-se que (92%) dos estabelecimentos não possuíam pia exclusiva para lavagem dos instrumentais, (60%) não realizavam desinfecção em solução apropriada, (52%) dos salões possuíam lixeira com tampa. Ao que se refere à percepção dos entrevistados sobre os riscos a que estão expostos e adoção de medidas de biossegurança, (68%) afirmou saber que pode adquirir alguma doença de seus clientes; (60%) disse saber que pode transmitir doenças; (76%) afirmou lavar as mãos entre os clientes; (100%) afirmou usar luvas descartáveis. Faz-se necessária que haja um maior incentivo para que esses profissionais sejam preparados da maneira correta em cursos, para prevenção de infecções nesses serviços. Descritores: Beleza. Centros de embelezamento e estética. Exposição a agentes biológicos.

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA EM SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO BATALHÃO CPE – ROTAM

DA SILVA, Caroline ferreira*: MOREIRA, Maria de Narazé Freitas; CALDAS, Erica Alessandra;

Curso: Fonoaudiologia

Email: nazarefreitas02@hotmail.com

Introdução: A exposição ao ruído constitui um dos principais problemas de saúde ocupacional e ambiental na atualidade, sendo o agente físico nocivo mais frequentemente encontrado no ambiente de trabalho. Método: Foi realizado estudo transversal, prospectivo, quantitativo com aplicação de uma avaliação audiológica tonal, vocal e imitanciometria em 15 policiais militares sendo do gênero masculino e do feminino, com idades de 23 a 45 anos, com média de tempo

de serviço de dois anos. Resultados: Foi possível identificar rebaixamento nos limiares audiométricos nas frequências altas (3 e 6 kHz) em 39% dos casos. Conclusão: A partir da análise dos dados audiológicos foi possível verificar que os policiais militares estão mais suscetíveis a desenvolver a perda auditiva. Sendo assim, nota-se a necessidade de implementação de programa de conservação auditiva para os policiais militares. Palavras-chaves: Policia, Perda Ocupacional, Ruído

AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA INTEGRIDADE MARGINAL DE RESTAURAÇÕES RESINOSAS EM DENTES BOVINOS: COMPARAÇÕES DE TÉCNICAS.

SAMPAIO, Ruan Ferreira*; DIAS, Laércio Santos cpf 650.210.293-04; FIALHO, Melissa Proença cpf 644 799 433-15; CARNEIRO, Profa. Dra. Karina Kato Gama cpf 513.113.212.68; LEAL, Profa. Dra. Adriana Mara Araújo cpf 615.229.533.-53;

Curso: Odontologia

Email: sampaio@hotmai.com

Apresentação de painel ilustrado demonstrando a avaliação e o selamento marginal de diferentes resinas compostas por meio de corante em cavidades classe I de dentes bovinos, para comparar os métodos de inserção: incremental oblíqua e incremento único. Foram selecionados aleatoriamente 20 incisivos bovinos (n=5) para confecção de preparos Classe I (4x4x3mm) com broca carbide 245. Os grupos foram divididos em: Grupo I- Resina Filtek Z350 (3M ESPE) Incremental Oblíqua (2mm), Grupo II- Resina Filtek Z350 (3M ESPE) Incremento único, Grupo III- Filtek Bulk fill (3M ESPE) Incremento único, Grupo IV- Filtek Bulk fill (3M ESPE) Incremental Oblíqua (2mm). Resultados: avaliando as diferentes resinas na mesma técnica, a resina Z350 (25,41%) foi insatisfatória em relação à Bulkfill na técnica de único incremento ($p>0,05$).

CARACTERIZAÇÃO DAS HABILIDADES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO

PEREIRA, Thassia Mayara De Abreu*; SOARES, Emerson Ribeiro; CAPELLINI, Simone Aparecida; GIACHETI, Célia Maria; CALDAS, Patricia Andréia; CALDAS, Erica Alessandra

Curso: Fonoaudiologia

Email: mayara_abreu09@hotmail.com

Desnutrição é uma das principais causas de morbidade/mortalidade infantil, a prevalência no Brasil diminuiu, porém o percentual de óbitos continua aproximadamente 20% (OMS preconiza <5%), é um problema de saúde pública, principalmente nas regiões Norte/Nordeste, área rural e periferias. Estudos avaliaram a prevalência da desnutrição em crianças menores de cinco anos e a forma crônica prevaleceu, Norte/Nordeste apresentaram as taxas mais elevadas. O IDH baixo

contribui para isto, parte da população não dispõe de recursos para alimentação adequada. Considerando que a desnutrição provoca efeitos nocivos ao SNC, reflete-se como as habilidades do PAC podem ser afetadas, pois compreende habilidades auditivas realizadas pelo SNC. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética na UNESP de Marília (SP), sob o protocolo nº 0551/2012. Caracterizou-se as habilidades auditivas de 10 crianças desnutridas, de 6 a 9 anos. Avaliou-se a audição periférica e central. 10% delas apresentaram perda auditiva, sendo excluídas, 100% dos demais responderam os testes de localização sonora adequadamente, 77,77% apresentaram TMSV alterado, 88,88% TMSnV alterado, 11,11% PSI-MCC alterado, PSI-MCI alterado: (F/R)=0 11,11% , F/R= -10 33,33% e F/R= -15 33,33%. Concluiu-se que crianças desnutridas apresentam alterações nos mecanismos fisiológicos auditivos de discriminação de sons em sequências e reconhecimento de sons verbais em escuta monótica e dicótica; nas habilidades auditivas de ordenação temporal, figura-fundo para sons verbais e associação de estímulos auditivos e visuais e prejuízo nos processos gnósticos de ordenação e codificação.

COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: UMA VISÃO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL

SILVA, Francineide Aires Castro da; AZEVEDO, Yanne Luna de

Curso: Psicologia

Email: franciaires3.5@hotmail.com

Resumo : COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: UMA VISÃO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL Francineide Aires Castro¹ Yanne Luna² RESUMO Este trabalho objetiva discutir sob a luz da Análise do Comportamento e do modelo de seleção por consequências, discutir os fatores que levam um adolescente a se envolver em atos infracionais. Na revisão de literatura apresentamos as contingências envolvidas no processo de formação do repertório comportamental destes indivíduos, principalmente comportamentos antissociais, que são protótipos de atos delinquentes. Apontamos as práticas educativas parentais como um instrumento de modificação de comportamentos indesejados e de instalação de comportamentos pró sociais. Tratou-se de uma pesquisa documental de caráter descritivo e analítico, foi realizada na F.U.N.A.C, através do estudo dos dossiês de 3 três educandos. Os documentos, que contêm dados detalhados da história de vida dos adolescentes, foram analisados a partir da identificação de aspectos ontogenéticos e culturais de suas vidas, possivelmente relacionados com o desenvolvimento de comportamentos antissociais e, posteriormente, atos infracionais. Os resultados demonstraram forte relação entre a dificuldade no estabelecimento de limites por parte dos responsáveis, e uso excessivo de punição física e verbal (aspectos ontogenéticos); bem como o envolvimento com grupos desviantes (aspectos

culturais), com o desenvolvimento de comportamentos antissociais e, posteriormente, envolvimento em atos infracionais. Concluímos que os adolescentes tem como aspectos ontogenéticos na instalação de comportamentos antissociais dificuldades de interação familiar, propomos práticas educativas de habilidades sociais através dos princípios básicos da Análise do Comportamento. 1- Autora 2- Orientadora Obs: Trabalho sem número parecer do CEP por ser pesquisa documental.

CONHECIMENTO DOS POLÍTICOS QUANTO AO USO DA VOZ

RODRIGUES, Tuanne Morais*; FERRAZ, Pablo Rodrigo Rocha

Email: tuannemorais.rd@hotmail.com

Curso: Fonoaudiologia

Resumo: A utilização da voz profissionalmente deve ser realizada de maneira adequada ao que a profissão exige, seja falada ou cantada. Além disso, é fundamental o conhecimento de como usa-la corretamente para um bom desempenho e aprimoramento na qualidade vocal. A ausência desses conhecimentos e do acompanhamento por profissionais preparados pode causar um quadro de disfonia. Dessa forma, o objetivo deste estudo é investigar as informações que os deputados estaduais do Maranhão possuem com relação ao uso profissional da voz, através de um estudo analítico-descritivo e transversal. A pesquisa será realizada com os deputados estaduais do Maranhão de ambos os sexos, em exercício do seu mandato político por mais de um ano de atividade profissional, que não apresentar lesões de laringe diagnosticada pelo Otorrinolaringologista e não realizar acompanhamento fonoaudiológico. Os participantes serão avaliados por meio de um questionário do tipo semiestruturado composto por 23 questões que aborda perguntas sobre os riscos vocais, atuação como profissional da voz e atuação do fonoaudiólogo em voz profissional. Espera-se com o resultado que os deputados estaduais do Maranhão possuam conhecimentos sobre os aspectos que envolvem o uso profissional da voz. Esta pesquisa obteve aprovação do CEP da Universidade CEUMA sob o número 1.674.327. A análise dos resultados estarão concluídas até a realização do Congresso de Saúde e Bem-Estar. Palavras-chave: Disfonia. Qualidade da voz. Qualidade de vida. Fonoaudiologia.

CORRELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE COGNIÇÃO, O MEDO DE QUEDAS, E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS

FERREIRA, Aline de Sousa Santos; VIEIRA, Bernarda dos Santos; CAMARA, Aline Maciel; BASTO, Raimunda Santos; OLIVEIRA, Amanda Juliana Araújo; VIEIRA, José Newton Lacet; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: fisioterapia

Email: net_vieira@hotmail.com

Área / Especialidade: Fisioterapia

Resumo: Introdução: As quedas e o medo de quedas são condições que podem gerar desfechos graves à saúde dos idosos e possuem fatores de risco compartilhados, podendo levar os indivíduos com tais condições a um ciclo vicioso de declínio funcional, isolamento social, descondicionamento físico, alteração de equilíbrio e marcha, perda da confiança, entre outros, aumentando o risco de quedas e o medo destas. Objetivo: Correlacionar a cognição, o medo de quedas, e a prática de atividade física em idosos comunitários. Material e Métodos: Estudo analítico, transversal quali-quantitativo, envolvendo 20 idosos comunitários, no mês de maio de 2016, realizado na Associação Comunitária da Vila Cruzado. Foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental, para avaliação do estado cognitivo; e verificada a entrevista por meio da Falls Efficacy Scale- International- Brasil Total (FES-I-Brasil Total), para avaliação do medo de cair. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o parecer de nº 1.516.257/2016. Resultados: Na análise da correlação entre cognição e medo de cair foi utilizada a correlação de Spearman com $p \leq 0,05$. Foi verificada relação positiva e moderada ($\rho = 0,211$) entre cognição e medo de quedas, entretanto essa relação não se mostrou estatisticamente significativa ($p = 0,346$). Conclusão: Há uma relação diretamente proporcional entre a cognição, o medo de quedas e a prática de atividade física em idosos comunitários. Palavras-chave: Cognição, Acidentes por quedas, Idoso.

CORRELAÇÃO ENTRE O PESO CORPORAL, A FORÇA MUSCULAR, E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS

OLIVEIRA, Amanda Juliana Araújo; SOUZA, Dienny De Jesus Rodrigues de; MOREIRA, Lôide Nogueira; NETA, Maria Das Mercês Costa Melo; SILVA, Juliana Vieira; LACET, José Newton; VIEIRA, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Email: amandajulianaao@hotmail.com

Resumo : Introdução: Numerosos estudos têm demonstrado que, com estímulos adequados de força, idosos de ambos os sexos apresentam ganhos na força muscular semelhantes. Todavia, a maioria destes estudos sobre o efeito da atividade física na força muscular dos idosos baseiam-se em protocolos de treino intensivo específico de funções isoladas, sendo menos frequentes os estudos que utilizam programas de atividade física generalizada. Objetivo: Verificar a correlação entre o peso corporal, a força muscular, e a prática de atividade física em idosos comunitários. Material e Métodos: Estudo analítico, transversal quali-quantitativo, envolvendo 20 idosos

comunitários, no mês de maio de 2016, realizado na Associação Comunitária da Vila Cruzado. Foi utilizada uma balança da marca CAMRY para verificação do peso corporal das pessoas idosas, e a avaliação da força muscular máxima de preensão manual, com uso do Dinamômetro de Preensão Manual Palmar. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o parecer de nº 1.516.257/2016. Resultados: Na análise da correlação entre peso corporal e força muscular foi utilizada a correlação de Spearman com $p \leq 0,05$. Foi verificada relação positiva e fraca ($p = 0,072$) entre peso corporal e força muscular, entretanto essa relação não se mostrou estatisticamente significativa ($p = 0,751$). Conclusão: Verificou-se que há uma relação diretamente proporcional entre o peso corporal e a força muscular, entretanto devido a pequena amostra, é preciso realização de outros estudos com uma maior população de idosos. Palavras-chave: Peso Corporal, Força muscular, Idoso.

CONSIDERAÇÕES PSICANALÍTICAS SOBRE A HISTERIA NA SURDEZ

SILVA, Alana Santos*; HALABE, Dannilo.

Curso: Psicologia

Email: eualanasantos@gmail.com

Este estudo é resultado de uma pesquisa, cujo o objeto é a histeria com a surdez, uma noção clássica da psicanálise, a partir de um caso de uma adolescente surda. O presente artigo aborda a histeria dentro de uma perspectiva de surdez, pensando na inclusão, trazendo o discurso desses indivíduos surdos. A histeria que por sua vez, reside na ideia de que os conflitos psíquicos vem do inconsciente, simbolizados em sintomas corporais foi o motivo principal da teoria freudiana, que a princípio atendia as vozes das mulheres históricas da época, no sentido de ampara-las. Foi analisado as formas de atender esses ditos-cujos a partir da psicanálise, posteriormente, mostrando a possibilidade de trabalhar com esses sujeitos e como forma de atualização da teoria no sentido que leve os estudantes da área a repensar conceitos e a viabilização de incluir essa nova demanda, que é a surdez dentro da clínica psicanalítica. A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa e os dados foram obtidos por meio de entrevistas. Os resultados revelaram que é possível sim, atender indivíduos surdos com o método psicanalítico. Diante disso entendemos que é de grande relevância fazer novos estudos baseados nas demandas contemporâneas incluindo a surdez.

CORPO PENSAnte, DANÇAR PARA EDUCAR: O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA CORPORAL NA ESCOLA.

MENDES, Priscilla Costa*; CUTRIM, Fernando Martins.

Curso: Psicologia

Email: pcm_vel@hotmail.com

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de elucidar a compreensão acerca do corpo com foco nos efeitos e na ação do corpo que dança, e de sua relação com a psique, o meio social, a saúde e a educação, para assim discutir a proposta principal que é o desenvolvimento da expressividade do corpo que dança na escola e sobre as formas de trabalhar esse corpo dentro do âmbito escolar, métodos e sobre a formação profissional de quem está apto a ensinar a dançar e a explorar o corpo da melhor maneira dentro da escola, perante a aprovação da dança como componente curricular obrigatório nas escolas. Para chegarmos a esse entendimento se faz necessário uma compreensão científica do corpo, de sua fisiologia do movimento além da compreensão histórica do homem, desde o surgimento da necessidade de movimentar o corpo e de como essa movimentação evoluiu e se articulou até os dias atuais, levando em consideração também as contribuições da formação pela aprendizagem, social, familiar e cultural, que também compõe o desenvolvimento humano, como forte fator na maneira como o homem irá se relacionar com o próprio corpo no espaço e com o corpo do outro. Possibilitando o entendimento da necessidade e da importância da dança no ambiente escolar. Há uma real necessidade de métodos para trabalhar a corporeidade e o desenvolvimento da expressividade corporal, o corpo é instrumento primordial da psicomotricidade, logo é o entendimento do corpo, que irá desenvolver habilidades motoras e psíquicas que contribuirão na formação da personalidade do indivíduo.

CORRELAÇÃO ENTRE O PESO CORPORAL, A PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS

BARBOSA, Brenno Silva Moraes*; ARAUJO, Andrea Reis; ATAIDE, Lyslane Gomes; SOUSA, Taise Karine Cutrim; VIEIRA, Jose Newton Lacet; CARVALHO, Layse Neves.

Curso: Fisioterapia

Email: brennomoraes94@hotmail.com

O envelhecimento da população acarreta significativo aumento da carga das doenças cardiovasculares, constituindo uma das principais causas de morte entre idosos, e sendo a hipertensão um dos principais fatores de risco. Um dos dados mais intrigantes da relação da atividade física é a longevidade. Objetivo: Verificar a relação entre o peso corporal, a pressão arterial sistêmica, e a prática de atividade física em idosos comunitários. Material e Métodos: Estudo analítico, transversal quali-quantitativo, envolvendo 20 idosos comunitários, no mês de maio de 2016, realizado na Associação Comunitária da Vila Cruzado. Foi utilizada uma balança da marca CAMRY para verificação do peso corporal das pessoas idosas, e um aparelho

esfigmomanômetro para aferição da Pressão arterial Sistêmica, juntamente com um estetoscópio. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o parecer de nº 1.516.257/2016. Resultados: Na análise da correlação entre peso corporal e pressão arterial sistêmica foi utilizada a correlação de Spearman com $p \leq 0,05$. Na análise da relação entre peso e pressão arterial sistólica, foi verificado resultado estatisticamente significativo apenas na pressão sistólica, sendo a relação positiva e moderada ($\rho = 0,600$) com uma probabilidade associada (p-valor) de 0,003. Conclusão: Há uma relação diretamente proporcional entre o peso corporal e a pressão arterial sistêmica.

CORYNEBACTERIUM AMYCOLATUM: ATIVIDADE DESOXIRRIBONUCLÁSICA, ADERÊNCIA A HIDROCARBONETO E FORMAÇÃO DE BIOFILME

ALVES, Eldimara Santos*; DE SOUZA, Nicolly Guerra Amorim; FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo; FONTENELLE, Pedro Henrique Cunha; FARIA, Yuri Vieira; SABBADINI, Priscila Soares; DOS SANTOS, Jéssica Silva

Curso: Biomedicina

Email: marapattz@gmail.com

Corynebacterium amycolatum tem sido descrito como agente causal de infecções com alta morbimortalidade e isolado de materiais/sítios como urina, secreção uretral, feridas, abscessos, trato respiratório inferior, fluido peritoneal e sangue. Este trabalho objetivou: identificar a habilidade de *C. amycolatum* produzir a enzima desoxirribonuclease (DNase); avaliar as propriedades hidrofóbicas e a formação de biofilme. Foram utilizadas 5 amostras de *C. amycolatum* isoladas dos sítios nasal (3) e anal (2), além da ATCC 49368 (pele humana). Micro-organismos foram inoculados em meio teste DNase e incubados a 37°C/24-48h; as placas foram cobertas com HCl 1M. Já o grau de hidrofobicidade foi determinado com base nas densidades óticas (DO) iniciais das amostras, padronizadas em 0,8 (570nm), e após aderência ao n-hexadecano. Segmentos de cateteres de poliuretano foram infectados (24h, 106 UFC/mL) e examinados em microscópio eletrônico de varredura (MEV) para avaliar a formação de biofilme. Todas as amostras produziram DNase já após 24h de incubação, sendo que a ATCC 49368 apresentou um halo maior após 48h, comparado ao de 24h. Todos os isolados se apresentaram muito hidrofóbicos. Por MEV, pode-se observar a capacidade dessa espécie colonizar in vitro superfícies de cateteres, produzindo biofilme, e de formar microcolônias com grande quantidade de matriz extracelular amorfa e micro-organismos revestidos por slime. A expressão de superfície hidrofóbica se relaciona à produção de biofilme e a capacidade de produzir DNase, enzima que degrada o DNA, facilita a disseminação do micro-organismo. Juntos, estes fatores podem favorecer a colonização das mucosas e tecidos e conferir resistência à fagocitose.

COMPARAÇÃO DA OSCILAÇÃO CORPORAL DE ACORDO COM O RISCO DE QUEDA EM IDOSOS

DO NASCIMENTO, Carolina Costa; ASSUNÇÃO, Joyce Luíse Sabá; MACHADO, Hannah Catalina da Costa; DÓRIA, Hannah Catalina da Costa; DIAS, Rosane da Silva

Curso: Fisioterapia

Email: cc.nascimento@gmail.com

Um dos principais problemas associados ao envelhecimento humano é a redução da habilidade para controlar a postura e a marcha, podendo levar à ocorrência de quedas, diminuindo a capacidade funcional dos idosos. O objetivo desse estudo foi de avaliar a oscilação postural em idosos de acordo com o risco de queda. Efetuou-se um estudo descritivo, no período de julho a agosto de 2016, com 20 indivíduos acima de 60 anos. A avaliação da propensão à queda foi realizada mediante a aplicação do teste de mobilidade funcional: Timed Up and Go (TUG) e avaliação estabilométrica bipodálica foi feita com o baropodômetro. A normalidade dos dados foi conferida pelo teste de Shapiro Wilk. Estudo aprovado pelo CEP com parecer de nº 430999. Participaram 20 indivíduos; idade média 69,80 anos (DP±5,55), 80% (16) mulheres, 50% (10) casados. Em relação ao risco de queda, a média do TUG foi 19 (MIN 8,28 – MAX 24,53), 25% (5) apresentaram baixo risco para quedas, 70% (14) risco moderado e 5% (1), alto risco. A média da avaliação estabilométrica no plano sagital foi de 1,041cm e no plano frontal 1,321cm. De acordo com o risco de queda, os valores no plano sagital e frontal, foram respectivamente: baixo risco 1,050 e 0,889, risco médio 1,011 e 1,138, alto risco 1,420 e 2,084. A avaliação estabilométrica mostra maior oscilação corporal quanto maior o risco de queda.

CONFIABILIDADE E QUALIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS

COSTA, Shirley Marina Ribeiro*; ALMEIDA, Hariane Freitas Rocha; OLIVEIRA, Helenilde Pereira; CARVALHO, Alan Costa; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; ROCHA, Francisca Das Chagas Gaspar

Curso: Enfermagem

Email: SHIRLEYMARINA780@GMAIL.COM

Os sistemas de Informação foram criados no intuito de gerar dados epidemiológicos que possam subsidiar a tomada de decisão por aqueles que planejam e executam as políticas e ações de saúde. Este trabalho teve objetivo de realizar uma revisão de literatura sobre a confiabilidade e qualidade do sistema de informações sobre nascidos vivos, partindo de dados secundários obtidos a partir da avaliação dos dados do SINASC e da Coordenação de Nascimentos BRISA, onde foi realizado um pareamento entre dois bancos. Amostra foi constituída por 4.531 nascimentos. Os dados do SINASC foram comparados aos dados da Coorte e avaliou-se a

cobertura por maternidade e a completude e confiabilidade das variáveis da DNV. O estudo foi feito entre maternidades (públicas e privadas) em números de parto/ano. Os dados foram analisados no STATA 12.0 obtendo-se o indicador Kappa e ICC e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUUFMA. A estimativa em São Luís foi uma cobertura de 87,7%, nas principais maternidades: Materno-Infantil HUUFMA (86,9%); Benedito leite (89,2%); Maternidade Marly Sarney (89%) e Clínica São Marcos (88,1%). Conclui-se que apesar da Cobertura obtida para São Luís ser considerada boa, ainda é inferior ao limite de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde para o uso dos dados, no cálculo de indicadores. O que evidencia a necessidade de adotar medidas que contribuam para o aumento da cobertura.

COMPARAÇÃO DA DISTANCIA PREVISTA E PERCORRIDA NO TESTE DE CAMINHADA EM ASMATICOS

PEREIRA; Eugênia Aires*; RIBEIRO, Kerly Madeira; REIS; Irla Nunes; NASCIMENTO, Léia Ribeiro; DOS SANTOS, Flávia Milena Silva; CARVALHO, Laíse Neves; FERREIRA, Rodrigues

Curso: Fisioterapia

Email: eugeniaapereira@hotmail.com

Alguns estudos referem que pacientes asmáticos apresentam menor capacidade funcional submáxima, quando comparados a indivíduos sem pneumopatias, porém não há relatos precisos de quantificação dessa relação. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar a distância prevista e percorrida no teste de caminhada em asmáticos. Tratou-se de estudo observacional, de corte transversal realizado entre julho a novembro de 2015 no Núcleo de Pesquisa em Reabilitação Funcional da Universidade Ceuma. Foram incluídos 16 portadores de asma persistente moderada e grave com idade entre 18 a 78 anos. Para avaliação da tolerância ao exercício foi realizado o teste de caminhada de seis minutos (TC6') conforme padronização da American Thoracic Society. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Ceuma com parecer número 539.736. A mediana da distância percorrida no teste de caminhada foi de 475 m (155-566 m), enquanto que a mediana da distância prevista 507 m (364-632 m), sendo essa diferença não significativa ($p = 0,221$). A ausência significância dos resultados do estudo pode ser decorrente do tamanho amostral, por isso, isso faz – se necessárias novas pesquisas sobre o tema com maior número de participantes.

COMPARAÇÃO DOS NUTRIENTES ENTRE O PÃO DE FORMA INTEGRAL E TRADICIONAL COMERCIALIZADO EM SÃO LUIS-MA

GUIMARÃES, Célia Maria Soares*; SILVA, Michelle Costa; SANTOS, Alexsandro Ferreira dos.

Email: michelle.hta2011@hotmail.com

Curso: Nutrição

Objetivo: comparar o teor de sódio, fibras, carboidratos e energia em pães de forma industrializados do tipo integral e convencional de forma a identificar se a redução de sódio está sendo obedecida, e contribuir para diminuição do consumo de sódio em produtos industriais. Revisão de literatura: a alimentação brasileira, em todas as faixas etárias, vem apresentando maior participação de produtos altamente processados, e menor proporção de alimentos saudáveis como cereais, leguminosas, frutas, hortaliças, leite e derivados, acarretando deficiências em nutricionais. Metodologia: Estudo observacional, realizado em supermercados de São Luís – MA, através de coleta de dados a partir das informações presente nos rótulos dos produtos, realizada com cinco marcas diferentes que produzem pães de forma integral e tradicional, nos meses de setembro e outubro de 2015. Resultados: Ao analisar as informações nutricionais dos rótulos das marcas de pães de forma integrais, identificou-se na marca “D” baixo teor de sódio e valor calórico, o que, se tratando de um produto integral, corresponde as demandas nutricionais dos consumidores. Quanto aos pães de forma tradicionais, a marca “C” possui o maior teor de cálcio e o menor valor calórico, uma informação que deve ser observada com cautela, tendo em vista que a maioria dos consumidores costuma observar apenas as calorias dos produtos. Conclusão: Os valores identificados nas marcas analisadas possuíam grande variação entre elas, mesmo em produtos similares. O que caracteriza que o consumo pode ser melhorado quando observado os valores nutricionais constantes nos rótulos dos produtos.

CONHECIMENTO SOBRE SINTOMAS DE HANSENÍASE DE USUÁRIOS DE UMA UBS.

VENÂNCIO Grace Kelly de Medeiros*; TEIXEIRA, Cinara Martins; PIMENTEL, Ysla Vieira; BACELAR, Solange; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima N.; CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira; RODRIGUES, Patricia

Curso: Estética

Email: gkdemv@hotmail.com

A hanseníase é uma afecção de caráter infectocontagiosa e de aspecto crônico, historicamente, sempre esteve estigmatizada enquanto praga ou castigo divino, pautada em um contexto excludente, todavia há tratamento gratuito e a melhor forma de prevenção é a educação da população. Este estudo objetivou identificar o conhecimento dos usuários da Unidade da Família Pirapora acerca dos sintomas de hanseníase de usuários de uma unidade de Saúde da família de São Luís. Para tanto, foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e transversal, na sede da Unidade de Saúde da Família Pirapora na cidade de São Luís – MA, com 50 usuários do serviço de atenção básica, de ambos os gêneros, com idade superior a 18 anos, que aceitaram e tiveram

disponibilidade para participar da pesquisa. Os dados foram obtidos através de uma ficha de avaliação com dados sociodemográficos e um questionário validado para avaliar o conhecimento dos usuários sobre hanseníase. O estudo foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa pelo parecer número 516.267. A amostra foi composta em sua maioria por usuários do gênero feminino (66,7%), a mediana de idade foi de 36 (19-60) anos. 93,3% dos usuários já ouviram falar de hanseníase e 25% relatou já ter tido contato com um portador da doença. Quanto aos sintomas de hanseníase, 88,35% relataram manchas brancas, 85% a dormência, 73,30% a perda de sensibilidade. Foi constatado que a maioria dos participantes além já ter ouvido falar na hanseníase, conhecem seus principais os sintomas. Dado importante para o diagnóstico precoce.

CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA MUSCULAR, O MEDO DE QUEDAS, E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS

MARIA, Dhenne*; GOMES, Hannah Catalina; DOS SANTOS, Mayhara; MARINHO, Gilmaria; LACET, José Newton; NEVES, Laíse

Curso: Fisioterapia

Email: dhenne-santos@hotmail.com

O medo de cair caracteriza-se pela ansiedade ao caminhar ou preocupação excessiva em cair sendo favorecido por vários fatores como idade avançada, lesões causadas por quedas, sedentarismo, declínio da força muscular, alterações na massa óssea, redução do controle da postura, da coordenação motora da flexibilidade, além de deficiências de visão, propriocepção e do sistema vestibular. Correlacionar a força muscular, o medo de quedas, e a prática de atividade física em idosos comunitários. Estudo analítico, transversal quali-quantitativo, envolvendo 20 idosos comunitários, no mês de maio de 2016, realizado na Associação Comunitária da Vila Cruzado. Foi utilizada a entrevista por meio da Falls Efficacy Scale-International- Brasil Total, para avaliação do medo de cair; e verificada a avaliação da força muscular máxima de preensão manual, com uso do Dinamômetro de Preensão Manual Palmar. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o nº do parecer 1.516.257/2016. Na análise da correlação entre força muscular e medo de quedas foi utilizada a correlação de Spearman com $p \leq 0,05$. Na análise da correlação entre força muscular e o medo de quedas em idosos, foi verificada relação fraca e negativa ($p = -0,001$) com uma possibilidade associada (p-valor) de 0,998, mostrando que tal relacionamento é bastante provável apenas como resultado do erro amostral (ao acaso). Conclusão: Há relação entre o medo de quedas e a força muscular em idosos comunitários, com valores inversamente proporcionais.

CORRELAÇÃO ENTRE A COGNIÇÃO, A FORÇA MUSCULAR, E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS

ALMEIDA, Saulo Rian; CAMARA, Aline Maciel; BARRETO, Raissa Neri de Carvalho; PESSOA, Mirella Costa; ; VIEIRA, José Newton Lacet; CARVALHO, Laíse Neves

Email: mariasj28@yahoo.com

Área / Especialidade: Fisioterapia

As evidências destacam o impacto positivo da atividade física regular em aspectos cognitivos. Na saúde mental e bem estar geral do indivíduo durante o processo de envelhecimento. Alguns destacam o efeito da atividade física mais especificamente da caminhada na diminuição do risco de demência vascular entre outros. Objetivo: Correlacionar a cognição, a força muscular, e a prática de atividade física em idosos comunitários. Material e Métodos: Estudo analítico, transversal quali-quantitativo, envolvendo 20 idosos comunitários, no mês de maio de 2016, realizado na Associação Comunitária da Vila Cruzado. Foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental, para avaliação do estado cognitivo; e verificada a avaliação da força muscular máxima de preensão manual, com uso do Dinamômetro de Preensão Manual Palmar. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o parecer de nº 1.516.257/2016. Resultados: Na análise da correlação entre força muscular e cognição foi utilizada a correlação de Spearman com $p \leq 0,05$. Na análise da correlação entre força muscular e cognição foi verificado relação moderada e positiva ($\rho = 0,303$) com $p = 171$. Conclusão: Há uma relação entre a cognição e a força muscular diretamente proporcionais. Contudo o número pequeno de pessoas não praticantes de atividade física, neste estudo, requer realização de outros estudos com uma maior amostra para dados mais conclusivos sobre esta relação. Palavras-chave: Cognição, Força muscular, idoso.

CORRELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E FUNÇÃO PULMONAR DE INDIVÍDUOS COM DPOC SUBMETIDOS AO PILATES

REIS, Irla Nunes*; MORAES, Valkiria Kerlly Almeida; PEREIRA, Valmira Kelly Almeida Moraes; PINHEIRO, Alcimar Nunes; NETO, Ariosvaldo Guimarães Gaioso; DE ARAÚJO, Maria Erivânia

Curso: Fisioterapia

Email: irlabratz@hotmail.com

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracteriza por uma limitação crônica e progressiva ao fluxo de ar e produz efeitos significantes no sistema respiratório, além de manifestar tosse produtiva e dispnéia aos esforços. Estes resultam na redução da capacidade funcional, afastando os indivíduos de suas atividades da vida diária, interferindo no convívio

social e no bem-estar dos pacientes, afetando de forma negativa a qualidade de vida deste grupo. Este estudo teve como objetivo correlacionar os parâmetros da função pulmonar com a qualidade de vida de pacientes com DPOC submetidos a um programa de exercícios do método Pilates. Tratou-se de um estudo intervencional, realizado com 14 pacientes oriundos de um laboratório do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Os pacientes foram submetidos às sessões de Pilates duas vezes semanais durante 03 meses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Ceuma com parecer número 1.471.984. Os parâmetros analisados foram Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1), Capacidade Vital Forçada (CVF) e os domínios sintomas, atividades e impactos psicossociais por meio do questionário de Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) que avalia a qualidade de vida. Os resultados do presente estudo mostraram que não houve correlação entre os escores do SGRQ e os parâmetros VEF1 ($p=0,017$) e CVF ($p=0,049$). Conclui-se, portanto, que não há correlação da qualidade de vida com os parâmetros da função pulmonar, pois a DPOC cursa progressivamente levando ao declínio desses parâmetros e o exercício não tem impacto sobre o mesmo.

CRIANÇAS E ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO: UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA NA INFÂNCIA

ANDRADE, Lívia Maria Guedes de Lima*; LIMA, Ana Beatriz Rocha;

Email: liviaguedesandrade@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Os níveis elevados de urbanização da população apontam para o desafio de se pensar em espaços públicos destinados às crianças capazes de promover o desenvolvimento infantil. Mais de 50% da população mundial, o que significa mais de um bilhão de crianças vivem atualmente nas cidades. A falta de segurança e o amedrontamento atual dos pais limitam situações coletivas consideradas de extrema importância na infância. A ausência de segurança dentro das cidades tem estimulado um afastamento das famílias dos espaços públicos e isso apresenta um desdobramento no *modus vivendi* das grandes metrópoles, cujas pessoas estão confinadas em espaços fechados e sem convívio social de qualidade. O objetivo principal desse estudo é apresentar uma investigação sobre o lugar da criança na cidade contemporânea e nos espaços urbanos, percebendo que é por meio da experiência, apropriação e vivência dos indivíduos que a cidadania se estrutura. A ideia é analisar o lugar desses atores sociais excluídos dos processos de mobilização social e, assim, estimular famílias a integrarem suas agendas de lazer em espaços, que proporcionem às crianças o amplo conhecimento de seus direitos dentro das cidades. Observa-se que essa segregação dos espaços públicos e privados destinados às

crianças, converge para o sufocamento das crianças em ambientes privados e limitados. Os espaços abertos e públicos são onde a criança pode estabelecer sua entrada no mundo da vida, e tendo na pluralidade de espaços, a possibilidade de ampliação de vivências na infância que podem constituir pessoas mais flexíveis e conscientes de seu papel no contexto urbano

DESCONFORTO/DOR OSTEOMIOARTICULAR EM FUNCIONÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DE MOURA, Edson Silva*; SAMPAIO, Amanda Silva; DE CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; CORRÊA, Valéria Cristina dos Anjos; FONSECA, Thailson Marcio Pinheiro; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; GONÇALVES, Maria Claudia

Email: edsonsilvademoura@gmail.com

Curso: Fisioterapia

Resumo: Introdução: Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho têm sido uma das principais causas de afastamentos dos trabalhadores de suas atividades. Objetivo: Descrever a frequência e local do desconforto/dor dos trabalhadores da Previdência Social, analisar a intensidade dolorosa, comparar a frequência encontrada entre os gêneros e relacionar o desconforto/dor com o tempo de serviço prestado. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal de caráter descritivo, com amostra composta por 81 trabalhadores. Foi aplicado um questionário sócio-demográfico e questões laborais, elaborado pelo pesquisador e o Diagrama de Corlett e Manenica (1980), adaptado por Hauser (2012) para localização e intensidade das dores osteomioarticulares. Os dados foram analisados no SPSS 18.0. Na comparação do desconforto/dor entre os gêneros foi utilizado o Qui-quadrado de Pearson e na comparação do tempo de serviço e o desconforto/dor foi utilizado o Mann Whitney, sendo considerado significativo $p \leq 0,05$. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, parecer número: 1.571.672. Resultados: 60% trabalhadores pertenciam ao sexo feminino. O desconforto/dor mais frequente do tronco foi na costa inferior (49,4%), nos membros superiores foi nos ombros (32,1%) e nos membros inferiores, 37% foi na perna direita e 35,8% na perna esquerda. Ao analisar a intensidade dolorosa, a maioria dos trabalhadores (19,8%) relatou sentir alguma dor na cervical, seguido por bastante dor nas costas inferior (18,5%). Conclusão: O desconforto/dor é realidade entre os trabalhadores da Previdência Social, permitindo sugerir medidas preventivas para minimizar os danos causados pelo trabalho invariável e repetitivo como no caso do terminal de computador.

DETECÇÃO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UMA CLÍNICA DE HIDROTERAPIA

DE OLIVEIRA, Stanley Viana*; DE SANTANA; Tatiana Cristina F

Curso: Fisioterapia

Email: stanlleyoliveira@outlook.com

O setor de hidroterapia de fisioterapia, exige cuidados especiais, O aumento e a disseminação de microrganismos multirresistentes em ambiente hospitalares e em clínicas é de grande preocupação e continua a desafiar o controle de infecção e as práticas epidemiológicas. Objetivou-se averiguar a contaminação em materiais utilizados em uma Clínica de Hidroterapia na cidade de São Luís no Maranhão. As amostras foram coletadas a partir de cinco equipamentos (macarrão, caneleira, halteres, colar cervical, prancha) utilizados pelos pacientes durante o tratamento hidroterapêutico. A coleta das amostras foi realizada por meio de swab estéril embebido em solução fisiológica estéril a 0,9%. As amostras foram identificadas de acordo com o equipamento do ambiente da clínica, a coleta foi feita em triplicata. Houve crescimento microbiológico em todos os tubos de BHI que foram incubados, Nas placas de Ágar Sangue onde o crescimento foi positivo, foi realizado o teste de catalase, todos eles tendo como resultado a positividade, nas placas de Mac Conkey com crescimento positivo foi feito o teste de oxidase, tendo tido a amostra da caneleira resultado positivo. Apesar de não ter sido possível a conclusão da pesquisa em relação a contaminação da água da piscina, deve-se atentar aos microrganismos potencialmente patogênicos dos materiais utilizados. Tais microrganismos podem oferecer risco à saúde dos usuários principalmente idosos e imunocomprometidos.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA COMUNIDADE DO SÃO CRISTÓVÃO EM SÃO LUIS-MA.

DA CUNHA, Kátia Cristina Souza; ALMEIDA, Lorena de Sena; DE MELO, Mayara Gomes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: katiacsdacunha@gmail.com

O objetivo do presente trabalho foi realizar o diagnóstico da realidade da Comunidade do São Cristóvão em São Luis – MA, através de visitas, para estimular o diálogo sobre a experiência vivida sobre a real situação da atenção básica em saúde nessa comunidade. As visitas abordaram a atuação do enfermeiro nessas comunidades, envolvendo a escolinha da União dos Moradores do Bairro São Cristóvão (UMBSC), o Centro de Saúde e a associação dos moradores dessa comunidade, onde a UMBSC mantém uma escola com auxílio da prefeitura. Foi observado e relatado o contexto social da comunidade. Posteriormente foi confeccionado um relatório com dados sobre a estrutura do centro de saúde visitado bem como da realidade social. Nesse ambiente complexo que envolve a Saúde Coletiva, encontramos na comunidade pontos

negativos e positivos. Os pontos negativos da comunidade destacamos as carências deste centro como por exemplo a infra estrutura apresentando problemas necessitando de reformas, falta de espaço que impossibilita a realização de palestras e encontros para os programas atendidos e recursos materiais. Na associação de moradores destacamos como ponto negativo a falta de recursos repassados pela prefeitura, por outro lado, a associação é organizada, presente na comunidade e tem pessoal motivado. Como pontos positivos da comunidade, podemos destacar a organização em função da população abrangida e da programação para o agendamento e realização de consultas. Além disso, essa vivência foi de extrema importância para propiciar uma experiência que estimula o questionamento e a inquietude, frente ao grande desafio profissional enfrentado pelo Profissional Enfermeiro.

DISTÚRBO FONOLÓGICO EM PRÉ-ESCOLARES DE ESCOLA PÚBLICA COM IDADE DE 4 Á 6 ANOS

MUNIZ, Nilce Cleide Frazão*; LOPES, Monique Kelly Duarte; AMORIM, Camila Malcher Teixeira

Email: nilcefrazao@live.com

Curso: Fonoaudiologia

Resumo: Os pré-escolares com distúrbios fonológicos podem apresentar ininteligibilidade da fala, dificuldade de memória, como também omissões e distorções dos sons da fala o que ocasionará grandes dificuldades em sua interação social. Diante disto, a atuação do profissional fonoaudiólogo auxilia no processo de desenvolvimento da fase pré-escolar. Essa pesquisa tem como objetivo investigar as alterações fonológicas em crianças pré-escolares de Instituições Públicas, por meio de um estudo descritivo retrospectivo com abordagem quantitativa em crianças matriculadas na Unidade de Educação Básica Tom e Jerry (UEB), sendo crianças de 4 a 6 anos de ambos os sexos. Para a realização da pesquisa na UEB Tom e Jerry foram utilizados um termo de isenção, o qual dispensa a assinatura dos pais no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Logo após será realizado o levantamento dos protocolos preenchidos no ano de 2015, em que será verificado as variáveis referentes a fala espontânea, imitação de palavras, discriminação, reconhecimento, nomeação de cores e formas. Os dados da pesquisa serão tabulados no programa Excel 2010 para o cálculo e análise da estatística dos achados fonológicos, através de porcentagem, médias e valores absolutos. Esta pesquisa obteve aprovação do CEP da universidade CEUMA sob o número 57877116.4.0000.5084. As análises dos resultados estarão concluídas até a realização do congresso de saúde e Bem-Estar. Palavras-chave: pré-escolar, transtorno fonológico, linguagem infantil, prevalência.

EFEITO AGUDO DO TREINAMENTO RESISTIDO SEM INTERVALOS DE RECUPERAÇÃO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DE MULHERES IDOSAS SEM COMORBIDADES

BARBOZA, Nayana Maria Lopes dos Reis Barboza*; ARAÚJO, Ana Eugênia Ribeiro; DE SOUSA, Phabullo Rocha; RIBEIRO, Daniela Alves Flexa; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado

Email: nayanalopes25@hotmail.com

Curso: Educação Física

Resumo: É bem documentado que a Hipotensão Pós Exercício (HPE) é encontrada tanto em pessoas com hipertensão limítrofe quanto em indivíduos hipertensos. No entanto, a HPE em indivíduos normotensos permanece mal compreendida. Objetivo: analisar o efeito agudo de uma sessão de treinamento de resistência sem intervalos de recuperação entre as séries e exercícios sobre a pressão arterial (PA) de idosas normotensas. Foram avaliadas 6 mulheres idosas com idade média de 65 ± 3 anos que não tinham história prévia de hipertensão ou qualquer doença cardiovascular. Elas foram submetidas uma sessão de treinamento de resistência (3 séries de 8 repetições máximas sem intervalos de recuperação entre os exercícios). Aferimos-nos a pressão arterial antes, logo após e 20 minutos após o treinamento resistido. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística com o uso do software Stata/SE 11.1 (Statacorp, CollegeStation, Dallas, EUA). As variáveis quantitativas foram expressas em média e desvio padrão e suas diferenças verificadas, empregando-se o teste Wilcoxon. Resultados: Houve uma diferença significativa (valor $p = 0,0464$) entre a Pressão Arterial Sistólica (PAS) antes da sessão de treino (média de $126,50 \pm 7,34$ mmHg) e 20 minutos após (média $110,16 \pm 10,90$ mmHg). Não houve diferença significativa entre a PAS antes e logo após o treino (média de $126,50 \pm 7,34$ mmHg vs. $129,33 \pm 10,17$ mmHg). Observamos diferença significativa entre Pressão Arterial Diastólica (PAD) logo após (média de $66,66 \pm 9,09$ mmHg), valor $p = 0,0277$ e após 20 minutos (média de $66,66 \pm 8,93$ mmHg), valor de $p = 0,0273$, quando comparado com os valores iniciais (Média de $71,5 \pm 10,70$ mmHg). Conclusão: Estes resultados mostram que houve uma redução aguda da PA na população investigada após a exercícios resistidos sem qualquer intervalo de recuperação. Número do Comitê de Ética: 813.886

EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE NANOCUBOS DE OXIDO DE SILÍCIO SOBRE A RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE UMA RESINA COMPOSTA

GUIDA, Thamires Ferreira Martins*; SOUZA, Rita De Cássia Da Rocha Oliveira; DINIZ, Rafael Soares; NUNES, Patricia Luciana Serra; MOFFA, Eduardo Buozzi; GONÇALVES, Leticia Machado

Email: ritarsouzaji@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da incorporação de diferentes concentrações (3% e 6%) de nanocubos de óxido de silício (NCS) sobre a resistência à flexão de

uma resina composta microhíbrida (Sinfony – 3M ESPE). Vinte e quatro corpos-de-prova retangulares (25 mm X 2 mm X 2 mm) foram confeccionados em dois incrementos e polimerizados de acordo com as recomendações do fabricante. A seguir os corpos-de-prova foram divididos em três grupos (n=8): G1 – Grupo controle (resina sem NCS); G2 e G3 – resina com NCS incorporados nas proporções 3% e 6%, respectivamente. Após o acabamento e polimento, os corpos-de-prova foram imersos em água destilada por 24 horas a 37°C (ISO 4049/2000). Os ensaios de flexão de três pontos foram realizados em máquina de ensaios EMIC DL 2000, com célula de carga de 1kN, calibrada com velocidade constante de 0.5 mm/min. Os dados foram analisados por meio de ANOVA, seguido pelo teste Tukey (P=0,05). Os resultados demonstraram que houve diferença estatisticamente significativa (P<0,05) entre o grupo controle (93,98 MPa) quando comparado com os grupos que receberam os NCS (G2= 82,46 e G3=67,99). Além disso, o grupo que recebeu a maior quantidade de nanocubos apresentaram o menor desempenho frente ao teste de flexão. Conclui-se que a incorporação de nanocubos de óxido de silício interfere negativamente na resistência a flexão da resina composta Sinfony sendo necessário o desenvolvimento de métodos de funcionalização que sejam capazes de propiciar a união entre a matriz do polímero e a parede dos NCS.

EFEITO AGUDO DO TREINAMENTO RESISTIDO SEM INTERVALOS DE RECUPERAÇÃO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DE MULHERES IDOSAS SEM COMORBIDADES

BARBOZA, Nayana Maria Lopes dos Reis*; RIBEIRO, Daniela Alves Flexa; ARAUJO, Ana Eugênia Ribeiro; COELHO, Phabullo Rocha; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado.

Curso: Educação Física

Email: nayanalopes25@hotmail.com

É bem documentado que a Hipotensão Pós Exercício (HPE) é encontrada tanto em pessoas com hipertensão limítrofe quanto em indivíduos hipertensos. No entanto, a HPE em indivíduos normotensos permanece mal compreendida. Objetivo: analisar o efeito agudo de uma sessão de treinamento de resistência sem intervalos de recuperação entre as séries e exercícios sobre a pressão arterial (PA) de idosas normotensas. Foram avaliadas 6 mulheres idosas com idade média de 65 ± 3 anos que não tinham história prévia de hipertensão ou qualquer doença cardiovascular. Elas foram submetidas uma sessão de treinamento de resistência (3 séries de 8 repetições máximas sem intervalos de recuperação entre os exercícios). Aferimos-nos a pressão

arterial antes, logo após e 20 minutos após o treinamento resistido. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística com o uso do software Stata/SE 11.1 (Statacorp, CollegeStation, Dallas, EUA). As variáveis quantitativas foram expressas em média e desvio padrão e suas diferenças verificadas, empregando-se o teste Wilcoxon. Resultados: Houve uma diferença significativa (valor $p = 0,0464$) entre a Pressão Arterial Sistólica (PAS) antes da sessão de treino (média de $126,50 \pm 7,34$ mmHg) e 20 minutos após (média $110,16 \pm 10,90$ mmHg). Não houve diferença significativa entre a PAS antes e logo após o treino (média de $126,50 \pm 7,34$ mmHg vs. $129,33 \pm 10,17$ mmHg). Observamos diferença significativa entre Pressão Arterial Diastólica (PAD) logo após (média de $66,66 \pm 9,09$ mmHg), valor $p = 0,0277$ e após 20 minutos (média de $66,66 \pm 8,93$ mmHg), valor de $p = 0,0273$, quando comparado com os valores iniciais (Média de $71,5 \pm 10,70$ mmHg). Conclusão: Estes resultados mostram que houve uma redução aguda da PA na população investigada após a exercícios resistidos sem qualquer intervalo de recuperação.

EFEITO DAS TÉCNICAS DE PROFILAXIA DENTÁRIA NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE RESINAS COMPOSTAS

FONTES, Larissa Sipaúba*; MENDES, Hevylla Glaucia Goncalves Simoes; KUSSANO, Sandro Carvalho; BRASIL, Paloma Dourado; CARVALHO, Sanalle Luiza Baêta; GOMES, Mario Gilson Nina; GOMES, Isabella Azevedo

Curso: Odontologia

Email: larissa_sipauba@hotmail.com

Foram confeccionados 36 (trinta e seis) corpos de prova de resina composta Nanohíbrida (Opallis- FGM) divididas em 3 (três) grupos de 12 (doze). Os corpos de prova foram mantidos em água destilada a 37°C por 24 horas e depois submetidos à técnica de acabamento e polimento utilizando Discos de lixa Soflex-Pop On (3M). Para as técnicas de profiláticas, no grupo (G1) foi utilizado uma mistura de pedra pomes (SSWHITE) e água destilada com auxílio de taça de borracha montada em contra ângulo, no grupo (G2) pasta profilática Herjos F (Vigodent) com taça de borracha montada em contra ângulo e no grupo (G3), jato de bicarbonato com o aparelho Profi II Ceramic (Dabi Atlante). Todas as técnicas profiláticas foram realizadas por um mesmo operador utilizando tempos padronizados. Após as sequências de profilaxia, todas as amostras foram novamente polidas utilizando os discos soflex-Pop On. As medições da rugosidade superficial em μm , foram avaliadas em três momentos: antes e após as técnicas profiláticas e após o repolimento das amostras com auxílio do Rugosímetro. Para a análise estatística foram utilizados o teste Anova, o teste Anova One-way complementado pelo teste de Tukey. Observou-se que os valores foram significativamente alterados entre a primeira e a segunda avaliação ($p=0,001$) e entre a segunda e a terceira avaliação ($p=0,005$), mostrando que

a alteração da rugosidade, de uma avaliação para a outra, dependeu do tipo de tratamento profilático. A resina composta nanohíbrida apresentou alteração na rugosidade superficial quando submetidas a técnicas profiláticas.

EFEITO DA FRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DO EXTRATO DAS FOLHAS DE PUNICA GRANATUM NAS ALTERAÇÕES DE PESO E GLICEMIA EM CAMUNDONGOS SÉPTICOS.

ARAÚJO, Mizael Calácio*; FIGUEREDO, Isabella Fernandes da Silva; PONTES, Jaqueline Pessoa; LIMA NETO, Lídio Gonçalves*; ARAÚJO, Paulo Câmara; FERNANDES, Elizabeth Soares; PEREIRA, Domingo Magno Santos;

Curso: Farmácia

Email: mcymisael@hotmail.com

Na sepse, ocorrem alterações metabólicas no hospedeiro que são determinantes para a produção de moléculas inflamatórias essenciais ao combate à infecção. Estas alterações visam proteger os tecidos do catabolismo. Entretanto, a produção de mediadores inflamatórios nesta síndrome causa hiperglicemia a qual pode levar ao aumento da mortalidade em pacientes. O extrato hidroalcoólico obtido a partir das folhas de *Punica granatum* L. (romã) inibe a produção de TNF α em camundongos injetados com lipopolissacarídeo. Ainda, a romã possui ação antimicrobiana e hipoglicemiante em modelos experimentais de diabetes tipo-2. Este trabalho avaliou o efeito da fração hexânica (HF) do extrato bruto hidroalcoólico das folhas da romã sobre os níveis circulantes de glicose e peso corporal de camundongos com sepse induzida por perfuração e ligadura do ceco (CLP). Para isto Camundongos machos C57BL/6 receberam veículo ou HF (100 mg/kg, p.o.), 1h antes da indução da CLP. Animais falso-operados foram utilizados como controle. Após 20h, avaliou-se os níveis circulantes de glicose em amostras de sangue. Os pesos corporais foram registados antes e 20h após a indução da CLP. Os procedimentos foram realizados sob aprovação pelo CEUA-UNICEUMA. Não foram observadas alterações de peso corporal entre os grupos avaliados. Animais sépticos tratados com veículo apresentaram hiperglicemia quando comparados à animais falso-operados. A HF reduziu significativamente a hiperglicemia em animais sépticos. Concluiu – se que a fração HF da romã modula a hiperglicemia em animais sépticos sem afetar o peso corporal dos animais. É possível que este efeito possa impactar a produção de mediadores inflamatórios durante a sepse.

EFEITO DA FRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DO EXTRATO DE PUNICA GRANATUM EM ANIMAIS SÉPTICOS

FIGUEIREDO, Isabella Fernandes Da Silva*; SOUSA, Nágila Caroline Fialho; PONTES, Jaqueline Pessoa; ARAUJO, Mizaél Calácio; SILVA, Luís Cláudio Nascimento; FERNANDES, Elizabeth Soares; MENDES, Saulo José Figueiredo

Email: bellaafigueiredo@hotmail.com

Área / Especialidade: Farmácia

A sepse é fatal e afeta milhares de pessoas anualmente. *Punica granatum* L. (romã) possui diversas propriedades farmacológicas incluindo atividade antimicrobiana e anti-inflamatória. Embora estas atividades tenham sido sugeridas para extratos de sua casca ou fruto, pouco se sabe acerca das atividades de suas folhas. Recentemente, demonstrou-se que o extrato bruto hidroalcoólico das folhas da romã inibe a migração de neutrófilos e a produção de TNF α em camundongos com peritonite. Este trabalho avaliou o efeito da fração hexânica (HF) do extrato bruto hidroalcoólico das folhas da romã sobre a celularidade sanguínea e peritoneal de camundongos com sepse induzida por perfuração e ligadura do ceco (CLP). Camundongos machos C57BL/6 receberam veículo ou HF (100 mg/kg, p.o.), 1h antes da indução da CLP. Animais falso-operados foram utilizados como controle. Após 20h, amostras de sangue foram coletadas e as amostras de lavado peritoneal (PEFL) foram obtidas por laparotomia. Contou-se as células totais e diferenciais através de microscopia. Os procedimentos foram realizados sob aprovação pelo CEUA-UNICEUMA. Camundongos tratados com veículos CLP aumentou o número de células totais e mononucleares circulantes e peritoneais quando comparado à animais falso-operados. O tratamento com HF causou aumento no número de células polimorfonucleares circulantes e peritoneais em animais sépticos. Porém, HF causou redução destas células em animais falso-operados. A HF aumenta a migração de polimorfonucleares na sepse e pode representar uma terapia alternativa em doenças mediadas por estas células,

EFEITOS DE UM PROTOCOLO CINESIOTERAPEUTICO DE DUPLA TAREFA SOBRE A COGNIÇÃO DE IDOSAS COMO MEDIDA PREVENTIVA DO RISCO DE QUEDAS

CAMPOS, Jessica Kerly Garces; SILVA, Lídia Maria Lopes da; MATOS, Pâmella Mayara Ferreira de; SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro

Curso: Fisioterapia

Email: kerlycampos33@hotmail.com

Resumo : Analisar a eficácia de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa sobre a melhora cognitiva de idosas como medida preventiva de quedas. Pesquisa aprovada pelo parecer de número 541.619. Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da Universidade CEUMA. Estudo descritivo de corte transversal com amostra aleatória composta por 60 mulheres com idade acima de 60 anos, iniciantes no projeto Uniceuma sem Fronteiras. Utilizou-se o questionário de saúde geral

(PROMIS 10) para avaliar a percepção geral da saúde das idosas. Na avaliação diagnóstica aplicou-se o MEEM (Mini Exame do Estado Mental) antes e após a intervenção que avaliou o nível cognitivo das participantes. A intervenção constou de um protocolo cinesioterapêutico com demandas físicas e cognitivas aplicado durante dezesseis semanas, 50 minutos por sessão duas vezes por semana. Os dados foram tabelados no EXCEL 2010 e analisados com base em percentuais. Os resultados mostraram que 75% não relatou queda nos últimos seis meses. A saúde foi considerada boa por 48,34% das idosas, a classificação da dor no grupo teve média 3 pela escala analógica visual. O MEEM no pré-teste obteve uma média de 26,51 pontos considerado o nível normal de cognição, no pós-teste a média foi de 28,10 pontos, com uma amostragem de 39 participantes, a média alta do grupo pode ser explicado pelo alto nível de escolaridade das participantes. O estudo mostrou que a associação de exercícios físicos e da estimulação ajudou na melhoria da cognição que acarretou na diminuição do risco de quedas nas idosas. Palavras Chave: Cognição. Idoso. Prevenção. Queda.

ELABORAÇÃO DE HAMBURGUER DE CAJU (ANACARDIUM OCCIDENTALE) ADICIONADO COM FARINHA DO MESOCARPO DE BABAÇU (ATTALEA SPECIOSA)

VICTOR, Thayslany Soares*; DA SILVA, Noeme Barbosa; SOUZA, Ângela Tamara Lemos; SILVA, Maria Raimunda Chagas.

Email: thaysllany.v@hotmail.com

Área / Especialidade: Nutrição

Introdução: O hambúrguer é um atrativo em grandes centros urbanos, devido sua praticidade e rapidez no preparo. Visando elaborar um produto derivado do caju enriquecido com farinha do mesocarpo do babaçu sendo assim uma escolha para o aproveitamento de matérias primas regionais. **Objetivos:** Realizar a análise centesimal e físico-química. **Metodologia:** Na análise centesimal foi quantificado lipídios, umidade e cinzas. Os hambúrgueres foram analisados quanto às características físico-químicas (pH) e centesimal (lipídios, umidade e cinzas). Os lipídios foram determinados pelo método da titulação, o procedimento utilizado para determinação de cinzas e umidade foi através do método de cinzas secas já para quantificar pH utilizou-se somente o pHmetro digital. **Resultados:** Foi observado que não houve alterações discrepantes quando comparado com hambúrgueres similares, apresentando pequenas variações quando comparado ao hambúrguer de caju com farinha de trigo: pH variando de 6,20 a 6,31; umidade de 77,15% a 83,02%; cinzas de 2,59 a 3%; não houve nenhuma diferença em relação aos lipídeos, as duas amostras apresentam mesmo resultado de 0,03%. **Conclusão:** Foi possível perceber que o produto é de grande valor nutritivo. Possui potencial para competir com sucesso em relação a outros hambúrgueres, tanto para produção como para comercialização. É

importante ressaltar que as matérias-primas utilizadas são regionais, além de serem enriquecedoras por seus valores nutricionais. Palavras-chave: Hambúrguer, mesocarpo de babaçu, nutrientes.

ESTUDO DAS ALTERACOES PSICOLOGICAS DE ATLETAS EM REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SAO LUIS-MA

SOUZA, Bruna Aparecida Costa*; ALVES, Rafaella Gonçalves Fahd; ANCELES, Thiago Henrique Caldas; DUARTE, Maria Vitória Alves; HAIDAR FILHO, Agêge; HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho Barbosa

Curso: Fisioterapia

Email: brusouz12@gmail.com

O campo de atuação da área da Psicologia no esporte é o estudo das situações que envolvem temas como motivação, personalidade, agressão, violência, atenção, concentração, liderança, dinâmica de grupo, bem-estar do atleta, caracterizando-se como um espaço onde o enfoque social, educacional e clínico se complementam. OBJETIVO: Estimar a prevalência de alterações psicológicas de atletas de futebol em reabilitação fisioterapêutica. METODO: Estudo descritivo com amostra selecionada por amostragem não probabilística. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado em 18 atletas, com idade entre 18 e 30 anos que se encontravam em programa de reabilitação fisioterapêutica na Axial Clínica de Fisioterapia em São Luís MA no período de janeiro a abril de 2013. A Pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade Ceuma com o Protocolo nº 014592/2013. RESULTADOS: Os resultados demonstraram que 55% não apresentaram sentimento de perda financeira e de convívio; 100% não apresentaram sentimento de desistência e 45% se preocupou com o tempo de reabilitação sem comportamento agressivo, e 45% se preocupou com a perda da posição no clube. Entre os atletas investigados 23% tinham idade de 18 a 24 anos e 77% de 25 a 30 anos; e todos evoluíram para cura e reabilitação. CONCLUSÃO: A presente pesquisa revelou que a amostra estudada pode apresentar alterações psicológicas ainda que em menor prevalência nos resultados encontrados.

EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE SYZYGIUM JAMBOLANUM: UMA ANÁLISE FITOQUÍMICA

SAUAIA, Bismarck Ascar*; LIMA, Evenny Nascimento; NASCIMENTO, Katyane Silva; DINIZ, Roseana Muniz.

Curso: Biomedicina

Email: katyanenascimento@hotmail.com

As informações sobre recursos naturais vegetais contendo princípios medicamentosos, popularmente aqueles de atividade antimicrobiana promovem um menor custo e baixa toxicidade na constituição de novos fármacos. Há muito já se conhece os princípios terapêuticos de extratos vegetais de numerosas famílias. O presente trabalho avaliou o perfil fitoquímico de *Syzygium jambolanum* (jambolão), para isso foram utilizados extrato hidroalcoólico da polpa do fruto e raspa do caule, a partir de um roteiro analítico já descrito. Os resultados demonstraram a presença de substâncias químicas e farmacológicas antimicrobiana (antibacteriana, antiviral, antileishmanial), anti-inflamatória. Foram definidas maiores concentrações simultaneamente nos dois extratos de: fenóis e taninos hidrolisáveis, isoladamente de antocianinas, antocianidinas, flavonóis e flavononas. As diferentes regiões dos vegetais da família Myrtaceae, apresentam grandes diversidade na concentração e especificidade de princípios fitoterapêuticos para possíveis composições farmacológicas. Apesar da tendência de uso sintético de produtos farmacológicos, o custo e a alta toxicidade possibilitaram, nas últimas décadas, a busca mais refinada por substâncias naturais vegetais.

FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E OCUPACIONAIS RELACIONADOS A DESCONFORTOS OSTEOMUSCULARES EM SERVIDORES PÚBLICOS

RODRIGUES, Nathanny Morais*; DOS SANTOS, Rafael Duarte; GONÇALVES, Maria Claudia; CARVELHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar

Curso: Fisioterapia

Email: nathanny_morais.rd@hotmail.com

Alguns trabalhos, a curto, médio e longo prazo, causam repercussões nos sistemas orgânicos do trabalhador através aspectos biopsicossociais, especificamente em quadros de algias e parestesias. Assim, este estudo objetiva analisar a relação entre fatores sociodemográficos e ocupacionais e desconfortos osteomusculares referidos pelos servidores públicos do estado do Maranhão atendidos no Espaço Vivência do Servidor. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal e observacional, realizado com servidores públicos do governo do estado do Maranhão que são atendidos no Espaço de Vivência do Servidor. Participaram do estudo 50 servidores públicos. Os dados foram obtidos através de questionários abordando informações sócio demográficas e ocupacionais dos participantes e também do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (Parecer número 1.571.672). A maioria dos pesquisados era do gênero feminino 39 (78%), apresentando média de idade de 42,4 anos ($\pm 8,7$). 86% dos servidores estudados relataram apresentar algum tipo de sintomas osteomusculares, como dor, dormência, formigamento ou desconforto em uma ou mais regiões do corpo, localizados principalmente na coluna cervical,

dorsal e lombar. Dentre os fatores sociodemográficos e ocupacionais relacionados a esta sintomatologia, verificou-se uma associação positiva com o gênero ($p = 0.02$), idade ($p = 0.003$), índice de massa corporal ($p = 0.002$) e tempo de trabalho ($p = 0.02$). Neste contexto, se faz necessárias pesquisas aprofundadas sobre o acometimento de LER/DORT nestes servidores, bem como análise ergonômica de seu ambiente de trabalho, visando enfatizar a importância da prevenção na qualidade de vida desses profissionais.

FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE ASMÁTICOS ADULTOS

DOS SANTOS, Flávia Milena Silva*; DO NASCIMENTO, Leia Ribeiro; RIBEIRO, Kerly Madeira; MORAES, Valkiria Kerly Almeida; CARVALHO, Laíse Neves; FERREIRA, Patrícia Rodrigues

Curso: Fisioterapia

Email: flaviamilen@hotmail.com

Em asmáticos ocorrem adaptações no sistema respiratório em decorrência da desvantagem mecânica originada pela resistência das vias aéreas aumentadas. O objetivo desse estudo foi descrever a força muscular respiratória de asmáticos adultos. Estudo observacional, quantitativo do tipo corte transversal, realizado com 16 indivíduos de ambos os gêneros com idade entre 21 e 78 anos com asma moderada e grave controlada. O estudo foi realizado entre agosto e setembro de 2015 no núcleo de pesquisa em reabilitação funcional da Universidade Ceuma. Para análise da força muscular respiratória foi utilizado um manuvacuometro analógico. Na análise descritiva, as variáveis quantitativas foram descritas em mediana, mínimo e máximo. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA, com registro nº 137.504. Na amostra analisada, a mediana da P_lmáx foi de -57,5 cmH₂O (-30; -100) e da P_Emáx foi de 70 cmH₂O (+4; +110). Este estudo concluiu que pacientes asmáticos moderados e graves possuem fraqueza da musculatura respiratória, principalmente dos músculos inspiratórios com obtenção de valores baixos da P_lmáx.

HABILIDADES COMUNICATIVAS NA ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA: ESTUDO DE CASO CLÍNICO

ISRAEL, Selmara Castelo Branco*; SILVA, Mabile Francine Ferreira

Email: maraisrael94@hotmail.com

Área / Especialidade: Fonoaudiologia

Pessoas com encefalopatia crônica não progressiva podem apresentar diversas limitações motoras, como também cognitivas, sensoriais e graves alterações na comunicação o que irá dificultar sua inclusão no meio social. Sendo assim, a intervenção do profissional auxilia no processo de ensino-aprendizagem da pessoa com encefalopatia crônica não progressiva falante

e não-falante por meio do sistema de comunicação suplementar e/ou alternativa. Este estudo objetiva que ao se utilizar o recurso de comunicação suplementar e/ou alternativa o paciente com encefalopatia crônica não progressiva atendido pelo setor de fonoaudiologia possa ter auxílio em seu processo de ensino e aprendizagem, e assim facilitar a inclusão do mesmo no meio social. Neste trabalho serão registrados por escritos as sessões de fonoterapia, assim como a utilização de recursos como as pranchas de comunicação suplementar e/ou alternativa e jogos interativos. O trabalho tem como finalidade observar a evolução do participante ao longo do tratamento fonoaudiológico, bem como a eficácia do sistema de comunicação suplementar e/ou alternativa.

IMPACTO DO AQUECIMENTO E DESAQUECIMENTO VOCAL E DA PERCEPÇÃO DA DESVANTAGEM VOCAL EM CANTORES RELIGIOSOS AMADORES.

AIRES, Michelle Cristine Gomes da Anunciação*; FERRAZ, Pablo Rodrigo Rocha.

Curso: Fonoaudiologia

Email: michellecrys14@hotmail.com

O aquecimento e desaquecimento vocal são fundamentais, respectivamente, para um bom aprimoramento na qualidade vocal e reajustes fonoarticulatórios da voz. A ausência dessas práticas pode causar um quadro de abuso vocal e disfonia. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a voz e a percepção da desvantagem vocal após o programa de aquecimento e desaquecimento vocal em cantores amadores religiosos. Estudo analítico-descritivo do tipo transversal com mulheres adultas com idade ≥ 18 anos e que nunca fizeram acompanhamento fonoaudiológico. Os participantes foram avaliados por meio de um questionário sócio demográfico, do protocolo de Índice de Desvantagem Vocal no Canto Moderno e da avaliação perceptivo-auditiva da voz por meio da gravação das vozes em 4 momentos: antes do aquecimento vocal, após o aquecimento vocal, após o ensaio do coral e após o desaquecimento vocal. Os dados foram tabulados com o software Excel para o cálculo e análise da estatística descritiva univariada (porcentagem, médias e valores absolutos). Espera-se como resultado que os cantores religiosos amadores apresentem percepção da desvantagem vocal e impacto positivo após o programa de aquecimento e desaquecimento vocal. Esta pesquisa obteve aprovação do CEP da Universidade CEUMA sob o número 1.661.758. As análises dos resultados estarão concluídas até a realização do Congresso de Saúde e Bem-Estar.

IMPACTO DO ZUMBIDO NO RESULTADO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE RECONHECIMENTO DE FALA (IPRF).

BARROS, Thayanne de Sousa*; CALDAS, Érica Alessandra;

Curso: Fonoaudiologia

Email: thayanne_barros@hotmail.com

Zumbido é definido como a percepção auditiva na ausência de uma fonte sonora externa. Ele prejudica a qualidade de vida, causando prejuízo na comunicação. Objetivo: Investigar possíveis alterações no IPRF em indivíduos portadores de zumbido. Método: De caráter retrospectivo, o presente trabalho consiste na análise de 48 avaliações audiológicas do banco de dados da Clínica Escola de Fonoaudiologia Ana Lúcia Chaves Fecury da UNICEUMA de São Luís, de agosto/ 2015 a novembro/2015, após terem sido submetidos a avaliação audiológica. Resultados: 19 orelhas de pacientes com idade entre 18 e 61 anos, 7 orelhas do sexo feminino e 12 orelhas do sexo masculino. Houve prevalência do gênero masculino em (60%). Sendo que aproximadamente (95%) da amostra total não apresentaram nenhuma dificuldade de compreender a fala e apenas aproximadamente (5%) equivalente a 1 orelhas apresentou discreta dificuldade para compreender a fala. Conclusão: A presença de zumbido não interfere na inteligibilidade da fala, analisada através do IPRF. Palavras – chave: zumbido, audiometria normal, IPRF.

IMPRESSÕES DA COR DA PELE: O CORPO NÃO TEM NATUREZA, TEM HISTORIA

ARAÚJO, CARLA MATOS DE ARAUJO; OLIVEIRA, CHRISTIANNY VALENTE

Curso: Psicologia

Email: cacau.fortes@hotmail.com

Resumo : O presente artigo foi inspirado a partir de projeto de pesquisas cujo o campo de análise foi as pessoas inseridas no tambor de crioula maranhense um movimento negro, da cidade de São Luís. Buscou-se investigar, discutir e analisar como pensam essas pessoas, como elas se percebem diante das marcas históricas e culturais existente em suas individualidades e na sua corporeidade. Tendo como prisma a construção da pessoa humana através da história de vida e a construção da identidade corporal do sujeito de descendência negra que pratica seu ideal dentro dos padrões, que ignora sua individualidade étnico-cultural. Dessa forma a pesquisa contribuiu para o “empoderamento” da corporeidade dos negros, que tiveram o corpo como elemento central para negação de sua origem racial. Esse panorama convoca-nos a discutir os principais motivos que determinam a dificuldade da pessoa negra em reconhecer o seu corpo em sua negritude e como são percebidos pela sua subjetividade. Compreende-se que a prática do Tambor de Crioula favorece o dar-se conta da corporeidade, uma vez que a pessoa manifesta o que sente, expressa seus sentimentos, se contém e se move e tem a consciência destes sentimentos e atitudes corporais. Acredita-se que essa percepção acontecerá quando ele se sentir sujeito da sua própria história e para sentir-se, é necessário conhecer a história, “despertar” e promover um movimento de auto aceitação de sua negritude e dos valores dos

seus antepassados. Compreende-se a necessidade de um olhar sobre o processo de negritude e a constituição subjetiva do corpo. Palavras Chaves: LIBERDADE, RAÇA, PSICOLOGIA E CORPO

INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE OCORRIDAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

ALMEIDA, Hariane Freitas Rocha*; RODRIGUES, Cianna Nunes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; ALVES, Raissa Pinheiro Lobato; CALAZANS, Dagolberto Araújo Pereira; SANTIAGO, Lilia De Cássia Piedade

Email: harianealmeida@hotmail.com

Curso: Enfermagem

Resumo: As infecções são as mais frequentes e importantes complicações ocorridas em pacientes hospitalizados. Objetivou-se descrever as infecções relacionadas a assistência à saúde ocorridas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público em São Luís-MA. Tratou-se de um estudo descritivo, analítico e transversal realizado com 1048 pacientes internados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Para análise estatística foi utilizado o Programa Bioestat 5.0, usado o Teste Qui-quadrado estimando a Odds Ratio (OR), intervalo de confiança de 95% e valor $P < 0,001$, e o Teste Kruskal-Wallis. 50,38% eram do sexo feminino; 37,11% tinham mais de 65 anos; 43% foram internados para realizar cirurgia eletiva; 48,5% foram oriundos do centro cirúrgico; a duração média das internações foi de 7,41 dias e 31,25% evoluíram ao óbito. Em relação às infecções, 47,03 % apresentaram Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAVM), 15,14% Pneumonia Nosocomial, 14,05% Infecção do Trato Urinário (ITU) e 9,73% Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS). Em relação aos óbitos, os pacientes com PAVM têm chance 4 vezes maior de evoluírem a óbito do que os pacientes que não apresentaram nenhum tipo de infecção ($p < 0,0001$); e também apresentam maior probabilidade de desenvolver sepse e choque séptico do que os pacientes que apresentaram ITU ($p = 0,008$). Constatou-se que a infecção mais incidente foi a PAVM, o que sugere uma reavaliação nos protocolos assistenciais. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade CEUMA por meio do parecer nº 539739 de 24 de fevereiro de 2014

INDICADORES DE SAÚDE BUCAL DO PACTO PELA SAÚDE EM RELAÇÃO ÀS FEDERAÇÕES COM EXTREMOS IDH

MORAES, Gabriel Felipe De Oliveira*; FERNANDES, Juliana De Cássia Braga; REIS, Waneska Ferreira Cavalcante Albuquerque

Curso: Odontologia

Email: gabrielmoraes17@outlook.com

Poucos estudos utilizando indicadores de saúde para avaliar os serviços de saúde bucal da população têm levado em conta a condição socioeconômica. No entanto, a relação entre o desempenho dos indicadores de saúde bucal em relação ao status socioeconômico da população é subsídio para avaliação do princípio de equidade preconizado pelo SUS. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi comparar unidades federativas com diferentes Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) em relação aos indicadores do Pacto pela Saúde (PS) do biênio 2010-2011. Método: Trata-se de um estudo longitudinal onde foram utilizados indicadores do PS, os quais foram comparados em dois grupos formados por Unidades Federativas (UF) com extremos IDH. Para a avaliação da equidade foi realizada análise bivariada por meio da correlação de Spearman (Rs), considerando como variável explicativa o IDH e como variáveis de desfecho os indicadores selecionados. Resultados: Os indicadores de Cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada, Cobertura populacional estimada das equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família e a Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família tiveram Coeficientes de Correlação de Spearman inversamente correlacionado, com p valor significantes ($p < 0,05$). Conclusão: Para os indicadores utilizados do PS biênio 2010-2011, as UF menos favorecidas socioeconomicamente apresentaram um melhor desempenho, o que coopera com o sentido da equidade.

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS OCORRIDAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO LUÍS-MA.

MARTINS, Debora Bastos*; RAMOS, Aline Sharlon Maciel Batista; ROCHA, Francisca das Chagas Gaspar; SANTIAGO, Lília De Cássia Piedade; BOGÉA, Gislaine Pinto; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; RODRIGUES, Ciana Nunes

Curso: Enfermagem

Email: dedeiamenine@hotmail.com

A infecção hospitalar (IH) representa uma condição grave que influencia na morbimortalidade dos pacientes que permanecem internados. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os pacientes encontram-se acamados por tempo prolongado, imunodeprimidos, com doenças graves que necessitam de monitoramento invasivo e uso de antibióticos de largo espectro, tornando-os mais suscetíveis às IH. Encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA, sob parecer CAAE nº: 539739. Objetivou-se estudar os casos de infecções respiratórias ocorridas em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público de São Luís-MA. Foi realizado um estudo descritivo, analítico e transversal realizado em um hospital público situado

no município de São Luís-MA. A população constituiu-se de 1048 pacientes que foram internados na UTI do referido hospital no período janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Desses pacientes 50,4% eram do sexo feminino; 37,11% estavam acima de 65 anos; 43% foram admitidos para realizarem cirurgias eletivas; 48,5% eram originários do Centro Cirúrgico e 31,35% desses pacientes evoluíram ao óbito. Em relação às IH ocorridas, 47,03% dos pacientes apresentaram Pneumonia associada à Ventilação mecânica (PAVM) e 15,14% apresentaram Pneumonia Nosocomial. Pode-se afirmar que o impacto gerado pelas infecções respiratórias é uma realidade mundial, sendo resultado em parte da ausência ou inadequação da aplicação de ações necessárias ao controle de infecção hospitalar e, conseqüentemente, da qualidade assistencial prestada pelo serviço de saúde.

INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOECONÔMICOS E NUTRICIONAIS DA GESTANTE NO PESO DO NEONATO

SILVA, Miura Rayana Santos da*; SILVA, Teresa Raquel Ferreira da; SILVA, Eliziane Gomes da Costa Moura da; BELFORT, Iara Araujo; LIMA, Virginia Nunes; CARVALHO, Carolina.

Email: teresarferreira@hotmail.com

Curso: Nutrição

O estado nutricional e adequado ganho de peso materno são fatores importantes para o bom resultado da gravidez e para a manutenção posterior da saúde, da mãe e do bebê. O objetivo desse trabalho é analisar a influência dos fatores socioeconômicos e nutricionais da gestante no peso do neonato. Foi realizado um estudo transversal, com 37 mulheres que fizeram pelo menos uma consulta pré-natal, em dois hospitais municipais, utilizando questionário de dados sócio-demográficos e secundária, através de prontuários, obtendo informações sobre as condições de saúde e nutrição da mãe e do neonato. Após análise descritiva, as variáveis qualitativas foram apresentadas através de frequências e porcentagens e as quantitativas por média e desvio padrão. Aplicou-se teste exato de Fisher, valor de significância de 5%. CEP 1.471.745, de 29 de março de 2016. Constatou-se uma população, acima de 20 anos (86,49%), com ensino superior completo/incompleto (59,46%), (78,38%) viviam com companheiro, (86,49%) renda mensal de até 2 salários mínimos, (91,89%) não tinha hábito de fumar e (83,78%) não bebiam. 67,57% realizaram adequado número de pré-natal, 56,76% tinham IMC pré-gestacional adequado, 27,03% baixo peso e 16,22% excesso de peso, com média $21,48 \pm 4,07 \text{ kg/m}^2$. Ganho total de peso gestacional médio foi $10,0 \pm 3,77 \text{ kg}$, e 75,68% estavam no parâmetro adequado. Houve associação estatística de peso ao nascer/ganho de peso gestacional ($p=0,05$). Concluiu-se que o ganho de peso gestacional adequado e o acompanhamento do pré-natal eficaz tornam-se

essenciais para uma boa gestação, sendo necessárias estratégias de melhoria do serviço, locais de atendimento e profissionais de saúde.

INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES FÍSICO-COGNITIVAS NO RISCO DE QUEDA E MEDO DE CAIR DE IDOSOS.

SILVA, Lídia Maria Lopes Da*; CAMPOS, Jessica Kerly Garces; MATOS, Pâmella Mayara Ferreira De; SOARES, Karla Virgínia Bezerra De Castro.

Modalidade: PP Email: lidia.lmls@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

Objetivou-se analisar o efeito de um protocolo cinesioterapêutico de dupla tarefa visando à diminuição do risco de queda e o medo de cair de idosos. Pesquisa aprovada pelo parecer de numero 541.619. Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da Universidade CEUMA. Estudo descritivo, realizado na Universidade Ceuma em São Luís – MA em 2015, amostra randomizada composta por 43 idosas. Como intervenção foi aplicado um protocolo cinesioterapêutico envolvendo exercícios físicos e cognitivos durante 16 semanas, 2 vezes por semana, 50 minutos por sessão. Como instrumentos de coletas elegeram-se a Escala de Tinetti, versão adaptada ao Brasil, que avalia a mobilidade e equilíbrio postural em idosos correlacionando-o ao risco de cair e o FES-BRASIL, que avalia a o medo de cair do idoso. Os resultados foram tabelados em Excel e analisadas as médias aritméticas. Com relação ao medo de cair encontraram-se médias de 32,046 antes e 30,372 depois apontando uma redução em 60,46% na amostra. Para o risco de cair observou-se variação média de 24,075 com baixo risco antes e 25,225 para depois, onde 35% da amostra permaneceu igual e 15% diminuiu o risco de cair. Através dos resultados obtidos podemos concluir que a aplicação de atividades físico-cognitivas diminui o medo de cair de idosos, melhorando a confiança e senso de autonomia sugerindo-se a aplicação das atividades em programas de prevenção de quedas de idosos; em relação ao risco de cair, os resultados não foram suficientemente positivos a fim de diminuir o risco de queda, portanto, sugere-se um maior tempo de intervenção. Palavra chave: Idosos; Medo de cair; Quedas.

INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DE DOWN NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DA SILVA, Bianny Beatriz Teixeira*; FALCÃO, Bianny Beatriz Teixeira; GONÇALVES, Maria Claudia; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar

Curso: Fisioterapia

Email: biannyteixeira@yahoo.com.br

A Síndrome de Down (SD) geralmente resultam no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, levando a dificuldade de aquisições motoras e estigmas sociais Contudo,

peessoas com SD podem levar uma vida saudável e com plena inclusão social, se estimulados e assistidos apropriadamente. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo comparar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com e sem SD. Tratou-se de um estudo observacional, transversal, comparativo de natureza quantitativa. Fizeram parte desta pesquisa 20 crianças e adolescentes, divididos em dois grupos, Grupo Down (GD) e Grupo Controle (GC), com idades entre 10 e 21 anos. Para tanto, utilizou-se como instrumento de coleta de dados a versão brasileira do Questionário de Qualidade de vida SF-36. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética através do parecer número 1.395.136. Dentre os domínios da qualidade de vida abordados no SF-36, os participantes com SD apresentaram o aspecto referente à dor com escore significativamente superior e à capacidade funcional significativamente inferior, quando comparado aos sem SD. A análise comparativa dos demais domínios do questionário SF-36 não demonstraram diferenças significativas. Estes resultados podem ser úteis já que sugere que para promover melhor qualidade de vida a estes indivíduos, os profissionais de saúde devem realizar estratégias de avaliação, prevenção e intervenção direcionada ao aprimoramento da capacidade funcional e desempenho das AVD's. Sugerem-se novos estudos sobre a qualidade de vida de crianças e adolescentes com SD, com maior amostra e caráter longitudinal.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES SEQUELADOS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO NA CLÍNICA ESCOLA DA UNIVERSIDADE CEUMA

COSTA, Raphaelly*; MARTINS, Wallida Katrine Canindé; VIEIRA, José Newton Lacet; Vieira, Aldiléa Mota de Azevedo.

Email: phaelly2009@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico é uma patologia que tem repercussões drásticas no âmbito socioeconômico, sendo nos países europeus a maior causa de incapacidades. **Objetivo:** Descrever a intervenção fisioterapêutica em pacientes sequelados de Acidente Vascular Encefálico, na clínica escola de fisioterapia da Universidade CEUMA. **Material e Métodos:** Estudo descritivo, com delineamento retrospectivo, baseado na análise de prontuários de pacientes sequelados de Acidente Vascular encefálico, atendidos na Clínica Escola da Universidade CEUMA, no período de 2013 a 2014. Os dados foram sistematizados e coletados através de uma ficha pré-codificada para obter informações referentes a história clínica, aos indicadores sociodemográficos, e ao tratamento fisioterapêutico. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Universidade CEUMA, com o nº do parecer 1.423.123/2016. **Resultados:** Foi identificada na amostra a maioria do sexo masculino 18 (56%), a média de idade foi de 62,0 anos ($\pm 5,2$). A hipertensão arterial 27 (84%) foi a mais prevalente

dentre os pacientes. Há uma maior frequência de Hemiplegia 18 (56%) dentre os pacientes. Verificou-se que o hemicorpo mais acometido por estas afecções foi o hemicorpo direito 19 (59%). A cinesioterapia foi o mais utilizado na reabilitação ambulatorial das sequelas de acidente vascular encefálico, sendo relatada em 29 (91%) dos prontuários. Conclusão: Sugere-se que haja um maior controle dos prontuários dos pacientes, para que informações importantes sobre estes pacientes atendidos na clínica escola, não deixem de ser citadas durante a avaliação e a evolução, para ser possível obter o maior número de dados clínicos. Palavras-chave: Fisioterapia, Complicações, Acidente Vascular Cerebral.

INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DA ASSOCIAÇÃO DE CORANTES USADOS EM TERAPIA FOTODINÂMICA SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS

GALDINO, Dhara Yanka Tiburtino; LEÓDIDO, Gabriela da Rocha; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini; GONÇALVES, Leticia Machado

Curso: Odontologia

Email: dhara_yanka@hotmail.com

Terapia fotodinâmica (TFD) envolve a associação de fotossensibilizadores e fontes de luz facilmente encontradas em consultórios odontológicos para se controlar o crescimento de microrganismos encontrados na cavidade bucal. Com intuito de diminuir a toxicidade dessa terapia sobre os tecidos dentais, a associação de corantes visando o sinergismo de ação e aumentando assim a atividade antimicrobiana seria uma interessante proposta a ser investigada. Desta forma, o presente estudo avaliou o potencial sinérgico dos corantes rosa de bengala e eritrosina sobre suspensão planctônica de *S. mutans*. Após o crescimento da bactéria em meio BHI + glicose, a suspensão foi centrifugada e ajustada a um número previamente determinado. Para a avaliação da efetividade da TFD, uma fonte de luz LED de alta potência em emissão pulsada (T = 40 segundos de irradiação) associada a combinação de corantes (RB = 1,5uM e ER = 3,5uM – Grupo TFD: RB+ER+L+) foi testada sobre o inóculo ajustado. Adicionalmente, foi verificado o efeito isolado dos corantes (grupo corante = RB+L-; ER+L- e RB+ER+L-), efeito isolado da luz (grupo RB-ER-L+) comparados ao grupo controle (RB-ER-L-). Verificou-se que o grupo TFD apresentou diferença estatisticamente significativa ($p < 0,05$) em relação à todos os outros grupos testados com significativa redução bacteriana. Pôde-se concluir que a associação de corantes estudados irradiados com uma fonte de luz de alta intensidade apresentou eficácia fotodinâmica antimicrobiana contra suspensão planctônica de *S. mutans*.

JOGO INCLUSIVO: UMA PROPOSTA DE AUXÍLIO AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

MOURA, Mauricyo Marden e Santos; ANDRADE, Lívia Maria Guedes de Lima; SOARES, Alexsandro Pereira

Curso: Psicologia

Email: liviaguedesandrade@gmail.com

Resumo : A criança possui várias formas de apreender os conhecimentos que já estão no mundo de forma dada, a sua compreensão da cultura e sua aprendizagem se faz por um processo de mediação onde o adulto normalmente é o ser que não a deixa “à deriva”. Esse processo de mediação não é exclusivo dos adultos que a cercam, pois entre iguais, há também uma elaboração das matizes de como o mundo funciona. Ao trabalhar com as crianças portadoras de síndrome de down, há implicações na velocidade em captar as informações e dificuldade no processo de aprendizagem, assim devem-se elevar os estímulos e ainda contar com a mediação de um profissional como psicólogos, psicopedagogos ou ainda um profissional da educação inclusiva, estabelecendo uma interação afetiva com a criança. Este projeto se propôs a desenvolver um jogo educacional para auxiliar profissionais que trabalham com crianças portadoras de síndrome de down para inserção de conteúdo básico de forma complementar. Como método foram realizadas as revisão bibliográfica de assuntos pertinentes ao tema e a partir de uma metodologia de projeto de design foi criado o protótipo do jogo, que oferece características de montagem e desmontagem permitindo o uso livre dos profissionais de acordo com as necessidades e conteúdo ensinado. O projeto foi desenvolvido com a proposta de melhorar o processo de aprendizagem das crianças com síndrome de Down, porém, não é um trabalho de público exclusivo e específico, é destinado também ao público infantil geral que se encontra na mesma fase de ensino básico.

MENSURAÇÃO E DEGRADAÇÃO DAS FORÇAS PRODUZIDAS POR ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS EM MEIO SECO E ÚMIDO

DOS SANTOS, Reginaldo Victor Pereira*; VERAS, Marcela Viégas; COSTA, Ana Carla Souza; LIMEIRA, Herick Cruz; CASTRO, Igor Renault Marques; BRAMANTE, Fausto Silva; VERCLINO, Célia Regina Maio Pinzan

Email: regisrvps@outlook.com

Área/Especialidade: Odontologia

Os elásticos foram introduzidos na Odontologia/Ortodontia por Henry Baker no século XIX, como coadjuvantes na correção de má oclusões de Classe II e Classe III respectivamente. Os elásticos de látex podem ser utilizados de forma intra e extra-bucal, como auxiliares para correção antero-posterior, de linha média, intercuspidação, dentre outros. São ferramentas simples, de baixo custo, mas que necessitam da colaboração do paciente. Este trabalho teve

como escopo avaliar in vitro 2 tipos de elásticos ortodônticos usados na prática e rotina clínica dos ortodontistas. Foram utilizados elásticos em tamanhos e três marcas comerciais muito utilizadas no mercado, sendo eles: 3/16" e 5/16" contemplando a marca comercial nacional; MORELLI e as importadas; ORTHOMETRIC e TP Orthodontics. Os elásticos foram distendidos três vezes seu diâmetro interno e medidos sua magnitude de força ao início (0hs), 24, 48 e 72 horas após. Os elásticos foram divididos em três grupos com n amostral de 12, e testados em campo seco e úmido (saliva artificial) em temperatura de 37 graus. A magnitude das forças exercidas pelos mesmos foi mensurada por meio de dinamômetro digital. Os resultados demonstraram que todos os elásticos ao início das medições apresentaram valores abaixo da média de 113g e nas mensurações seguintes em 24, 48 e 72 horas houve perdas estatisticamente significantes de suas forças.

MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO INFORMATIZADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E A COMPATIBILIDADE COM A NR-17

SERRA, Dalvina Tatiane Garcia Gomes*; SOUSA, Jéssica Izlene Rocha; CORREA, Valéria Cristina dos Anjos; DE CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; FRANCO, Rauanna Ketlin Silva; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; GONÇALVES, Maria Claudia

Curso: Fisioterapia

Email: thaty.projeto28@hotmail.com

A NR17-ERGONOMIA deve ser seguida pelas empresas para garantir aos trabalhadores conforto, segurança e eficiência durante a atividade ocupacional. Destaca-se que o trabalho informatizado exige mudanças significativas no ambiente ocupacional e na forma do indivíduo efetuar suas tarefas laborais, de forma a torna-lo o mais adequado possível. OBJETIVO: Comparar o mobiliário dos postos de trabalho informatizados da Previdência Social com as condições estabelecidas pela NR17. MÉTODO: Foi utilizada a primeira fase do método SHTM (sistema-homem-tarefa-máquina) de apreciação ergonômica. A amostra foi constituída por trabalhadores dos Postos de Trabalho Informatizados da Previdência social. Para a coleta de dados, foram feitas fotografias dos trabalhadores em suas estações de trabalho, sendo estas analisadas pelo software de diagramação de fotos, Kinovea versão 8.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, Parecer: 628.871. RESULTADOS: A mediana da idade dos trabalhadores foi de 53. A maioria do gênero feminino (60%). Nas fotos foram observados monitores baixos, teclados e mouses em alturas inadequadas quando comparadas com postura adequada para a atividade desenvolvida. A mesa de trabalho sem mecanismos de ajustes para altura, portanto trabalhadores de baixa estatura necessitavam de apoio para os pés e os de maior estatura poderiam apresentar desconforto quanto a postura dos membros inferiores. Foi

identificado que as cadeiras dos postos de trabalho possuíam sistema de regulagem, porém os previdenciários as regulavam e não possuíam apoio para os pés. **CONCLUSÃO:** Diante das condições de trabalho encontradas concluiu-se por meio da comparação com a NR17 que o mobiliário, dos trabalhadores está em desacordo.

MORTALIDADE POR LINFOMA NÃO-HODGKIN NO ESTADO DO MARANHÃO

GARCEZ, Marcos Vinicius Maciel*; DUARTE, Rositânia Alves; PIRES, Rômulo César Rezo; MOURÃO, Thaianne Polanna de Carvalho; VIEIRA, Clarissa Lopes

Curso: Odontologia

Email: garcez27@hotmail.com

Os Linfomas constituem um grupo heterogêneo de doenças malignas responsáveis por 3-4% de todos os cânceres no mundo. No Brasil, o linfoma é a segunda neoplasia mais incidente em menores de 19 anos. Entre as regiões brasileiras, o nordeste apresenta as maiores magnitudes de variação percentual de aumentos em óbitos. Este trabalho tem como objetivo principal fazer uma revisão bibliográfica sobre mortalidade dos linfomas Não-Hodgkin (LNH) no Maranhão. A taxa de mortalidade por LNH tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, principalmente em países desenvolvidos. Vários fatores estão relacionados a este aumento, tais como melhoria na captação dos registros e no diagnóstico de câncer, além de fatores socioeconômicos. Entre as regiões brasileiras, a nordeste vem apresentando as maiores taxas de mortalidade, principalmente em homens com faixa etária superior a 40 anos. Estudo realizado no Maranhão aponta aumento crescente na taxa de mortalidade por LNH entre os anos de 2004 e 2014, registrando sua maior taxa em 2013 (1,09) e menor taxa no ano de 2005 (0,59). Estudos apontam que países em desenvolvimento podem apresentar maior incidência de LHN. Alguns pesquisadores sugerem que fatores socioeconômicos tenham estreita relação com o desenvolvimento da doença. No Brasil, houve aumento na taxa de mortalidade nos últimos anos e o nordeste apresentou a quarta maior taxa de mortalidade no período de 2009 – 2012. O Maranhão registrou aumento nas taxas de mortalidades o que poderia ter sido influenciado pelos fatores socioeconômicos já que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil com 63,5% da população pobre.

NÍVEL DE HIDRATAÇÃO EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

SIQUEIRA, Samanta de Jesus Silva*; MAIA, Ednei Costa; CARVALHO, Luan Rebouças; DA SILVA, Fernando Aquiles; SOARES, Carvalho Rezende; DE CASTRO FILHA, Jurema Lopes

Curso: Educação Física

Email: rezende03@hotmail.com

O trabalho teve o objetivo de comparar os níveis de hidratação dos praticantes de musculação do sexo masculino e feminino. A hidratação é um importante fator interveniente no desempenho físico, assim como as condições ambientais de altas temperatura e umidade, que dificultam a regulação térmica do corpo em exercício e contribui para a redução no nível de hidratação. Participaram 30 pessoas de ambos os sexos com seis meses ou mais de prática de musculação. Coletou-se dados de massa corporal, estatura, percentual da gordura (bioimpedância), densidade de urina (escala Amstron e refratômetro) antes e após uma sessão de treino. Houve controle da temperatura e umidade relativa do ar. A pesquisa tem parecer de número 545.550 obedecendo a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A apresentação dos resultados é através de média e desvio padrão. A temperatura ambiente era de $24,25 \pm (0,95) ^\circ\text{C}$ e umidade $62,25 \pm (2,22) \%$. Os resultados apontam que os praticantes já iniciaram a atividade desidratados e evoluíram para desidratação grave (1028) ao final do treino. Através da análise de coloração (Amstrong) houve redução ($p \leq 0,005$) do nível de hidratação após o treino $5,389 (\pm 1,65)$ no sexo masculino. Concluindo que é importante a conscientização dos profissionais e praticantes de musculação sobre os cuidados com a hidratação, seguindo as recomendações.

NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A ORTODONTIA DE ALUNOS DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA

BRAÇALE, Olivia Moreira Duarte*; SILVA, Mabile Francine Ferreira

Curso: Fonoaudiologia

Email: oliviabracalee@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O interesse em desenvolver esta temática surgiu através da necessidade de mapear os conhecimentos atuais dos alunos de um determinado período do curso de fonoaudiologia em relação à atuação da equipe multidisciplinar: fonoaudiologia e ortodontia. **OBJETIVO:** Analisar se os estudantes de graduação de fonoaudiologia apresentam um nível de conhecimento acerca da ortodontia e sabem sobre a importância do trabalho multidisciplinar entre dentista e fonoaudiólogo. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo observacional descritivo transversal, quanti-qualitativo, que será realizado com alunos de graduação do curso de fonoaudiologia da UNICEUMA. Estima-se que participarão deste estudo 46 estudantes do curso de graduação em fonoaudiologia. Como critérios de seleção dos participantes do estudo, serão considerados apenas alunos do curso de fonoaudiologia que tenham concluído a disciplina de Ortodontia. O trabalho irá proceder com a aplicação de um questionário adaptado, contendo 8 questões voltadas para a coleta do nível de conhecimento do estudante de fonoaudiologia. Após

a coleta de dados, os resultados serão submetidos a uma análise estatística simples. A coleta de dados iniciará no segundo semestre de 2016. RESULTADOS ESPERADOS: Para a fonoaudiologia, o acompanhamento dos estudos nas áreas que envolvem a ortodontia é de extrema importância, pois interfere no trabalho multidisciplinar e a evolução do paciente vai ser significativamente positiva.

O RECOBRIMENTO DE FIOS ORTODONTICOS ESTÉTICOS INTERFERE NA PROPRIEDADE MECÂNICA DE DEFLEXÃO?

PESSOA, Thalita Fonseca; BRAMANTE, Fausto Silva; GURGEL, Júlio de Araújo; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; LIMA, Kleist Christian Costa ; PINZAN-VERCELINO, Célia Regina Maio;

Curso: Odontologia

Email: thalita_fpessoa@hotmail.com

Resumo: Uma das principais propriedades a serem consideradas na seleção dos fios ortodônticos é a flexibilidade, portanto, os ortodontistas devem estar atentos aos estudos que a investigam. Há escassez de estudos na literatura que avaliem as propriedades mecânicas do fio recoberto por ródio. Portanto, o propósito do presente estudo foi o de avaliar a deflexão dos fios de níquel titânio (NiTi) revestidos por ródio, comparando-o ao fio de NiTi revestido por resina epóxi, ao fio de NiTi convencional e ao termoativado. Quarenta e quatro segmentos de fios de calibre 0.018" foram divididos igualmente em 4 grupos: GR- fio de NiTi termoativado recoberto por ródio, GE- fio de NiTi recoberto por resina epóxi, GC- fio de NiTi convencional e GT- fio NiTi termoativado. Os fios foram avaliados quanto a propriedade carga x deflexão, em uma máquina universal de ensaios, de acordo com o teste de qualidade preconizado pela norma ISO15841. Os grupos foram comparados aplicando-se o teste ANOVA, seguido pelo post-hoc de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5%. Em relação à constância das forças, em todos os grupos a força liberada foi maior na deflexão de 3mm, diminuindo nas demais deformidades. Foram avaliados nas deflexões de 0,5mm, 1mm, 2mm e 3mm. Nas deflexões de 0,5 e 1mm, os fios de resina epóxi, termoativados e ródio apresentaram constância de força.

ODONTOLOGIA NO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE EVENTOS ASSOCIADOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA

ALMEIDA, Virna Vitória Diniz*; LEITE, Danielly de Fátima Castro; CORRÊA, Natália de Castro; CORRÊA, Rita da Graça Carvalhal Frazão; MOTTA, Vanise Barros Rodrigues; SOUZA, Luana Carneiro Diniz; LOPES, Fernanda Ferreira;

Curso: Odontologia

Email: virna_vitoria@hotmail.com

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma das infecções hospitalares mais prevalentes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Medidas que diminuem os riscos de infecções respiratórias devem ser implantadas, como os Bundles, que têm demonstrado bastante eficácia na redução dos índices de eventos associados à ventilação mecânica (EAVM). Este estudo tem como objetivo relatar a importância da inclusão da Odontologia no Bundle de EAVM, através da avaliação da qualidade da higiene bucal realizada nos pacientes da UTI Geral do Hospital Universitário Presidente Dutra (HUUFMA). Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUUFMA pelo nº 862.911. O bundle inclui higiene bucal, posicionamento da cabeceira do leito, pressão do cuff, interrupção da sedação, profilaxia de úlcera gástrica e de trombose venosa profunda. Para avaliar a condição da higiene bucal foram adotados dois critérios: presença de biofilme nos dentes de acordo com o Índice de Placa Modificado e presença de biofilme na língua (saborra lingual). Foi realizada uma análise descritiva qualitativa e quantitativa. Ao final do primeiro mês da aplicação do bundle pode-se observar que apenas 37% dos pacientes apresentavam higiene bucal satisfatória. Para melhorar a adesão da equipe de enfermagem ao bundle, foi realizado um treinamento prático visando aperfeiçoar a realização da higiene bucal aos pacientes, o que refletiu significativamente nos resultados do segundo mês: 60,24% de higiene bucal satisfatória. A inserção da Odontologia no bundle é imprescindível para diminuir a colonização pulmonar por patógenos bucais e/ou respiratórios e conseqüentemente, a incidência de EAVM.

PARÂMETROS VOCAIS AUDITIVOS E ACÚSTICOS DA VOZ PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CANTORES AMADORES EVANGÉLICOS

SANTOS, Leidiane Lisboa dos*; FERRAZ, Pablo Rodrigo Rocha.

Email: lidy.lis18@gmail.com

A análise perceptivo-auditiva e a análise acústica são fundamentais para caracterizar o perfil vocal do sujeito, ajudando desta forma o fonoaudiólogo a estabelecer uma proposta terapêutica adequada e individualizada. Os cantores amadores normalmente não possuem preparação específica para o canto, o que acaba gerando queixas referentes à saúde vocal. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de um programa de aperfeiçoamento vocal (PAV) em grupo com cantores amadores evangélicos de uma igreja de São Luís – MA. Trata-se de um estudo transversal e analítico-descritivo, com aprovação do CEP da Universidade Ceuma sob número 1.674.330. A mostra foi aleatória simples, composta por cantores amadores evangélicos, de ambos os gêneros, na faixa etária de 18 a 35 anos, no qual foram submetidos à avaliação vocal pré-PAV na primeira etapa, a aplicação do PAV na segunda etapa, e na terceira etapa reavaliação vocal pós-PAV. Os dados estão sendo tabulados com o software Excel para o

cálculo e análise da estatística descritiva univariada (porcentagem, médias e valores absolutos). Como resultados espera-se que os cantores amadores evangélicos sofram modificação vocal após o PAV, evidenciando que a intervenção fonoaudiológica é fundamental para garantir saúde e longevidade vocal no desempenho da função do canto.

PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE IDOSOS PRATICANTES DA MUSCULAÇÃO DO UNICEUMA SEM FRONTEIRAS

FERREIRA, Elba Rejane Maciel*; SILVA, Michelle; SOARES, Maísa Carvalho Rezende; GAMBASSI, Bruno Bavaresco

Curso: Educação Física

Email: rezende03@hotmail.com

O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil antropométrico dos idosos praticantes de musculação do projeto de extensão Uniceuma sem Fronteiras. O envelhecimento é um fenômeno complexo, biológico que compreende alterações moleculares, celulares, fisiológicas e psicológicas. A atividade física exerce um papel fundamental no processo de envelhecimento saudável. Para a realização deste estudo foram avaliados 16 idosos praticantes de musculação com média de idade 67,9 anos ($\pm 4,6$), foi realizada avaliação física com dados de massa corporal (MC), estatura, dobras cutâneas, IMC e circunferência abdominal (CA) e anamnese. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 813.886. Os resultados são apresentados em média, desvio padrão e frequência e percentual. De acordo com o IMC, 47,7% dos idosos tem peso normal, 31% está na faixa de sobrepeso, a CA e %G 89,6 ($\pm 16,5$) cm, 90,4 ($\pm 8,7$), %G 22,6($\pm 9,7$)% e 42,3($\pm 5,4$) % no sexo masculino e feminino respectivamente. Observou-se que em relação a associação de patologias 43,7% da amostra apresenta duas patologias e 31,25% apresenta três ou mais patologias. Conclui-se que a prática de exercício físico isoladamente sem alimentação adequada pode não ser suficiente para resolver problemas associados os efeitos do envelhecimento e ganho de peso durante esta fase da vida.

PERFIL DE USUÁRIOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO LUÍS

FRANCO, Rauanna Ketlin Silva*; CORRÊA, Valéria Cristina Dos Anjos; FONSECA, Thailson Márcio Pinheiro; PIMENTEL, Ysla Vieira; NASCIMENTO, Ana Lourdes Avelar; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; GONÇALVES, Maria Claudia

Curso: Fisioterapia

Email: rauannaf@gmail.com

O conhecimento das características da população que frequenta um serviço de atenção básica constitui uma importante ferramenta de planejamento de ações em saúde. Esta pesquisa

objetivou descrever o perfil sócio demográfico e clínico dos usuários da Unidade da Família Pirapora. Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e transversal, na sede da Unidade de Saúde da Família Pirapora na cidade de São Luís – MA, com 50 usuários que estavam em atendimento por demanda espontânea nesta Unidade, de ambos os gêneros, com idade superior a 18 anos. Os dados foram obtidos através de uma ficha de avaliação com dados sociodemográficos e clínico. Para análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, através de frequências absolutas e relativas. Este estudo seguiu os preceitos da Resolução 466/2012, de pesquisas relacionadas à seres humanos e foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa pelo parecer número 516.267. A amostra foi composta em sua maioria por usuários do gênero feminino (66,7%), que possuíam ensino médio completo (30%). Apresentaram mediana de idade de 36 (19-60) anos. As condições clínicas mais auto relatadas pela amostra estudada foram hipertensão (23,3%), insônia (21,7%), fratura (21,7%), osteoporose (11,7%) e Diabetes Mellitus (10%). Neste sentido, percebe-se a diversidade de condições clínicas destes usuários, algumas relacionadas a atenção primária, outras a atenção secundária ou terciária, mas que exige acompanhamento pelos profissionais da atenção básica para evitar complicações.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES ONCOLOGICOS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE REFERENCIA NO ESTADO DO MARANHÃO

ALVES, Rafaella Gonçalves Fahd*; SOUZA, Bruna Aparecida Costa; ANCELES, Thiago Henrique Caldas; DUARTE, Thiago Henrique Caldas; LIMA, Marcus Vinícius Viegas; MADEIRA, Hellyne Gisele Reis

Curso: Fisioterapia

Email: rafaellafahd@gmail.com

Apresentar o perfil epidemiológico de pacientes com câncer, pertencentes à base de dados do RHC de um Centro de Oncologia do município de São Luís – MA e relatar a importância de tal base de dados para gestão de serviço de saúde nesse tipo de centro. Estudo retrospectivo, realizado com levantamento de 2.143 prontuários, entre os meses de janeiro a julho de 2015. As variáveis utilizadas no estudo foram idade, gênero, procedência, estadiamento da doença ao diagnóstico e tipo de tratamento. Para a coleta de dados, utilizou-se o software SisRHC e, na análise descritiva, utilizou-se o software Excel® para às variáveis quantitativas. Do total de 2.143 prontuários analisados, 50,3% eram do gênero feminino, 55% eram da cor parda, 92% eram oriundos do estado do Maranhão, onde 47% eram procedentes da capital, o tipo de câncer mais prevalente no sexo feminino foi o de mama (25,83%), enquanto o mais prevalente no sexo masculino foi o de próstata (39,22%). O estadiamento IV foi prevalente, representando 11% da amostra com idade inferior a 19 anos, bem como 21% da amostra com idade superior a 19 anos.

O tratamento mais empregado foi a quimioterapia (22,8% dos casos). A base de dados do Registro Hospitalar de Câncer tem papel relevante por ser capaz de gerar um conjunto de importantes informações relacionadas ao câncer e que, por meio dessas informações, é possível realizar estudos epidemiológicos que permitam gerar ações de melhoria gerencial e assistencial a essa população.

PERCEPÇÕES DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS SOBRE OS RISCOS A SAÚDE NO TRABALHO

NEVES, Keyla Suellen Rocha*; DA SILVA, Mae Soares

Curso: Psicologia

Email: neveskeyla@hotmail.com

O porto é considerado um ambiente perigoso e insalubre por movimentar as mais variadas cargas e conseqüentemente expor a saúde dos Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) a constante risco, portanto este foi o ponto de partida da elaboração deste artigo, que teve como objeto de estudo a percepção dos TPAs sobre os riscos à saúde no trabalho. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo sido utilizada a técnica de entrevista semiestruturada e dois instrumentos de coleta de dados: um questionário, para caracterização do perfil sócio demográfico dos entrevistados e um roteiro de entrevista semiestruturada. Foram entrevistados seis TPAs que trabalham no Porto do Itaqui no Município de São Luís, Maranhão, durante todo o mês de março de 2016. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma sob parecer de N°1.471.822, respeitando os princípios da bioética previstos na Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS). Os dados coletados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática, e agrupada em dois temas: “O risco que preocupa é o que fere e mata” e “A lógica concreta e fiscalizadora das normas e procedimentos de segurança”. Nesse contexto, defende-se a necessidade da realização de ações com trabalhadores, em consenso com a atividade desenvolvida, para criação de procedimentos, que verdadeiramente minimizem a exposição de TPAs aos riscos ocupacionais e assim diminuir as doenças e os acidentes que podem ocorrer neste ambiente.

PLATHYMENIA RETICULATA BENTH: BIOPROSPECÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO CONTRA CORYNEBACTERIUM JEIKEIUM.

COUTINHO, Gabrielle Guedes*; FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo; DUTRA, Rodrigo Bênetton da Conceição; GUARALDI, Ana Luíza de Mattos; SABBADINI, Priscila Soares;

Curso: Biomedicina

Email: gabriellegc38@gmail.com

Candeia é uma árvore que ocorre no sul do Brasil. Suas folhas são utilizadas na medicina popular no preparo de chá e xarope para o tratamento de dor de garganta, gripe, tosse e outras doenças respiratórias e intestinais. *Corynebacterium jeikeium* é encontrado na microbiota da pele humana e considerado um patógeno oportunista, podendo causar infecção de ferida cirúrgica e prótese, sepse, pneumonia, endocardite, peritonite e meningite. Como *C. jeikeium* apresenta resistência natural a vários antibióticos, o presente trabalho objetivou avaliar a susceptibilidade da espécie a Candeia. O extrato bruto hidroalcoólico (EBH, 72 mg/ml) foi obtido a partir das folhas secas após maceração com etanol 70% e foi utilizado nos testes de avaliação das concentrações inibitória mínima (CIM) e bactericida mínima (CBM). Três amostras nasais de *C. jeikeium*, padronizadas na concentração correspondente a 0,5 de McFarland, foram incubadas por 48h/37°C com EBH diluído seriadamente em microplacas. Após a determinação da CIM mediante leitura visual, avaliou-se a CBM, a partir dos poços que não apresentaram crescimento bacteriano visível, semeando-se uma alíquota em placas de Petri contendo Agar Mueller Hinton, que foram incubadas por 48h/37°C. O EBH da Candeia apresentou CIM contra as amostras NA30493; NA30413; NA293272 nas concentrações de 72 mg/ml, 36 mg/ml e 18 mg/ml, respectivamente. Não foi possível determinar a CBM já que foi maior que a concentração disponível do extrato (72 mg/ml). Destaca-se que alguns autores relatam que só o extrato da casca do tronco tem atividade antimicrobiana, entretanto, o presente estudo demonstra esta atividade a partir das folhas.

PNEUMONIA NOSOCOMIAL OCORRIDOS EM UMA UTI DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO LUÍS/MA.

MOREIRA, Lorena Maria Queiroz; RODRIGUES, Cianna Nunes

Curso: Enfermagem

Email: lorenamariaqm@yahoo.com.br

Resumo: A Pneumonia é a infecção hospitalar que mais acomete pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), podendo ser de origem comunitária ou nosocomial. Objetivou-se com o estudo descrever os casos de Pneumonia nosocomiais ocorridas em uma UTI de um hospital público situado no município de São Luís/MA. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e com abordagem quantitativa de dados, realizado em um hospital da rede pública de São Luís/MA. A coleta dos dados foi realizada nos meses de março e abril de 2016, sendo retirados de um Banco de Dados EPIMED. A população foi constituída por 1048 pacientes que foram internados na referida UTI no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Desses pacientes, 50,38% eram do sexo feminino, 37,11% tinham mais de 65 anos, 43%

tiveram como motivo para internação, cirurgias eletivas; 48,5% eram oriundos do Centro Cirúrgico; a duração média das internações foi de 7,41 dias e 31,25% evoluíram ao óbito. No que se refere aos eventos infecciosos ocorridos, de 115 pacientes que apresentaram infecções respiratórias, 24,34% apresentaram Pneumonia nosocomial. O resultado encontrado reforça a necessidade de reavaliação nos protocolos assistenciais e educação continuada para os profissionais de saúde que atuam na terapia intensiva. Descritores: Casos. Pneumonia. Nosocomial. UTI.

PREVALÊNCIA DE MORDIDA CRUZADA E FATORES ASSOCIADOS EM CRIANÇAS ENTRE 7 E 10 ANOS

ROCHA JÚNIOR, Francisco José Rodrigues da*; ALVES, Eliezer Gomes; BECKMAN, Juliana; FERREIRA, Meire Coelho;

Curso: Odontologia

Email: junior.rodrigues.93@hotmail.com

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de mordida cruzada posterior e anterior, e fatores associados, em crianças entre 7 e 10 anos de idade. A amostra foi composta por 239 crianças, provenientes de uma escola pública e uma privada de São Luís (MA). Os critérios de inclusão foram crianças que cooperassem durante o exame clínico e que estivessem no ambiente escolar no dia da pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados foram um questionário e exame clínico. Um examinador calibrado avaliou mordida cruzada anterior e posterior, simetria facial e respiração bucal. Estatística descritiva e teste qui-quadrado foram realizados ao nível de significância de 5%. Três por cento da amostra apresentava mordida cruzada, sendo que a mordida cruzada anterior e posterior foi mais prevalente no gênero masculino (85,7% e 71,4%, respectivamente). Para a amostra estudada, fatores demográficos, fatores clínicos (simetria facial e perfil facial) e hábitos (ranger dentes, roer unhas, morder objetos, bochechas e lábios) não foram associados com mordida cruzada anterior e posterior. De acordo os resultados é possível concluir para a amostra estudada que os fatores investigados não foram determinantes da mordida cruzada. Porém, é importante que o cirurgião dentista faça um diagnóstico clínico preciso, de forma que possa detectar fatores implicados na mordida cruzada e, assim, estabelecer precocemente o tratamento mais adequado. Número do parecer consubstanciado do CEP: 978.551

PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL EM IDOSOS

LIMA, Uiana Fábila da Cruz*; CALDAS, Érica Alessandra; ROLHANO, Alessandra de Souza; AMORIM, Camila Malcher Teixeira.

Curso: Fonoaudiologia

Email: limai_fabia@hotmail.com

O presente projeto de pesquisa reflete sobre a senescência e os aspectos que fazem parte deste processo de envelhecimento, em especial a audição, que é uma das alterações que afeta principalmente esta população. No estudo desenvolvido, analisou-se essa alteração subdividindo-a em três aspectos principais de atenção, memória e compreensão auditiva. Essa investigação constituiu um estudo de forma Transversal Quantitativa, com um grupo de 19 idosos, entre homens e mulheres, a partir de 60 anos de idade, com limiares auditivos normais para a faixa de frequência da fala. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Ceuma sob número 1.632.370. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola da Universidade Ceuma na cidade de São Luís do Maranhão, onde foi realizado um protocolo de anamnese, avaliação audiológica básica (VA e VO), questionário e avaliação do processamento auditivo central-PAC (fala no ruído - FR, identificação de sentenças com mensagens competitiva - PSI e de dissílabos alternados superpostos-SSW). Como resultado verificamos que 100% dos idosos apresentaram padrões de normalidade nos testes de FR e no PSI, enquanto no teste SSW 80% apresentou algum tipo de alteração. Sendo dentre esses, 50% apresentaram alterações pela condição Direita Competitiva (DC) e 30% alterações pela condição Esquerda Competitiva (EC). Conclui-se que dentre os testes analisados nos pacientes com limiares normais, a maioria dos indivíduos apresentou padrão de normalidade nos testes de FR e no teste PSI, entretanto no teste SSW, a maioria dos idosos apresentou algum grau de alteração do processamento auditivo central.

REDUÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS TUMORAIS CAUSADA POR BISFOSFONATO
FONTES, Valéria Costa*; BRANCO, Simeone Júlio dos Santos Castelo; GALVÃO, Livia Câmara de Carvalho; RUIZ, Ana Lucia Tasca Gois; ZAGO, Patrícia Maria Wiziack; NETO, Lídio Gonçalves Lima.

Curso: Biomedicina

Email: valeria.cfontes@gmail.com

Bisfosfonatos são fármacos utilizados para o tratamento de enfermidades ósseas, como a osteoporose e algumas metástases ósseas de cânceres, devido ao seu mecanismo de ação que consiste na diminuição do processo de reabsorção óssea. Estudos demonstraram que bisfosfonatos como o ácido zoledrônico (ZA) também promoveram a diminuição da proliferação de diferentes tipos de células cancerígenas e, assim, apresentaram potencial terapêutico para o tratamento de tumores. A partir do exposto, este estudo in vitro objetivou avaliar a atividade antiproliferativa do ZA em diferentes linhagens de células tumorais. Nove linhagens (U251; MCF7; NCI/ADR-RES; 786-0; NCI-H460; PC-3; OVCAR-3; HT29; K-562 e HaCaT, controle; meio

RPMI 1640/10%SFB, incubação a 37°C /5% CO₂) foram submetidas ao tratamento com as concentrações de 0,12; 1,2; 12 e 120 µM de ZA. Após 48 h, as células foram fixadas com ácido tricloroacético, coradas com sulforrodamina B e submetidas a leitura em leitor de placas a 540 nm. Verificou-se que as concentrações de 12 µM e 120 µM de ZA foram eficazes para a redução em 50% e em 100%, respectivamente, da proliferação das células 786-0 (carcinoma renal). A maior concentração de ZA (120 µM) promoveu efeito citostático (redução da proliferação celular em 50%) para as células HaCaT (queratinócito humano não tumoral), HT-29 (carcinoma de cólon) e NCI-H460 (carcinoma pulmonar). Esses resultados sugerem um promissor efeito auxiliar para o tratamento de tumores renais, de cólon e pulmonares do bisfosfonato ácido zoledrônico; no entanto, mais estudos in vitro e in vivo são necessários para a validação dos dados apresentados.

RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E O HISTÓRICO DE QUEDAS EM IDOSOS

BELFORT, Iara Araujo*; LOPES, Lídia Maria da Silva; SILVA, Michelle Costa; DE MATOS, Pamella Mayara Ferreira; DA SILVA, Teresa Raquel Ferreira; SOARES, Karla Virginia Bezerra de Castro; DE SOUSA, Rosângela Maria Lopes

CURSO: NUTRIÇÃO

Email: iaritaaraujo13@gmail.com

Objetivo: reconhecer o aspecto da composição corporal de idosos caídores e não caídores através do índice de massa corpórea avaliando sua associação ao risco de quedas. Pesquisa aprovada pelo parecer de número 541.619. Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade CEUMA. Amostra constituída por 59 idosos, 02 homens e 57 mulheres, aposentados e participantes do projeto Uniceuma Sem Fronteiras da universidade Ceuma em São Luis-Ma. Os dados coletados por meio do questionário validado a Mini Avaliação Nutricional MAN que verifica o estado nutricional e o histórico de quedas. O resultado da pesquisa identificou que 54.2% apresentavam-se Eutróficas, 25.4% sobrepeso, 11.9% obesidade, 8.5% desnutrição leve. O histórico de quedas identificou que dos 59 idosos 25.4% caíram e desses 13.5% eram Eutróficas, 10.2% sobrepeso, 1.7% obesos, 0% desnutrição leve. As não caiadoras eram 74.6% destas 40.7% eram Eutróficas, 15.2% sobrepeso, obesas 10.2%, 8.5% desnutrição leve. Concluiu-se que quanto mais satisfatório o estado nutricional menor e o índice de queda nessa população. o aumento do peso corporal causa uma desorganização no equilíbrio e prejuízo na estabilidade. A participação de idosos em programas de atividades físicas os leva a um estado nutricional satisfatório proporcionando uma estrutura física mais resistente a quedas. Palavra chave: Idoso. Queda. Estado Nutricional.

RELAÇÃO CINTURA ESTATURA COMO INDICADOR DE RISCO CORONARIANO EM DISCENTES DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR

SANTOS, Rayane Bruna Pereira*; FLEXA, Daniela Alves; SAUAIA, Bismarck Ascar; GAMBASSI, Bruno Bavaresco; QUEIROGA NETO, Adolfo Pereira; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado

Curso: Educação Física

Email: raynebrunaps@hotmail.com

A RCE (Relação Cintura/Estatura) é um indicador antropométrico muito utilizado nos dias atuais, que tem como pressuposto teórico que para determinada estatura há um grau aceitável de gordura armazenada na porção do tronco. O presente estudo teve como objetivo comparar a relação cintura/estatura com outros indicadores antropométricos como preditores de doenças cardiovasculares em discentes de Educação Física de uma universidade particular de São Luís. Participaram do estudo 151 universitários regularmente matriculados no curso de Educação Física Bacharelado, sendo 101 homens e 50 mulheres, essa pesquisa tem o parecer consubstanciado do CEP, número: 293 235. Avaliou-se Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura/Estatura (RCE), Relação Cintura/Quadril (RCQ), e Circunferência da Cintura (CC). Ao investigarmos os parâmetros antropométricos e sua associação com risco cardíaco encontramos uma baixa correlação entre as variáveis estudadas, apenas 0,04% do risco cardíaco sofre influência das medidas de estatura; 1,3% das medidas da cintura; 9,85% das medidas da relação cintura/estatura; 0,01% das medidas do quadril; 5,14% das medidas da relação cintura/quadril e 0,51% das medidas de IMC na amostra estudada. Conclui-se portanto, que os parâmetros antropométricos na população estudada não repercutem em fatores de risco cardíaco ainda que relação cintura/estatura tivesse melhor percentuais de correlação porém não representativa. Palavras-chave: Antropometria. Risco coronariano. Obesidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: SONDAGEM NASOENTERAL

LIMA, Vanderson Antonio Moreno*; SERRA, Wandenice Virgulino; Silva, Ana Lidia Mesquita; PRAZERES, Victtoria Goretth; PIMENTEL, Mara Izabel Carneiro; MARINHO, Mavi Lima.

Email: wandersonantonio@hotmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

O presente estudo é um relato de experiência sobre a participação de Acadêmicos de Enfermagem na clínica médica em um hospital de referência na cidade de São Luís - MA. A sondagem nasoenteral é a introdução através da cavidade nasal/oral de uma sonda de poliuretano posicionada no estômago, duodeno ou jejuno, com o objetivo de disponibilizar uma via de acesso para nutrição para os pacientes incapazes de garantir a ingestão calórica protéica adequada e para administração de medicamentos. A atuação do enfermeiro junto à clínica

médica deve estar centrada no “cuidar” tendo como base conhecimento, sensibilidade e no retorno da capacidade funcional para realização das suas atividades. Para realização da sondagem nasoenteral deve-se verificar o prontuário do paciente, com indicação e prescrição médica. Os profissionais habilitados para execução do procedimento é o enfermeiro. Foi observado que o procedimento possui alguns pontos que devemos analisar e checar antes de submeter o paciente à sondagem nasoenteral. A higiene nasal e oral deve ser rigorosa em pacientes com sonda enteral. O controle radiológico para visualizar localização da ponta da sonda é obrigatório e deve ser realizado antes da administração da dieta ou medicação. O benefício deste procedimento é promover a melhoria do estado nutricional e consequentemente da qualidade de vida do cliente. A técnica de sondagem nasoenteral compreende desde a prescrição médica, englobando a preparação do material a ser usada, orientação ao paciente até o momento da execução do procedimento e a confirmação da localização da sonda através de imagens radiográficas.

REMOÇÃO QUÍMICA-MECÂNICA DA CARIE IN VIVO: REVISÃO CRÍTICA DE LITERATURA

SAMPAIO, Glenda Gomes Guimarães*; SANTOS, Marcela de Jesus Castro; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini.

Curso: Odontologia

Email: glendasampaio@hotmail.com

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia clínica da remoção químico-mecânica por meio de análise crítica de artigos de cunho in vivo. Buscando amenizar inconvenientes durante o tratamento da cárie dentária ao paciente infantil, como sintomas de ansiedade e medo, e, em certos casos, até desconforto, foram desenvolvidas técnicas minimamente invasivas utilizando soluções químicas e curetas para a remoção de tecido cariado afim de auxiliar nesse procedimento, tão comum na prática clínica odontopediátrica. Foi realizada busca em banco de dados Medline/PubMed utilizando o descritor remoção químico-mecânica da cárie dentária. Como filtros de busca foram utilizados artigos em inglês, trabalhos com aplicação em humanos, com abstract e publicados nos últimos cinco anos. A busca resultou em 124 artigos, sendo desses, 117 em inglês, 95 em humanos (relatos de casos clínicos e estudos clínicos) e 45 publicados nos últimos cinco anos. Dos artigos analisados, apenas 9 trabalhos foram incluídos após criteriosa análise. Os métodos de remoção químico-mecânicos são eficazes e podem ser considerados como alternativas viáveis para a remoção de tecido cariado sem comprometimento pulpar.

SENTIDOS ATRIBUÍDOS POR TRABALHADORES RURAIS À VIDA PÓS-OSTOMIA POR CÂNCER

SIQUEIRA, Morganna Ferreira de; MELLO, Sylvia Nathália Silva Cunha; MENDES, Rafaela Soares; SILVA, Mae Soares da

Curso: Psicologia

Email: morgannasiqueira@hotmail.com

Resumo: O tratamento do câncer colorretal inclui a extração do trauma no tubo digestivo e a exteriorização de uma pequena parte do intestino (estomia). O Maranhão é um estado brasileiro que possui um número significativo de pessoas cujo sustento depende do trabalho rural. Partindo do pressuposto de que a colostomia pode provocar sérios impactos na vida de pessoas que dependem da força corporal para trabalhar, este estudo objetivou conhecer as percepções emocionais de trabalhadores rurais ostomizados por câncer. Foi realizada uma pesquisa descritiva e analítica de abordagem qualitativa, em outubro de 2013. A coleta de dados foi feita na Associação dos Ostomizados do Maranhão, situada no Município de São Luís, Maranhão. Participaram do estudo pacientes colostomizados por câncer, cuja ocupação declarada era a de trabalhador rural. A amostra seguiu o critério de saturação temática. Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada e questionário estruturado. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética da Universidade Ceuma, respeitando a resolução do CNS nº 466/12 e suas complementares. Os dados foram analisados segundo a análise de conteúdo, modalidade temática, de onde emergiram dois temas: sentimentos decorrentes das mudanças causadas pela colostomia; o uso da força e o trabalho pesado, de onde decorreram os sentimentos de tristeza, dor, nojo, vergonha, medo e conformismo. Defende-se que a assistência psicológica voltada para esse público deve incluir o desenvolvimento de estratégias intersetoriais que promovam a reinserção em atividades laborais, respeitando os limites impostos pela cirurgia com efeitos positivos na reabilitação psicossocial.

VALIDAÇÃO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS EM EMBALAGENS PARA USUÁRIOS

LIMA, Jaqueline de Araújo*; CORREIA, Tharciano Mota; PAIVA, Milena Raianny Oliveira; TOLEDO, Carlos Augusto; FERREIRA, Luís Fernando Ramos; SALOMAO, Rondineli Seba; JUNIOR, Luciano Mamede De Freitas

Email: jaqueline.alima@outlook.com

Área/Especialidade: Farmácia

O objetivo do trabalho foi validar o transporte de medicamentos que estão sujeitos a controle de temperatura no trajeto drogaria x residência. Avaliou-se também uma forma de

padronização nas orientações que devem ser dadas pelo profissional farmacêutico na dispensação dos termolábeis. Para o transporte de substâncias termo sensíveis, existem regras que determinam desde a maneira de como e onde devem ser armazenados. Sabendo-se que a cadeia do frio exigida, está entre 2°C e 8°C (farmacopeia brasileira), foi observado que não existe padronização e nem tão pouco orientação regulamentada para que estes usuários possam transportar de forma segura estes medicamentos. Foi utilizado uma embalagem tipo caixa térmica de isopor de dimensão interna 195x105x140mm, externa 232x145x185mm e capacidade três litros aonde se analisou as duas maneiras mais usadas pelos usuários na dispensação destes produtos. Dentro da caixa corretamente vedada para minimizar perdas foi colocado um data logger da marca Tomkey devidamente calibrado, com uma, duas ou três unidades do gelo seco em gel e um termômetro padrão para ambientes para coletar as temperaturas externas. Obtivemos resultados alarmantes, com temperaturas totalmente fora dos padrões quando essa embalagem foi exposta a condições extremas, retratando algumas situações rotineiras. Não observamos conformidades com o que a RDC 17/2010 determina. Palavras-chave: estabilidade; controle de qualidade; temperatura;

PAINEL PESQUISA - PÓS GRADUAÇÃO

ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE: COMPORTAMENTOS DE RISCO

PEREIRA, Tamirys de Souza*; OLIVEIRA, Christhianny Valente.

Email: tamirys.pereira@hotmail.com.br

Pensar sobre sexualidade na adolescência exige um olhar sobre os diversos sentidos que as descobertas e as mudanças, nessa etapa da vida, exercem sobre os gêneros devendo-se considerar o tempo e o lugar em que ocorrem, pois é nesses aspectos que a cultura da sociedade se impõe e passa a determinar práticas sociais e estilos de vida distintos. Na adolescência, são estabelecidos padrões básicos de comportamentos que se perpetuam ao longo da vida, entre os quais aqueles pertencentes ao campo da sexualidade e que é neste momento que se iniciam as grandes transformações biopsicossociais no qual costuma ocorrer à iniciação sexual, muitas vezes sem a orientação prévia de um adulto responsável, que possibilitaria ao adolescente fazer escolhas conscientes, considerando desejo, prazer e risco. Muitos são os questionamentos que surgem acerca dos comportamentos de risco que atuam no cenário do adolescente frente a uma realidade sexualmente ativa. A prevenção deve ser principal característica deste cenário de forma adequada, orientada e consciente. Portanto faz-se necessário a compreensão da motivação desse adolescente que compreende os riscos como distorção de percepção, ou seja,

o que é relevante naquele momento e o que vêm a ser perigo dentro de sua perspectiva. Revela-se a importância de maior atenção para diversos aspectos da vida dos jovens, onde este possa ser e se sentir compreendido como pessoa no mundo que tem possibilidades de tomar decisões por si de forma mais consciente.

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIBACTERIANA DE *Azadirachta indica* A. JUSS CONTRA AMOSTRAS DE *CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE*

FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo*; COUTINHO, Gabrielle Guedes; DA SILVA, Vanessa Conceição; SABBADINI, Priscila Soares; GUARALDI, Ana Luíza de Mattos;

Curso: Biomedicina

Email: well_firmo@hotmail.com

Azadirachta indica (nim) é usada na medicina popular no tratamento de doenças humanas, especialmente bacterianas. *Corynebacterium diphtheriae* é um patógeno emergente e causa a difteria, que acomete primariamente o trato respiratório. O objetivo do trabalho foi determinar a atividade antioxidante e antibacteriana de *A. indica* sobre amostras de *C. diphtheriae*. O extrato bruto hidroalcoólico (EBH/42mg/mL) foi obtido das folhas secas após maceração com etanol 70%, na proporção de 1:10. Foram determinadas as concentrações de flavonoides (reação com cloreto de alumínio), polifenóis totais (reagente Folin-Ciocalteu), avaliada a atividade antioxidante (método 2,2-difenil-1-picril-hidrazila-DPPH) e antibacteriana [técnica de difusão em ágar e por microdiluição para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM)] contra 6 isolados clínicos de *C. diphtheriae* e 2 amostras padrão. O EBH teve 2,568%±0,078 e 7,545%±0,359 de flavonoides e polifenóis totais, respectivamente. Apresentou uma concentração eficiente (CE50) de 78,93µg/mL para atividade antioxidante. O EBH inibiu o crescimento bacteriano de 4 amostras. O maior halo de inibição foi 1,9cm, a melhor CIM foi 2,62mg/mL (com CBM >42mg/mL) e CBM 21mg/mL (com CIM 5,25mg/mL). A baixa ação antioxidante do EBH é devido a pouca presença dos flavonoides e polifenóis totais, contudo, a presença mínima desses compostos influenciou a ação antibacteriana.

AValiação DA SENSIBILIDADE APÓS CLAREAMENTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES

RIBEIRO, Izabella Santos*; LIMA, Suellen Nogueira Linares; DINIZ, Ana Carolina Soares; CARVALHAL, Stéphanie Tavares; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus; BANDECA, Matheus Coelho;

Curso: Odontologia

Email: izabellaribeiro@gmail.com

A valorização da estética tem feito com que cada vez mais pessoas procurem os tratamentos odontológicos em busca de um sorriso belo. Dentre as principais queixas dos pacientes o escurecimento dental é o mais comumente relatado pelos pacientes. O clareamento dental é um tratamento bastante utilizado nessas situações pois garante bons resultados aos pacientes, contudo esse tipo de tratamento apresenta como efeito colateral a sensibilidade pós-operatória, motivo pelo qual muitos pacientes abandonam o tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade pós-operatória de dois agentes clareadores a base de peróxido de hidrogênio em concentrações diferentes. Foram selecionados 22 pacientes estivessem inclusos nos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Foram utilizados dois materiais, Lase Peroxide Lite- 15% (DMC) e o Lase Peroxide Sensy- 35% (DMC) e a técnica da boca dividida. Após cada sessão os pacientes avaliaram a sensibilidade causada pelo procedimento clareador utilizando duas escalas, VAS e NRS. 100% dos pacientes relataram nenhuma sensibilidade pós-operatória imediatamente após a sessão de clareamento do lado clareado com o Lase Peroxide Lite- 15%, e após uma hora 25% relatou sensibilidade leve. 30% dos pacientes relataram ausência sensibilidade imediatamente após o tratamento com Lase Peroxide Sensy- 35%, 30% relatou sensibilidade leve, e 30% relatou sensibilidade moderada. Apenas 10% relatou sensibilidade severa 1 hora após o tratamento com Lase Peroxide Sensy- 35%. O tratamento com o Lase Peroxide Sensy- 35% causou maior sensibilidade que o Lase Peroxide Lite- 15%. Comitê de ética: 1.307.220

AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTAL DURANTE TRATAMENTO CLAREADOR DE DENTES VITAIS EXPOSTOS A DERIVADOS DE COLA

CARVALHAL, Stéphanie Tavares*; RIBEIRO, Izabella; RICARTE, Marina Salomão; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus; BANDECA, Mateus Coelho

Email: stephanyecarvalhal@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O tratamento clareador, por ser considerada uma técnica segura, eficaz e relativamente barata, apresentando resultados satisfatórios, tem se tornado uma boa alternativa para obtenção de dentes mais brancos. Entretanto, o mesmo tem sido associado com frequentes quadros de sensibilidade pós-operatórias comumente relatadas, fator que leva alguns pacientes a abandonarem o tratamento. O estudo clínico buscou avaliar a sensibilidade dental de pacientes submetidos ao tratamento clareador em diferentes momentos. Foram recrutados 22 pacientes que assinaram o TCLE e se enquadraram nos critérios de inclusão, com idades entre 18 e 35 anos, que foram divididos em 2 grupos com 11 participantes cada, controle e experimental. Todos os pacientes foram submetidos à profilaxia antes da primeira sessão de

clareamento. Os dentes e tecidos moles foram secos com ar e a gengiva foi protegida com barreira gengival foto-polimerizável. Todos pacientes receberam duas sessões de tratamento clareador com Peróxido de Hidrogênio 35% com luz. Foram realizadas as avaliações da sensibilidade com auxílio das escalas VAS e NRS. O grupo experimental apresentou maior grau de sensibilidade dental quando comparado ao grupo controle. PARECER CEP : 51092015.7.0000.5084

AValiação DO pH E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE DIFERENTES CIMENTOS ENDODÔNTICOS NA DENTINA RADICULAR

TRANDAFILOV, Alessandra Aparecida da Silva*; FREIRE, Laila Gonzáles*; GAVINI, Giulio*; CARVALHO, Ceci Nunes*;

Curso: Odontologia

Email: alessandratrandafilov@hotmail.com

O objetivo do trabalho foi avaliar, in vitro, o pH e a liberação dos íons cálcio, sódio, fosfato e silício dos cimentos endodônticos BC sealer e AH Plus. Vinte pré-molares inferiores foram preparados e tiveram seu forame apical padronizados. As superfícies radiculares externas foram impermeabilizadas. Os dentes foram aleatoriamente divididos nos grupos: AH Plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) (n=10) e BC Sealer (Brasseler USA, Savannah, GA, EUA) (n=10). Antes e após a inserção dos cimentos, os espécimes de cada grupo foram imersos em água deionizada e decorrido os tempos experimentais de 3, 24, 72, 168 e 240 horas, foram realocados em novos tubos contendo 10 mL de água deionizada. Foi utilizado um Espectrômetro Ótico de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente acoplado para análise quantitativa dos íons cálcio, sódio, fosfato e sílica, e aferido o pH das soluções. Observou-se que ambos os cimentos promoveram alcalinização dos meios, sendo que os espécimes preenchidos com o cimento BC Sealer apresentaram maiores valores de pH ($p > 0,05$). Após 240 horas, o cimento BC Sealer apresentou significativa maior liberação dos íons Na^+ e Si^{2+} do que o cimento AH Plus ($p < 0,05$). Em relação aos íons fósforo (PO_4^{3-}) e cálcio (Ca^{2+}), não foi observada diferença significativa na liberação entre os dois materiais analisados ($p > 0,05$). Palavras Chaves: Cimentos endodônticos, liberação iônica, dentina

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS E HISTOPATOLÓGICAS NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESÕES PERIAPICAIS

BORBA, Alberto Sabin Moura; PEREIRA, Sângela Maria da Silva; MARIZ, Débora Castelo Branco; MAIA, Cláudia de Castro Rizzi; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus; FILHO, Etevaldo Matos Maria; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini

Curso: Odontologia

Email: albertoborba@yahoo.com

Resumo : Recentes estudos têm empregado a Tomografia Computadorizada Cone Beam (TCCB) para aumentar a acurácia no diagnóstico de periodontite apical crônica (PAC) devido à confiabilidade das medidas utilizando este recurso, no entanto, até o momento nenhum estudo utilizou os parâmetros volume (V), tons de cinza (TC) e Unidade Hounsfield (UH) simultaneamente a fim de realizar o diagnóstico diferencial entre cistos e granulomas apicais. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi investigar os parâmetros tomográficos V, TC e UH no diagnóstico diferencial de cisto e granuloma apical. Para isso, foram selecionados 18 dentes permanentes unirradiculares portadores de PAC visível radiograficamente com indicação de remoção cirúrgica, sob o parecer do comitê de ética em pesquisa número 1.395.126. Os pacientes foram submetidos ao exame de TCCB. Os dados foram exportados no formato dicom para software Amira (v.5.3.3, Visage Imaging Inc, Carlsbad, CA) onde foram analisados o V da lesão periapical, média dos valores de UH e valores médios de TC das lesões. Após a remoção cirúrgica, as lesões foram coradas com hematoxilina-eosina e diagnosticadas histopatologicamente. Por meio do teste de Mann-Whitney, foi avaliado se havia diferença estatística significativa nas medidas dos V, TC e UH entre os casos diagnosticados como granuloma e cisto. Dos 18 casos avaliados, 10 foram diagnosticados como granuloma e 8 como cisto. Não houve diferença significativa entre granuloma e cisto para as medidas de V, TC e UH, ($p>0.05$). O uso da TCCB, levando em consideração os parâmetros utilizados, não foi um método válido para diferenciar cistos de granulomas.

COMPARAÇÃO QUANTITATIVA IN VITRO DO POTENCIAL EROSIVO DE ENXAGUATÓRIOS INFANTIS SOBRE O CIV

RAPÔSO, Nayre Maria Lauande; SILVA, Aline Bastos da; PASCHOAL, MARCO AURÉLIO BENINI; GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: Odontologia

Email: nayrelauande@gmail.com

Resumo: Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o potencial erosivo de enxaguatórios bucais infantis sobre cimento de ionômero de vidro convencional (CIV). Revisão de Literatura: Há um aumento do uso de enxaguatórios infantis em relação à população infantil, logo tem sido adotado o uso de agentes de controle químico complementando a escovação dentária e o uso do fio dental. Materiais e Métodos: Foram confeccionados 40 corpos de CIV divididos em 4 grupos (N=10) e submetidos à ciclagem erosiva por 15 dias, sendo expostos duas vezes/dia nas seguintes soluções de enxaguatórios bucais infantis: G1- Enxaguatório à base de cloreto de

cetilpiridínio, G2 - à base de triclosan e G3 - à base de triclosan. Previamente à ciclagem, os corpos de prova foram submetidos à leitura de rugosidade superficial com o auxílio do rugosímetro. Após a ciclagem, foi realizado o cálculo de aumento real de ganho de rugosidade. O estudo adotou como controle negativo a água destilada (N = 10). Resultados: O enxaguatório à base de triclosan apresentou o pH levemente mais ácido (pH = 6,83) em relação aos enxaguatórios à base de triclosan/gantrez (pH = 7,18) e à base de cloreto de cetilpiridínio (pH= 7,84). Os grupos testados apresentaram aumento de rugosidade em relação ao grupo controle (Rf = 0,93±0,11). Conclusão: Os enxaguatórios apresentaram capacidade erosiva sobre CIV com aumento dos valores de rugosidade. Palavras-chaves: Erosão, Cimentos Dentários, Antissépticos

ESTADO NUTRICIONAL DE FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITAL PRIVADO EM SÃO LUÍS MA

JARDIM, Ana Tamires*; NASCIMENTO, Joelma Ximenes Prado Teixeira; GONÇALVES, Ana Claudia Ribeiro; DE SOUSA, Rosangela Maria Lopes

Curso: Nutrição

Email: a-tamires@hotmail.com

O estado nutricional tem impacto direto sobre o rendimento do trabalhador, um bom estado nutricional resultada em melhor produtividade e rendimento. Objetivos: Buscando identificar as principais características nutricionais e antropométricas dos funcionários é que este trabalho fez-se necessário objetivando avaliar o perfil nutricional de funcionários de um hospital privado em São Luís –MA. Material e métodos: Estudo do tipo transversal, de caráter epidemiológico, em uma ação ao “dia do nutricionista realizado em Agosto de 2015, com amostra por conveniência. Foram coletados informações de sexo, idade, setor de trabalho e ainda realizadas medidas antropométrica como peso, estatura, circunferência da cintura e quadril. Resultados: A amostra foi composta por 58 indivíduos. A média de idade dos participantes foi de 31,29 ±9,51 anos. Em relação ao sexo, 87,93% (n=51) eram mulheres e apenas 7 participantes eram homens. O setor de maior participação foi a UTI (18,97%). Ao avaliarmos o estado nutricional, 43,10% estavam com diagnóstico de sobrepeso, seguido de eutróficos com 37,93%. Somados sobrepeso com obesidade temos a maioria da amostra 56,89%. 63,79% apresentaram risco para DCV pela RCQ. Conclusão: As análises dos dados revelam alto percentual de inadequação do estado nutricional com risco cardiovascular elevado que podem comprometer a saúde do trabalhador. Sendo necessário ações que promovam e monitorem a saúde desta população.

FORÇA DE ATRITRO ESTÁTICO E DINÂMICO EM DIFERENTES TIPOS DE BRAQUETES

FAHD, Claudia Gonçalves*; FERREIRA, Meire Coelho; VERCELINO, Célia Regina Maia Pinzan; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; MADA, Edson Yoshihiro

Curso: Odontologia

Email: claudiafahd@hotmail.com

Com o aumento da procura de tratamento ortodôntico por adultos desde meados dos anos 80, a procura por estética tem influenciado o surgimento de novos materiais no mercado odontológico, desencadeando o estudo sobre fatores que influenciam no atrito provocado entre o fio e braquetes. O presente estudo teve como objetivo, avaliar a força de atrito estática e dinâmica em 5 diferentes braquetes metálicos e estéticos. Os braquetes utilizados foram, Agile (3M Unitek), Synergy (RMO), Composite (Morelli), Gemini Clear (3M Unitek) e Pureluent (Ortho Classic) e dois tipos de fios, .016" NiTi e .019"x .025" Aço. Uma máquina de testes universal EMIC DL 200 MF avaliou o atrito. Foram realizadas análises estatísticas (ANOVA e teste de t de Student). Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre as forças estática e dinâmica obtidas nos diferentes braquetes com fio .016" e com fio .019"x.025". Quando comparado os diferentes braquetes com fio .016" e .019x.015", observou-se que os maiores valores de força de atrito estática foram dos braquetes Policristalino (Gemini clear) e Monocristalino (Pureluent). O menor valor tanto na força de atrito estática quanto na dinâmica foi observado para o braquete de Policarbonato (Composite), o qual diferiu estatisticamente dos demais braquetes. Concluiu-se no presente estudo, que o braquete do tipo policarbonato, apresentou o menor coeficiente de atrito, no entanto, é preciso avaliar a relação custo benefício na escolha do material a ser utilizado no tratamento ortodôntico.

MANIFESTAÇÕES AUDITIVAS E EXTRA-AUDITIVAS EM INTEGRANTES DE UM GRUPO DE BUMBA-MEU-BOI

MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro*; DIAS, Rosane da Silva; FAÇANHA, Rachel Costa

Email: carina.muniz@ifma.edu.br

Área / Especialidade: Fisioterapia

O ruído em forte intensidade e por um longo período de tempo pode ocasionar uma perda auditiva, sendo este um dos maiores agentes causadores de doenças ocupacionais. Existem normas que estabelecem como obrigatório, para todas as empresas, o monitoramento do ruído ocupacional e da condição auditiva dos trabalhadores, porém os músicos ainda não contam com amparo legal no que se refere à saúde e segurança no trabalho. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo descritivo, composto por uma amostra aleatória simples, contendo 41 integrantes de um grupo de bumba-meu-boi. A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2016, por meio de um questionário adaptado da pesquisa de Gambarra et al (2012), contendo as variáveis de estudo: características da amostra social, perfil laboral e sintomas auditivos e extra-auditivos. . Estudo aprovado pelo CEP com parecer de nº 1.532.544.

Dos indivíduos avaliados 58,5% eram do sexo masculino, com idade média de 27,68 anos, estando 58,5% com 15 a 25 anos idades entre, 53,7% são dançarinos e 46,3% são percursionistas. Com relação ao perfil sócio-laboral, 80,5% não possuem outra atividade ocupacional com exposição ao ruído. O tempo médio de participação no grupo é de 8,83 anos, sendo 75,6% com exposição de 2 horas diárias. 95,1% dos entrevistados não fazem uso de equipamento de proteção auditiva. O sintoma auditivo mais relatado pela amostra foi o zumbido, com 68,3%, sendo que 29,3% referiram otalgia, 19,5% apresentaram dificuldade de inteligibilidade da fala, 26,8% relataram dificuldade de compreender o rádio na presença de ruído e 24,4% referiram tontura, com 22,0% de dificuldade de atenção. Dentre os sintomas extra-auditivos, os distúrbios digestivos apresentaram maior prevalência, com 41,5% dos casos, seguido de alteração do humor (36,6%), alteração do sono e cansaço frequente com 24,4%. 22,0% relataram cefaleia. Os resultados demonstram que um maior número dos integrantes são do sexo masculino com idades de 15 a 25 anos, e dançarinos não possuindo outra atividade laboral com exposição a ruído e com frequência na quadra de ensaios de duas vezes na semana, ainda relatam como maior sintoma auditivo o zumbido e dificuldade em compreender o rádio na presença de ruído e um número bastante significativo não faz uso de EPI fazendo-se necessário conscientização do uso de equipamento de proteção individual e conscientização sobre sintomas auditivos extra-auditivos para uma saúde auditiva, que se mal cuidada, interfere na compreensão de sons em atividades diárias como escutar rádio/tv e interações sociais que poderão prejudicar a qualidade de vida pessoal e profissional. DESCRITORES: Ruído ocupacional, Sintomas auditivos, Sintomas extra-auditivos.

PERFIL AUDIOLÓGICO DE INTEGRANTES DE UM GRUPO DE BUMBA-MEU-BOI

MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro*; DIAS, Rosane da Silva; FAÇANHA, Rachel Costa

Email: carina.muniz@ifma.edu.br

Área / Especialidade: Fisioterapia

A exposição ao ruído acima dos limites toleráveis à orelha humana tem se tornado um agente presente no cotidiano da população, sobretudo nos ambientes sociais e ocupacionais. Os índices de perda auditiva induzida pelo ruído vêm se multiplicando e se tornando uma das maiores doenças relacionadas ao trabalho. Os músicos e dançarinos de bumba-meu-boi são expostos a ruídos e a elevados níveis de pressão sonora devido a várias horas de ensaios e ao grande número de apresentações. Estes profissionais constituem, portanto, um grupo com probabilidade para desenvolver perda auditiva de origem ocupacional. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo descritivo, composto por uma amostra com 41 integrantes de um grupo de bumba-meu-boi da capital maranhense. A coleta de dados foi realizada no período de abril a

junho de 2016, por meio do exame de audiometria tonal limiar, contendo as variáveis de estudo: grau de perda auditiva e configuração audiométrica. Estudo aprovado pelo CEP com parecer de nº 1.532.544. De acordo com a análise estatística dos dados, 53,7% dos integrantes apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade para a média tritonal das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, Destes, 39,0% apresentaram configuração em entalhe, sugestivo de desencadeamento de perda auditiva com a continuação da exposição ao ruído sem proteção auricular. Apenas 2,4% dos pesquisados apresentaram como resultado o grau de perda auditiva leve, assim como o grau de perda auditiva moderado com configuração em entalhe. Conclui-se que os integrantes do grupo de Bumba meu Boi apresentam exames audiométricos sugestivos de perda auditiva o que se torna imprescindível uma conscientização sobre saúde auditiva para prevenção do agravamento desta alteração. DESCRITORES: Audiometria, perda auditiva induzida por ruído, ruído ocupacional

TRAUMATISMO DENTÁRIO EM ESCOLARES MARANHENSES E QUALIDADE DE VIDA

ROSA, Jacqueline De Fatima Lopes*; PEREIRA, Caroline Chavier; LIMA, Samara Luciana De Andrade; FERREIRA, Meire Coelho; CARVALHO, Ceci Nunes.

Email: jakoliveira1902@hotmail.com

Curso: Odontologia

O objetivo do estudo foi avaliar o impacto do traumatismo dentário na qualidade de vida de crianças maranhenses. A amostra foi composta por 343 crianças entre 6 e 10 anos de idade, provenientes de escolas públicas e privadas de São Luís (MA). Técnica de amostragem multi-estágio foi adotada para seleção das crianças. Três examinadores calibrados aplicaram o Child Perception Questionnaire (CPQ8-10), no formato de entrevista, às crianças. Em seguida, as seguintes condições clínicas foram avaliadas: traumatismo dentário (fraturas e luxações), cárie dentária e má oclusão. Aspectos econômicos e sociodemográficos foram também obtidos. Estatística descritiva, teste de Mann-Whitney, Qui-quadrado e regressão de Poisson foram realizadas ($p < 0,05$). A média de idade das crianças foi de 8 anos ($\pm 1,38$) e 53% foi do gênero feminino. Não houve diferença significativa entre os grupos (com e sem trauma dentário) para o escore total do (CPQ8-10), sintomas bucais, limitação funcional, bem-estar emocional e social ($p=0,358$; $p=0,659$; $p=0,50$; $p=0,113$; $p=0,954$, respectivamente). Na análise de regressão, constatou-se que o traumatismo dentário não foi capaz de explicar o impacto por meio dos itens (CPQ8-10). Com base nos achados, conclui-se que o traumatismo dentário não impactou na qualidade de vida das crianças. (Apoio: Edital PPSUS - FAPEMA/CNPq/Ministério da Saúde,

Processo 03386/13; Edital Universal - FAPEMA, Processo 00713/14. No do SISNEP: processo nº 445.238 N° 03386/13; 00713/14 No do SISNEP: Parecer Cep nº 445.238.)

TERAPIA COMUNITÁRIA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALGUNS PARTICIPANTES DE SESSÕES
MARQUES, Márcia Lucileide Silva*; CAMARGO, Amilton Carlos.

Curso: Psicologia

Email: marciamarques23@yahoo.com.br

A terapia comunitária integrativa (TCI) surge contemporânea ao contexto de mudanças no sistema de saúde, no que tange à saúde mental, em função da necessidade de um espaço de acolhimento e expressão de problemas existenciais e sociais, que acarretavam o adoecimento psíquico, configurando-se como uma grande aliada às propostas de saúde mental. Este trabalho discute a Terapia Comunitária Integrativa e o processo terapêutico engendrado nesta realidade, tendo como objeto de pesquisa as representações sociais dos participantes de sessões, a respeito da Terapia Comunitária. Constituem-se objetivos desta pesquisa analisar e compreender as eventuais estratégias de enfrentamento das adversidades cotidianas, construídas nas relações com outros sujeitos participantes da TC, além de identificar mudanças ocorridas na trajetória existencial dos participantes, após suas vivências na TC. O campo empírico de pesquisa foi uma instituição, localizada em São Luís /MA, que desenvolve cuidados em saúde. Utilizou-se a entrevista reflexiva, e posteriormente produziram-se relatos como versões de sentido, na perspectiva de Amatuzzi, descrevendo fenomenologicamente o vivido. Foram utilizadas referências teórico-metodológicas advindas da perspectiva psicossociológica, buscando-se selecionar partes do conteúdo das entrevistas, relacionando-os aos seus pressupostos teóricos, a partir de unidades de significação. A TC foi representada como um tratamento médico, em que o equilíbrio da saúde está diretamente ligado ao envolvimento ativo de cada pessoa nesse processo, não meramente como receptores e reprodutores de procedimentos e receitas, mas elevados a um estado de consciência crítica de si e do mundo que lhes é circundante de significados e significações, para gerir e transformar suas trajetórias de vida. Nº Parecer de Aprovação pelo CEP: 1.292.911

PAINEL REVISÃO DE LITERATURA - GRADUAÇÃO

A ARTE DE ADOLESCER: IDEAÇÕES SUICIDAS ATRELADAS A ADOLESCÊNCIA

ROCHA, Brida Coelho*; DE MELO, Elisângela Pereira; FARIA, Simony De Sousa

Curso: Psicologia

Email: bridacoerocha@gmail.com

O presente trabalho tem por objetivo expor a interferência dos fatores externos dos altos índices de ideação suicida em estudantes adolescentes, com o intuito de diminuir os conflitos enfrentados. O suicídio é um problema de saúde pública, que de acordo com pesquisas recentes, o Brasil ocupa o oitavo lugar entre países com taxas exorbitantes de casos registrados. Sendo este, um tema definido como tabu, que implica em dificuldades na conscientização e prevenção devido a privação de uma melhor compreensão sobre essa problemática. Descobre-se que esse problema talvez esteja mais enraizado que a priori supunha-se. Denota, não a fuga do sofrimento e sim, seu escape como uma perspectiva à vida. O caminho para o suicídio perpassa por diferentes fases, antes de culminar ao ato propriamente dito, tendo outras experiências vivenciadas como a automutilação, em que o indivíduo encontra-se no limiar entre a fuga da angústia e o desejo à vida, que tentará suprimir a dor emocional ou psicológica. É notório que o novo tende a causar medo, portanto o adolescente ao perpassar pelo processo de “adolescer” declina-se a sofrer uma crise ao defrontar-se com o desconhecido experienciando dúvidas e

inseguranças. Partindo de tal pressuposto, foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando dados disponíveis em um livro e na plataforma SciELO, fundamentada no ponto de vista psicanalítico e sociológico. Ressalta que o adolescente não dispõe dos alicerces para obter uma funcionalidade saudável, pois os três pilares não mais garantem uma completa assessoria no que tange seu desenvolvimento.

A CRIANÇA COMO PACIENTE CIRÚRGICO: ANESTÉSICOS E PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

DO NASCIMENTO, Luana Vieira; LIMA, Genilson Mateus Nojosa; LIMA, Rafaelle Cristine de Carvalho; NONATO, Rammon de Faria; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: mateusnojosa10@hotmail.com

A criança como paciente cirúrgico: Anestésicos e procedimentos sedativos Genilson Mateus Nojosa Lima Luana Vieira do Nascimento Rafaelle Cristine de Carvalho Lima Rammon de Faria Nonato Orientador : Andrezza Bastos Maciel Co-orientador: Francisco Maciel O controle da dor e do medo são fundamentais para se ter sucesso durante o processo cirúrgico em odontopediatria e os mesmos são um dos fatores que podem trazer problemas durante o procedimento, para que sejam evitados quaisquer tipos de transtornos o cirurgião-dentista poderá utilizar recursos anestésicos e também o uso de ansiolíticos ou sedativos, para pacientes temerosos ou agressivos. A quantidade correta de anestésico administrada, deve-se calcular de acordo com o peso da criança. Existem vários tipos de anestésicos usado pelo cirurgião-dentista na odontopediatria, especificamente a Lidocaína 2%, Epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000, pois é o que menos causa efeitos adversos em crianças. A Bupivacaína é contraindicada na odontopediatria, pois tem longa duração, aumentando o risco de traumatismo involuntário na área anestesiada. A sedação tem procurado ser benéfico nos casos de procedimentos cirúrgicos, mas quando indicados, eles devem ser usados mais como complemento do que como substitutos das abordagens ou técnicas tradicionais para o controle do comportamento. A sedação mínima em crianças pode ser obtida por meio de benzodiazepínicos, por via oral ou pela inalação da mistura de óxido nítrico e oxigênio, pela via respiratória. Entretanto, é de extrema importância salientar que os anestésicos são depressores do sistema nervoso central, sendo assim, quando for considerada a sedação mínima na criança, o volume de solução anestésica local deve ser menor do que o usual, pois a criança é mais sensível à ação dos fármacos depressores. O trabalho tem como objetivo de salientar administração destes anestésicos e procedimentos sedativos em crianças. Palavras-chave: anestésicos, sedativos, crianças, cirurgia.

A CRIANÇA COMO PACIENTE CIRÚRGICO: PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

MELO, Raquel Conceição Costa*; SANTANA, Vanessa de Fátima Serra; MACIEL, Andrezza;

Email: raquelcmelo28@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A prescrição de medicamentos dentro da odontologia é realizada de acordo com cada tipo de paciente e existe uma diferença grande, quando se trata de lactentes e crianças, pois ambos diferem de pacientes adultos pelos aspectos comportamentais e fisiológicos. Os medicamentos de interesse para a odontopediatria são: Os anestésicos locais, analgésicos e anti-inflamatórios, sedativos, antimicrobianos, fluoretos, anti-histamínicos e antieméticos. Alguns exemplos de fármacos mais comumente empregados são: Paracetamol, nimesulida, amoxicilina, Nistatina e Midazolam. A prescrição de cada um desses fármacos deve seguir o seu protocolo de acordo com o que pode ser indicado para crianças. Um dos principais fatores que dificultam a ingestão de alguns fármacos prescritos na odontopediatria é a deglutição, pois as crianças possuem mais dificuldade na hora de deglutir medicamentos em forma de comprimidos ou cápsulas, portanto, deve-se optar por preparações líquidas, tornando mais fácil ingestão desses fármacos. Além da capacidade de deglutição, destaca-se também o sabor nesse processo, que por sua vez, acaba sendo bem apreciado pela criança. Contudo deve-se ter cuidado com o xarope, o elixir e a suspensão. A escolha das formas farmacêuticas em pediatria baseia-se no desenvolvimento da criança, pois, alguns compostos podem alterar esse processo. Um exemplo são as tetraciclina, que afetam os tecidos dentário e ósseo. As crianças submetidas à terapia com tetraciclina podem apresentar pigmentações acastanhadas permanentes nos dentes, este fato esta diretamente atrelado à dose administrada e o peso, devendo-se evitar a prescrição deste fármaco a crianças até os oito anos de idade.

A FREQUENCIA DA PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO EM ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM

FERREIRA, Ruanny Teixeira*; MONTEIRO, Pablo de Matos; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; PACHECO, Wallace; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar.

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A automedicação é uma prática comum no Brasil, em boa parte dos casos, a indicação vem de familiares ou amigos que já tiveram quadro clínico parecido e que desconhecem o fato de que cada organismo reage de forma diferente aos remédios. O objetivo do estudo foi conhecer a frequência da prática da automedicação alunos do curso de enfermagem O estudo teve por

objetivo avaliar a qualidade de vida dos enfermeiros. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 26 artigos nacionais e que atenderam aos critérios de inclusão, revistas eletrônicas e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma português, publicados no período de 2002 a 2015. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2015 a março de 2016. Conclui-se que em 100% dos estudos os alunos compraram medicamentos sem receita médica, principalmente os antigripais, não houve relato sobre intoxicação medicamentosa, ou seqüela pelo uso da medicação. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer, ainda, consequências como: reações alérgicas, dependência e até a morte. Assim, mesmo não tendo como acabar com a automedicação, convém criar meios para minimizá-la. Palavras-chave: Automedicação. Universidade. Prática.

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN

SANTOS, Alison Reis*; FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; LEITE, Zinole Helena Martins; MONDAINE, Rosimeyre Leão.

Curso: Psicologia

Email: alisonpsicologia@gmail.com

A Síndrome de Down tem sido caracterizada como uma cromossomopatia, resultado da triplicação do cromossomo 21, cujas características principais são o rebaixamento intelectual, a frouxidão ligamentar e a hipotonia generalizada. A inclusão sócio educacional de pessoas com síndrome de down é uma necessidade premente nos dias atuais. Assegurada por Lei, ela depende de investimentos constantes nos anos iniciais da vida desta pessoa. Esta pesquisa bibliográfica e descritiva objetiva descrever o papel da psicomotricidade na inclusão sócio educacional de pessoas com síndrome de Down. Para a sua realização procedeu-se á leitura e análise de livros e 28 artigos disponíveis nas seguintes bases de dados: Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde, através das palavras-chave: "Síndrome de Down", "Psicomotricidade" e "Inclusão". Foram inclusos os artigos completos que versavam sobre o tema, e excluídos artigos incompletos e sem resumo, considerados a partir de 2007. Revisão A inclusão escolar representa para as pessoas com deficiência em geral, um resgate do direito à educação. Práticas psicomotoras, ao promoverem o desenvolvimento global de pessoas com síndrome de Down favorecem a inclusão desta categoria na sociedade. A psicomotricidade, ao enfatizar a unidade

indivisível do homem, representa uma técnica que favorece o desenvolvimento integral de pessoas com síndrome de down. Práticas psicomotoras favorecem as aprendizagens escolares, desenvolvem habilidades para vida social e trabalho, promovendo, assim, a inclusão social

A IMPORTÂNCIA DA AFERIÇÃO E DO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL NA ODONTOLOGIA

MOREIRA, Marcela Falcão*; DE SANTANA, Yasmin Borges Bringel; DUAILIBE, Silvana Alves de Carvalho

Curso: Odontologia

Email: YASMIN_BRINGEL@OUTLOOK.COM

A pressão arterial possui uma interrelação fundamental com os procedimentos odontológicos, porque em pacientes com pressão alta ou hipertensão, apesar da cavidade oral estar na periferia do corpo, correm o risco, entre outros, de terem os seus vasos da região com a pressão elevada e, conseqüentemente, o fluxo sanguíneo vai ser aumentado, havendo maior dificuldade de cicatrização. Já nos casos de pressão baixa ou hipotensão, o paciente pode apresentar a mesma por aflição ou até mesmo traumas de procedimentos, ficando, assim, submetido a alterações que podem comprometer a frequência cardíaca e os procedimentos odontológicos necessários. É comum nas duas situações alterações que precisam de um controle frequente durante todo procedimento. Uma pessoa hipertensa pode ter dores no peito, dores de cabeça, tonturas entre os outros sintomas que podem ser identificados pelo cirurgião dentista, assim como a hipotensão também pode apresentar frequência cardíaca irregular, náuseas, visão embaçada, entre outros sintomas. É de responsabilidade do cirurgião dentista aferir a pressão antes de qualquer procedimento, cabendo a ele também monitorar com atenção e regularmente a pressão do paciente, como em procedimentos cirúrgicos ou em procedimentos que possam causar maior desconforto ao paciente. Há várias maneiras de fazer essa monitorização da pressão, sendo o método mais utilizado o esfigmomanômetro com o estetoscópio ou o método digital.

A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIEDADE NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL

MENDES, Vanessa Helena Leite*; VINHAIS, Julianne Vasques Mendes; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SAMPAIO, Karen Silva; FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; LEITE, Zinole Helena Martins; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo;

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

Os rins são órgãos vitais para os seres humanos. A má funcionalidade dos rins resulta na Insuficiência Renal (IR), que pode ser aguda ou crônica . Esta pesquisa bibliográfica e descritiva objetiva refletir sobre a importância da interdisciplinaridade no atendimento a pacientes com insuficiência renal crônica . Procedeu-se à análise de livros e 30 artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, Bireme e Google acadêmico, que versavam sobre o tema do estudo , através das palavras chaves Insuficiência renal crônica, equipe interdisciplinar , Cuidados. Revisão: A doença renal crônica (DRC) é uma patologia de caráter progressivo, que inexoravelmente evoluiria em direção à doença renal em estágio final, restando como alternativa terapêutica a terapia substitutiva de função renal - diálise e transplante renal. Estão associadas a este tipo de adoecimento inúmeras reações emocionais, sentimentos de incapacidade, episódios depressivos e resistências ao tratamento, tanto por parte do paciente como de seus familiares , o que exige estratégias de enfrentamento para aderir ao novo estilo de vida. Conclusão: Dado que o adoecimento é um fenômeno biopsicossocial e cultural , salienta-se a necessidade de uma abordagem interdisciplinar ao paciente com insuficiência renal crônica, favorecendo a adesão ao tratamento, restituindo-lhe a autoestima e promovendo a sua qualidade de vida . O diálogo entre os profissionais da equipe de saúde, familiares e cuidadores do paciente favorecem a integralidade da atenção ao mesmo, humanizando o processo de tratamento.

A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES PARA A APRENDIZAGEM

VELOSO, Alice Súzane; BECKMAN, Márcia Valéria Reis

Curso: Psicologia

Email: suzane_veloso@yahoo.com.br

Resumo: Na contemporaneidade utiliza-se cada vez mais das tecnologias da informação e comunicação (TIC), as quais promovem a comunicação e simplificam rotinas. As TICs são utilizadas cotidianamente na maioria dos lares brasileiros, tornando-se necessárias em várias esferas sociais, como a educação. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo compreender a influência da tecnologia no processo de aprendizagem escolar. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, com consultas em artigos publicados entre 2010 a 2015. Na revisão de literatura constatou-se como benefícios das TIC no processo de aprendizagem, que facilitam a aprendizagem e a pesquisa, promovem a informação e comunicação, adequam o ensino ao contexto do aluno. No desenvolvimento infantil afetam a construção da identidade infantil, multiplicam as situações de funções da zona de desenvolvimento proximal, promovem a inteligência e criatividade e facilitam a inclusão. Como malefícios no processo de aprendizagem, prejudicam as normas cultas da língua vernácula, fomentam informações

inverídicas na pesquisa, além de promoverem o “ctrl c +ctrl v”. No desenvolvimento infantil prejudicam a saúde física e mental, trazem confusão entre mundo real e virtual, afetam a construção da identidade infantil, podem alienar, redimensionam a cultura de pares, além de fomentar a cultura material, a exclusão digital, assim como prejudicam o vínculo afetivo e provocar o isolamento social. O uso das TIC não pode ser abusivo, indiscriminado ou sem um planejamento (no caso da educação), necessita-se de cuidados e acompanhamentos tanto do professor como da família, para que não interfira no bom desenvolvimento do aluno.

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK) NO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE

LEITE, Zinole Helena Martins*; FERNANDES, Luzene Keleme Santos; JANSEM, Vitoria Helena Leite; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

A adolescência é um fenômeno biopsicossocial. Na Era da Informação, esta etapa do desenvolvimento toma uma nova configuração decorrente da emergência das redes sociais e dos usos que os adolescentes fazem da mesma, como o Facebook. O objetivo deste estudo bibliográfico e exploratório é descrever a influência do Facebook no comportamento psicossocial dos adolescentes. Foram analisados livros diversos, dissertações e 15 artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando-se como palavras-chaves: Adolescência, Facebook, Desenvolvimento Psicológico. Revisão: Os adolescentes da pós-modernidade são nativos digitais, nasceram conectados, e tendem a ser nomeados de geração Z. Suas identidades, vínculos familiares e sociais e processos de aprendizagem encontram-se marcados pelas mudanças tecnológicas e seus efeitos nas diversas esferas da sociedade. A participação em comunidade e redes sociais, como o Facebook exerce grande influência na vida desta geração, repercutindo inclusive nos vínculos familiares e intergeracionais. Esta geração Z, ou geração silenciosa tem sido foco de estudo de inúmeros pesquisadores, sendo considerada uma geração marcada pelo individualismo, comportamento de manada e esfacelamento dos vínculos. Conclusão: Sendo os adolescentes seres em transição com pouca maturidade social e em busca de sua identidade, questão central da adolescência, a utilização frequente das redes sociais e do Facebook são influenciadores em potencial no comportamento dos jovens entre si e no contexto Inter geracional.

A PSICOLOGIA DIANTE DA MEDIUNIDADE: DESCOBERTAS INICIAIS

ANDRADE, Francisco Pereira de Andrade; MARQUES, Jennifer Pinto Machado; FURTADO, Laissa Duailibe; LUZ, Jéssica Barbosa da; LIMA, Lia Raquel Macedo; MARTINS, Rafisa Moscoso Lobato Mendonça; RODRIGUES, Sandro Eduardo

Curso: psicologia

Email: andrade.jair@bol.com.br

Resumo: O presente trabalho, desenvolvido pelo GEPPA - Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia Anomalística da Universidade CEUMA, tem como objetivo realizar um estudo sobre a experiência de mediunidade a partir do olhar da Psicologia Anomalística, em sua interface com a Psicologia Social. A Psicologia Anomalística caracteriza-se por ser uma área de estudo sobre as chamadas experiências anômalas, ou seja, experiências que, aparentemente, não têm explicação dentro do arcabouço teórico científico, tais como: experiências fora-do-corpo, experiências de quase morte, experiências de sonhos lúcidos, experiências de percepção extra-sensoriais e experiências mediúnicas. A mediunidade pode ser definida como a suposta comunicação (ou ação) de um agente espiritual ou sobrenatural no mundo material, através da intermediação de um indivíduo chamado médium. Importantes pesquisas brasileiras recentes têm abordado a mediunidade como um fenômeno psicossocial, desvinculando-a de interpretações exclusivamente intrapsíquicas ou mesmo religiosas. Ao considerar a mediunidade como um fenômeno psicossocial, essas pesquisas levam em consideração aspectos do contexto histórico e social que podem influenciar significativamente tais experiências.

A RELAÇÃO CÓLICA E ALIMENTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Maria de Lourdes Piedade*; NUNES, Maria José; MATOS, Milena; SOUZA, Angela Tâmara Lemos

Email: lourdes_piedade@hotmail.com

Curso: Nutrição

Resumo: A cólica menstrual corresponde a uma dor no abdômen inferior podendo irradiar-se para a região lombar ou até a coxa. Comum entre as mulheres durante o período que antecede a menstruação e mesmo durante o período menstrual, essa dor pode ser aliviada através da alimentação. Alguns alimentos pioram os sintomas e, devem ser evitados: café, chás e refrigerantes contendo cafeína, chocolate, embutidos, enlatados, salgadinhos, carne vermelha, álcool e produtos lácteos, consumir alimentos fermentáveis, leite e derivados e álcool, potencializou sintomas e muitas, optaram por consumir chocolate para alívio da ansiedade e tiveram o apetite aumentado nesse período. Isso ocorre devido às alterações hormonais, porém é importante não exagerar nesses dias e buscar se alimentar com equilíbrio. Alimentos ricos em

fibras, como legumes, folhosos e frutas são incentivados. Outros como banana, aveia, abacate, cacau, brócolis, grão de bico e abacaxi são importantes fontes de nutrientes precursores da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem estar. Frutas cítricas, oleaginosas e peixes vão combater os danos do estresse. Para aliviar a tensão e estresse, chá de folhas de maracujá, alface e chás calmantes (camomila, erva cidreira, jasmim).**CONCLUSÃO:**Estudos demonstraram a íntima relação entre os hábitos alimentares e a cólica durante o período de menstruação, e sugerem a reeducação alimentar e prática de exercícios físicos para alívio dos sintomas.

A SAÚDE BUCAL DE UM DIABÉTICO

DUTRA, Thais Cristina Guimarães*; NASCIMENTO, Nuria Esteve; SERRA, Paulo Vinicius Barros; MARQUES, Larissa Falcão; NETO, Lídio Gonçalves; MARQUES, Tércia Virgínia Falcão

Curso: Odontologia

Email: thaiscgd@hotmail.com

A diabetes é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina ou de sua capacidade reduzida de exercer seus efeitos. A incapacidade do pâncreas de produzir o hormônio insulina em quantidades necessárias para suprir o organismo ou até mesmo nem chegar a produzir, não promove a redução das taxas glicêmicas que permitem que o açúcar presente no sangue, penetrem nas células para ser utilizado como fonte de energia. Portanto, com o funcionamento incorreto desse hormônio ou a falta dele, haverá aumento de glicose no sangue resultando em uma diabetes. Há uma dominância de doenças gengivais (gengivite e periodontite) quando relacionados a outras doenças costumeiras em diabéticos, porém, existem outras doenças relacionadas a boca que afetam com maior facilidade os diabéticos, entre elas estão: candidíase, xerostomia, hipossalivação, síndrome da ardência bucal, abscessos e queilite angular. A falta de regulação do açúcar no sangue, torna o diabético mais suscetível a doenças bucais do que uma pessoa normal, levando o mesmo a perder seus dentes com mais facilidade. O objetivo desse estudo é revisar a importância do conhecimento do cirurgião dentista quanto a patologia da diabetes e das alterações causadas na sua cavidade bucal encontradas na literatura, buscando demonstrar minuciosamente os âmbitos desta patologia (sintomas, diagnósticos e exames complementares) e suas principais alterações bucais para que o trabalho do cirurgião dentista trate o paciente como um todo.

A TELECINESE EXISTE? EVIDÊNCIAS OBTIDAS A PARTIR DO MANIFESTO DOS 34 E OUTRAS PESQUISAS

SERRA, Letícia Dias*; PEREIRA, Raissa Costa; DE ANDRADE, Francisco Pereira; DA SILVA, Richardson Gomes Lima

Curso: Psicologia

Email: andrade.jair@bol.com.br

É comum vermos em filmes e animações alguns super-heróis movendo objetos apenas com “a força da mente”, um fenômeno conhecido por telecinese. No mundo real, eventos desse tipo são mais comuns em centros espíritas, locais onde supostamente os espíritos desencarnados realizariam, a pedido dos médiuns (pessoas dotadas de habilidades para tal), a manifestação de vários fenômenos característicos da telecinese, tais como formação de luzes e brilhos (fotogênese), resfriamento do ar (criogênese) e ocorrência de pancadas e outros sons em mesas ou outros locais da sala (tiptologia), além da movimentação dos objetos presentes. Apesar de não ser possível determinar se a causa dessas manifestações é natural ou sobrenatural, é válido se questionar se esse fenômeno não passa de assunto próprio da ficção científica transposto para a realidade através de fraudes ou truques de ilusionismo. A telecinese, assim como muitas outras Experiências Relacionadas a Psi (clarividência, telepatia e precognição), foi seriamente estudada no início do século XX através de inúmeras pesquisas de cunho experimental que atestaram sua existência, mesmo após descartadas as fraudes. Um dos mais conhecidos estudos na área da telecinese foi realizado com o médium Jean Guzik no Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Participaram do trabalho médicos, cientistas e intelectuais que tinham por objetivo comprovar ou refutar as habilidades de Guzik por meio dos conhecimentos e rigores científicos disponíveis para a época. Após 80 sessões realizadas ao longo de dois anos, esses pesquisadores assinaram um relatório (que ficou conhecido por Manifesto dos 34) que confirmava cientificamente a existência da telecinese.

A RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES SOBRE AS SINTOMÁTICAS DA MENOPAUSA PELO ENFERMEIRO

REIS, Kianne Karla De Castro*; DO NASCIMENTO, Edna Maria; SILVA, Pollyana Marreiros; MATOS, Nausenilde Serra; SA, Veronica Correa; PEREIRA, Gilmarcia Pinheiro; PEREIRA, Gilmarcia Pinheiro.

Email: gilmarciapp@hotmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

O climatério é uma fase de extrema relevância para a mulher, pois a maturação feminina atinge seu auge, e em decorrência disso há toda uma nova construção da identidade feminina. Trata-se de revisão integrativa, com análise de literatura dos últimos nove anos. Neles observaram-se cinco itens de suma importância. As mulheres nessa condição não sofrem de patologia, apenas

ocorre uma modificação no organismo onde os ovários param de produzir hormônios femininos estrogênio e progesterona. Esse processo surge entre a menacme e a velhice, com declínio da possibilidade de reprodução, diminuição fisiológica e gradativa da atividade ovariana que marcam o início desse período. Com todos esses acontecimentos se fazem necessárias intervenções no intuito de orientar as pacientes, essencialmente por quem lida diretamente com as mesmas. Portanto, o cuidado de enfermagem foi caracterizado como estímulo favorável à quebra e desmistificação de mitos e tabus preconcebidos relacionados ao climatério e à mudança da mulher. Além disso é necessário orientá-las a lidar com os sintomas do climatério para adaptação a nova condição, e a tomar medidas para redução/prevenção dos sintomas. Cabe ressaltar ainda que as sintomatologias presentes na maioria dos casos são alterações nas mamas, atrofia genitúrinárias, atrofia cutâneas, alterações tardias (osteoporose), e o aumento do risco para doenças cardiovasculares

A DESIGUALDADE DE GÊNERO NO ÂMBITO DO TRABALHO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

FACUNDO Ruana Lacerda*; SANTOS; Maria da Graça Pereira; AQUINO, Daiane Rose, Cunha Bentivi

Curso: Psicologia

Email: gracinhapereira_2007@hotmail.com

A questão da desigualdade de gênero tem sido alvo de recentes discussões no âmbito político e acadêmico com o objetivo de avaliar as formas igualitárias de distribuição, como conquista de direitos e justiça social. Especificamente no âmbito do trabalho, o trabalho da mulher era tido como invisível, bem como as desigualdades de gênero nesse mercado. O feminismo teve papel central na desconstrução desse paradigma ao introduzir na vida sindical questionamentos acerca do poder masculino e da invisibilidade das mulheres. A participação das mulheres no mercado de trabalho deu-se de forma crescente entre as décadas de 20 a 80, entretanto, em condições desiguais, mal remuneradas e sem proteção social. Este estudo busca compreender a desigualdade de gênero no contexto do trabalho, considerando seus diversos aspectos para uma visão atual desse fenômeno. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Baseou-se na leitura de artigos científicos publicados a partir de 2010. De acordo com os dados obtidos, estudos recentes apontam que houve mudanças significativas no mundo trabalho. A degradação das condições de trabalho e de suas relações influenciam em novas formas de exclusão. Estas mudanças incidem em especial nas mulheres trabalhadoras, pois apoiam-se nos mecanismos de exclusão de gênero, agravando a desigualdade no âmbito do trabalho. Conclui-se que apesar de

estarem inseridas no mercado de trabalho, as mulheres sofrem nesse contexto, pois encontram-se marcadas pelos mecanismos de exclusão baseados em subalternidade de gênero. Palavras-chave: Gênero. Desigualdade. Trabalho.

A DINAMIZAÇÃO DA TRIAGEM NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM CÂNCER

SILVA, Teresa Raquel Ferreira da*; SOARES, Whezananda Lopes; SANTOS, Alexsandro Ferrerados.

Email: teresarferreira@hotmail.com

Curso: Nutrição

O câncer é a segunda causa mortis por doença no mundo. E o agravamento dessa doença tem forte associação com a desnutrição. O trabalho objetiva descrever a importância de uma triagem nutricional dinamizada para intervenções nutricionais pontuais em pacientes oncológicos. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar preconiza que a triagem nutricional no paciente com câncer não deve ultrapassar as primeiras 48 horas após a admissão hospitalar. Para detectar a desnutrição a triagem nutricional é usada como ferramenta que direciona uma avaliação nutricional mais aprofundada e melhor intervenção nutricional. Em pesquisa conduzida em pacientes hospitalizados na França, uma triagem nutricional dinamizada feita através de um software, promoveu redução das reinternações de pacientes desnutridos em até 30 dias. No Maranhão, observou-se que a triagem nutricional tardia (após 48 horas) associa-se a um risco de desnutrir elevado e este a um maior tempo de internação e a morte em pacientes com câncer. Assim, traçar estratégias para reduzir o tempo de triagem nutricional, demonstra ser ponto promissor para futuras pesquisas.

A GESTANTE COMO PACIENTE CIRURGICA: PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

MARQUES Alyne Amengol *; ARARUNA, Paloma Santos; SANTOS, João Vitor Moraes Araújo; REIS, Anelice Pereira; MATTOS, Yara; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Fancisco José LIMA

Curso: Odontologia

Email: alinyam@hotmail.com

A terapêutica medicamentosa durante a gravidez deve ser cuidadosa, pois alguns fármacos podem causar sérios efeitos adversos à mãe e ao feto, como os anti-inflamatórios não esteróides (AINE) que podem atrasar o início do parto provocando o encerramento no feto antes do nascimento, antibióticos como (tetraciclina, cloranfenicol, estreptomicina) podem causar crescimento ósseo retardado, dentes amarelados permanentemente além de provocar surdez e a síndrome do bebê cinzento, anticoagulantes (dicumarínicos) antes dos três meses de

gestação tem grandes chances de anomalias congênitas significativas além disso, há risco que ocorra hemorragia tanto na mãe como no feto. É imprescindível que a terapêutica cautelosa se estenda pelo período de amamentação, pois a maioria dos fármacos administrados às mulheres durante a lactação pode ser detectada no leite materno. A prescrição para tais pacientes deve ser realizada de forma racional, evitando-se desta forma, os efeitos colaterais e as reações adversas. É de extrema importância que o cirurgião-dentista, como profissional da saúde, avalie a necessidade, a eficácia e a relação risco/benefício dos medicamentos que podem ser prescritos para tais pacientes, além das alterações corpóreas e bucais decorrentes desta fase. Para tanto, a proposta deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, no que se refere à prescrição de medicamentos no atendimento odontológico a pacientes gestantes e lactantes.

A GESTANTE COMO PACIENTE CIRÚRGICA: SOLUÇÃO ANESTÉSICA

COSTA, Rafaela da Souza*; BARROS, Ana Caroline; CORREA, Yara de Freitas; FREIRE, Daniela Weiller; Mariana; BASTOS, Andrezza Maciel; LIMA, Francisco José

Curso: Odontologia

Email: kcarolbarros@gmail.com

Durante o período gestacional o organismo da mulher desencadeia numerosas alterações fisiológicas de caráter sistêmico e local. Em relação às alterações sistêmicas, são observadas modificações cardiológicas, vasculares e respiratórias. Além disso, alterações na cavidade bucal também podem estar presentes, como o aumento da incidência de cárie dental, erosões dentais e gengivite. Sendo assim, o conhecimento dos cirurgiões-dentistas a respeito do atendimento odontológico a gestantes constitui etapa fundamental na assistência à saúde bucal durante o pré-natal, principalmente no que cerne o uso de anestésicos locais. Sabe-se que prática da anestesia local é bastante comum dentro da odontologia, visto que, na grande maioria dos procedimentos realizados há presença de dor. Por serem compostos de sais que possuem ação vasodilatadora, limitando seu tempo de ação, estão comumente associados aos vasoconstritores. Em geral, os anestésicos locais são considerados seguros para a administração durante o período gestacional, com exceção da prilocaína, uma vez que este fármaco diminui a circulação placentária e apresenta o risco de metemoglobinemia e hipóxia fetal. O uso do vasoconstritor felipressina é contra-indicado, pois há risco de aumentar a contratilidade uterina devido à sua semelhança estrutural com a ocitocina. Segundo a literatura, o anestésico local recomendado à paciente gestante é a lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 ou com noradrenalina 1:50.000, respeitando-se o limite máximo de dois tubetes anestésicos. Portanto, desde que os procedimentos anestésicos sejam corretamente selecionados e realizados, não geram quaisquer males ao feto, sobretudo quando executados no período gestacional ideal.

A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE PARA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA

RODRIGUES, Denise Santana Gomes*; JUNIOR, Renato Veloso Costa; BORGES, Michael Rubens Ferreira; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: renato.junior05@hotmail.com

Geralmente o que leva o paciente à consulta é o aparecimento de algum indício de dor ou doença. Caberá ao Cirurgião Dentista por meio da anamnese e pelo exame clínico, a obtenção do maior número de dados possíveis para compor seu diagnóstico (conjunto de sinais e sintomas clínicos que quando aparecem em um paciente, indicam a presença de uma determinada doença). A responsabilidade do cirurgião-dentista consiste, portanto, na busca de um diagnóstico preciso e correto ao seu paciente de forma que garanta a ele a possibilidade do tratamento. O termo anamnese é de origem grega e significa recordar. Clinicamente deve ser entendido como a história evolutiva da doença, desde suas manifestações iniciais de uma doença até o estágio de evolução do momento do exame. É necessário que haja uma comunicação agradável e tranqüila entre o paciente e o cirurgião-dentista de forma que o diagnóstico da doença seja totalmente esclarecida e tratável da melhor forma possível. A finalidade da anamnese está voltada para a obtenção de todas as informações, presentes e passadas, que possam ser úteis na elaboração do diagnóstico, prognóstico, e principalmente para saber o planejamento terapêutico correto que deve ser usado pelo paciente.

A IMPORTÂNCIA DA ANATOMIA CIRÚRGICA NOS ACESSOS DE TRAUMA MANDIBULAR

LIMEIRA, Herick Cruz*; FAUSTO, Brenda Pereira; ARAUJO, Leanderson Cutrim; OLIVEIRA, Italo Afonso Siqueira; SILVA, Talyne Grayce Cunha; MACIEL, Francisco Jose Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Email: herickcruz@gmail.com

A cirurgia na região de trauma mandibular depende do acesso adequado e da sua exposição, no qual, é simplificada e executada prontamente quando as partes envolvidas são suficientemente expostas. Nesse caso, se faz necessário um conhecimento anatômico da região levando em consideração a presença de músculos, ramos do nervo facial e mandibular, artérias e ligamentos para que tais pontos e estruturas não venham a ser danificadas. Em cirurgias faciais leva em consideração o fator estético devido a possibilidade de criação de uma deformidade, em que, as incisões serão realizadas em áreas escondidas, sendo em algumas vezes distantes do esqueleto ósseo subjacente da onde a cirurgia é realizada. Em resposta ao traumatismo, a

mandíbula distribui a força de impacto por todo seu comprimento. Todavia, ela não possui uma curva suave do osso uniforme, mas sim descontinuidades como forames, curvaturas agudas, bordas alveolares e regiões com secção transversal diminuída. Diante disso, tem-se as abordagens extra e intra-bucais empregadas no tratamento das fraturas da região mandibular. Na abordagem intra-bucal é utilizada no tratamento de fraturas sinfisiárias, fraturas do corpo e do ângulo simples, e fraturas subcondilares baixas sem deslocamento significantes. Já a abordagem extra bucal é quando os acessos intra-bucais não são favoráveis ao reparo e a cobertura tecidual do foco frutuário e em fraturas que exijam placas de reconstrução. O enfoque deste trabalho será uma revisão de literatura das fraturas mandibulares de acordo com as diferentes vias de acesso que devem ter o seu tratamento bem direcionado, afim de promover o reparo e o restabelecimento da função.

A IMPORTANCIA DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA EM CLÍNICAS DE AUDIOLOGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RODRIGUES, Tuane Moraes*; SANTOS, Leidiane Lisboa; SILVA, Ianne Melo; CALDAS, Erica Alessandra.

Curso: Fonoaudiologia

Email: tuannemorais.rd@hotmail.com

O controle de infecção é um problema de Saúde Pública que afeta muitas facetas da prática clínica de forma geral, assim os fonoaudiólogos devem ser diligentes em seu esforço para controlar a propagação de doenças infecciosas nesse ambiente. Objetivo: Ressaltar a importância da aplicação das normas de biossegurança em clínicas de audiologia, sugeridas na literatura, contribuindo assim no controle de infecção na prática audiologia clínica. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, com análise de periódicos pertinentes ao assunto abordado, acessados eletronicamente em bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e Scielo, assim como livros e dissertações. Foram analisados estudos com data de publicação compreendida entre o período de 2000 a 2016. Conclusão: As medidas preventivas apresentadas podem ser consideradas e viabilizadas nas clínicas de fonoaudiologia, nas quais a atuação em audiologia se faz presente e que devido a isso, impele medidas de precauções específicas como: uso de jalecos, luvas, higienização do local, das mãos e material utilizado, sugerindo uso de olivas descartáveis à natureza dos exames audiológicos.

A PSICANÁLISE REALIZADA EM LIBRAS

DE OLIVEIRA, Samuel Jordão Santos*, HALABE, Dannilo J. E.

Curso: Psicologia

Email: samueljo40@gmail.com

O atendimento psicanalítico pressupõe a interação entre o analista e o paciente através de um canal de comunicação em que o método da associação possa advir. Analisando os casos na literatura especializada de pacientes com surdez total, que utilizam a leitura orofacial, a língua brasileira de sinais (LIBRAS) e a fala para se comunicar, percebemos que os analistas se apoiam na linguagem oral para realizar o atendimento. Na contramão deste movimento, este artigo apoia-se nos elementos iniciais do projeto de pesquisa exploratória realizada pelo Grupo Psicanálise e Surdez da Universidade CEUMA para mostrar a importância da análise com os surdos ser realizada em LIBRAS. Para estes sujeitos a linguagem gestual possibilita uma melhor expressão de seus sentimentos, sendo mais natural para eles e comportando toda expressão de gírias, metáforas e chistes, tais quais o português falado. A pesquisa está no estágio de levantamento das referências bibliográficas e preparação para os atendimentos em LIBRAS. Este artigo avaliará os casos atendidos por psicanalistas de pacientes surdos, revelando as estratégias e as problemáticas enfrentadas pelos analistas, confrontando com o discurso dos surdos sobre a sua cultura, incluindo a importância que é dada a LIBRAS.

AS DISFUNÇÕES SEXUAIS NAS RELAÇÕES CONJUGAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

RAMOS, Silvia Byanca Silva; LEITE, Stênio Guilherme Ribeiro; SOUSA, Neusa Tamires Silva; PEREIRA, Vanessa Bárbara Sousa; PEREIRA, João Filho Gomes; FONSECA Cristiane Costa

Curso: psicologia

Email: stenioguilherme29@gmail.com

Resumo : O objetivo deste estudo foi caracterizar as principais publicações registradas entre o período de 2000 e 2015, abordando a disfunções sexuais em um contexto conjugal. Trata-se de uma pesquisa que visa apresentar de forma sistemática como vem sendo abordado o referido assunto pela Ciência Psicologia, e o que ela tem a oferecer como alternativa de tratamento. Os descritores de busca utilizados foram: Bireme, Pepsic, Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências de Saúde) e Google Acadêmico. Foram analisadas 25 publicações, como resultado dos descritores “Disfunção sexual” “Disfunção sexual Psicoterapia”, “Terapia de casal disfunção sexual”. Nas análises realizadas, constatou-se uma escassa publicação sobre o tema na Psicologia. Observou-se a preferência pelo método qualitativo nas pesquisas, e as entrevistas e questionários os mais utilizados para obtenção de dados. As disfunções sexuais masculinas foram as mais trabalhadas, destacando a disfunção erétil e ejaculação precoce. Em termo de referencial teórico, a

Fenomenologia, Gestalt, Análise Comportamental e Psicanálise foram as mais encontradas. Houve publicações que associaram as disfunções sexuais a fatores como depressão e ansiedade. Foram encontrados apenas 2 (dois) estudos voltado para o casal com disfunção sexual. Diante dos resultados apresentados, pôde-se afirmar que o cenário de pesquisas sobre disfunções sexuais na área da Psicologia ainda precisa evoluir, para que seja possível compreender de forma mais abrangente essa temática. É necessário ampliar o foco das investigações, procurando compreender os problemas sexuais não somente em um contexto patológico, mas também social e sendo colocado em uma relação conjugal.

“ABCDE” DO TRAUMA

SILVA, Natyla Maysa de Lima*; GASSMANN, Hildenesa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Email: nathymaysa@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

O trauma é a primeira causa de morte entre crianças, adolescentes e adultos jovens, tais mortes podem ser imediatas, precoces e tardias ao trauma sofrido e 70% dos pacientes que vem ao óbito nas primeiras duas horas é devido a não haver uma abordagem correta ao paciente. Dessa forma conhecer o “ABCDE” do trauma, que se refere a esta avaliação inicial é de suma importância, sendo que A significa verificar as vias aéreas, B é o boca-boca, onde se verifica a respiração, C significa verificar a circulação, D que é o déficit neurológico onde se classifica o nível de consciência e E, onde temos exposição do paciente com controle de temperatura. Portanto somente após uma correta avaliação é que teremos uma correta conduta tomada, pois é na mesma que vai se definir o que irá se fazer inicialmente no paciente, pois o mesmo ao ser vítima de traumas, necessita de cuidados imediatos com condutas adequadas.

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA E PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE: PERSPECTIVAS DO PSICÓLOGO

COSTA, Thaissa Araujo*; LIMA, Rusiane Brito Lima; MENDES, Vanessa Helena Leite; VIANA, Otavio Welligton Rodrigues; DA SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; LEITE, Zinole Helena Martins; DE OLIEVIRA, Thelma Mary Araujo

Email: rusianebrito@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: A Insuficiência Renal Crônica é uma doença que gera nos pacientes sentimento de perda, incapacidade, limitação alterando de forma significativa sua rotina devido ao tratamento por hemodiálise. A maior incidência desta doença é em pessoas do sexo masculino, na faixa

etária de 19 a 64 anos, com nível de escolaridade básica (ensino fundamental) e renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. Esta pesquisa objetiva descrever as contribuições do profissional de psicologia para o enfrentamento dos fatores psicossociais verificados em pacientes com IRC em tratamento com hemodiálise. A pesquisa teve como referencial teórico a abordagem centrada na Pessoa. Para sua realização foram consideradas publicações diversas como livros, monografias, teses e 49 artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO, Biblioteca Virtual de Saúde através das palavras chaves Insuficiência renal crônica, Psicologia, Abordagem Centrada na Pessoa, Hemodiálise. Revisão. O desenvolvimento de uma doença crônica, como a insuficiência renal, gera incapacidades, deterioração, redução de competências, dor física e emocional, resultantes da perda da independência e do aumento da necessidade de ajuda. A adesão ao tratamento é tarefa difícil para o paciente e seus familiares. Conclusão A abordagem rogeriana concebe o paciente dentro de sua totalidade. Dentre as intervenções do psicólogo com este cliente, citam-se: promover a reestruturação psíquica, favorecer adesão ao tratamento e oferecer apoio no enfrentamento dos aspectos psicossociais do adoecimento. Palavras-chave: Insuficiência renal crônica, Psicologia, Abordagem Centrada na Pessoa, Hemodiálise

ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA E PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE: perspectivas e intervenção do psicólogo

COSTA, Thaissa Araujo*; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SAMPAIO, Karen Silva; SILVA, Yanlessa de Jesus David; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo; LEITE, Zinole Helena Martins; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: patriciamary2011@live.com

A Insuficiência Renal Crônica é uma doença que gera nos pacientes sentimento de perda, incapacidade, limitação alterando de forma significativa sua rotina devido ao tratamento por hemodiálise. A maior incidência desta doença é em pessoas do sexo masculino, na faixa etária de 19 a 64 anos, com nível de escolaridade básica (ensino fundamental) e renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. Esta pesquisa objetiva descrever as contribuições do profissional de psicologia para o enfrentamento dos fatores psicossociais verificados em pacientes com IRC em tratamento com hemodiálise. A pesquisa teve como referencial teórico a abordagem centrada na Pessoa. Para sua realização foram consideradas publicações diversas como livros, monografias, teses e 49 artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO, Biblioteca Virtual de Saúde através das palavras chaves Insuficiência renal crônica, Psicologia, Abordagem Centrada na Pessoa, Hemodiálise. Revisão. O desenvolvimento de uma doença crônica, como a insuficiência renal, gera incapacidades, deterioração, redução de competências, dor física e

emocional, resultantes da perda da independência e do aumento da necessidade de ajuda. A adesão ao tratamento é tarefa difícil para o paciente e seus familiares. Conclusão A abordagem rogeriana concebe o paciente dentro de sua totalidade. Dentre as intervenções do psicólogo com este cliente, citam-se: promover a reestruturação psíquica, favorecer adesão ao tratamento e oferecer apoio no enfrentamento dos aspectos psicossociais do adoecimento.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DO PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM ODONTOLOGIA

GUILHERME, Hudson Guterres*; COELHO, Luciano André da Silva; SILVA, Talyne Grayce Cunha; SOUSA, Andressa Alyson Ferreira; ARAUJO, Ana Lourdes Diniz; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: hudsonguterres@live.com

Devido a vulnerabilidade do paciente com necessidades especiais, são necessárias certas condutas durante o ato do diagnóstico para que se tenha êxito no procedimento, visando o bem-estar do mesmo, garantindo-lhe qualidade em sua saúde bucal. Para isso, é preciso que o profissional conheça as limitações do seu paciente, para traçar planos de ação que sejam eficientes, e se adequem à situação. Portanto, é necessário que seja feita a avaliação do paciente durante as três fases do diagnóstico (prevenção, tratamento e acompanhamento) a fim de se tomar conhecimento das condições geral, bucal e comportamental, aliado a um trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Uma vez que não se deve limitar o paciente à cavidade bucal, mas examiná-lo de forma integral. Assim, serão envolvidos também outros profissionais responsáveis pela saúde do paciente especial, como o médico, capaz de fornecer o diagnóstico da condição sistêmica do portador de necessidades especiais através de um laudo. Já o ambiente odontológico deve se adaptar ao paciente, equipado com os materiais necessários para o atendimento adequado, evitando consultas de longa duração, a fim de evitar desgaste físico e alterações de humor. O Cirurgião-dentista deve manter-se profissional, transmitindo segurança ao paciente, a fim de conquistar sua confiança. Vale ressaltar que não existe uma conduta única a ser seguida para todos pacientes e sim que o tratamento deve ser planejado de forma individual, sendo feita uma abordagem adequada às diferentes faixas etárias e aos problemas que estes pacientes possuem.

ABSCESSOS DENTÁRIOS

GOMES, Silvenice Medeiros*; GUTERRES, Laysa Vitória de Araújo; SOUZA, Brígida Valéria Rodrigues; MARQUES, Deyse de Sousa; LIMA, Andreia Beatriz Maximo; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima.

Curso: Odontologia

Email: silvenicem@gmail.com

A inflamação supurativa contém grande quantidade de exsudato contendo neutrófilos, células necróticas e edema. Essas características dão forma a vários tipos de doenças bucofaciais, como os abscessos dentários, que se originam de uma infecção intensa dos tecidos pelas bactérias piogênicas. Dentre os quais destacam-se os abscessos periodontais, gengivais e periapicais; que se diferenciam em relação a sua localização, tecidos envolvidos e perda de inserção periodontal. Podem ser tratado por antibióticos, anti-inflamatórios, higiene bucal, drenagem, tratamento endodôntico (se houver invasão de cárie na polpa) e tratamento periodontal (se as bactérias penetrarem entre os dentes e a gengiva), além do acompanhamento do paciente. O objetivo deste trabalho é apresentar o diagnóstico diferencial, as consequências e o tratamento envolvendo processos purulentos bucofaciais através da revisão de literatura, assim como identificar sua importância para o profissional em formação. Conclui-se que é necessário que o profissional de odontologia tenha conhecimento das diferentes características que cada doença, envolvendo exsudato, pode apresentar e ser capaz de prestar auxílio no processo de diagnóstico, tratamento, processos cirúrgicos e demais aperfeiçoamentos.

ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO I E II

SANTOS, Leidiane Lisboa dos Santos*; RODRIGUES, Tuanne Moraes; DA SILVA, Ianne Melo; AMORIM, Camila Malcher Teixeira.

Email: lidy.lis18@gmail.com

Área/Especialidade: Fonoaudiologia

ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO I E II

ADOÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NAS PRÁTICAS CLÍNICAS POR CIRURGIÕES-DENTISTAS.

SILVA, Rayane Sodrê Marques Mapurunga e *; ANDRADE, Camila Menezes; MADEIRA, Paloma Raissa da Silva; MARAVALHA, Tayara Lima; SANTOS, Amanda Morgana Mesquita; LEAL, Adriana Mara Araújo; CARNEIRO, Karina Gama Kato.

Email: rayanemapurunga@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A higienização das mãos contribui de forma significativa nas atividades clínicas da odontologia e nas demais áreas de saúde, auxiliando na prevenção de infecções. As mãos configuram um meio de contaminação e transmissão de doenças que passa despercebido, pois a pele possui microrganismos naturais em equilíbrio e transitórios, que podem ser transferidos de uma superfície a outra, por isso a necessidade da higiene de forma adequada, impedindo transtornos futuros em vários níveis. A execução desta ação é simples, com o uso de água e sabão pode-se obter uma redução da sujidade, suor, partículas de poeira, células descamativas dentre outras no uso diário e em qualquer outra tarefa, porém existem outras técnicas disponíveis para o uso profissional em que há uma exigência da assepsia, tais como higienização antisséptica, fricção de antisséptico, antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório. Em termos gerais, a importância deste ato confere multibenefícios a saúde evitando transmissão de patógenos, equilíbrio e bem-estar tanto para o profissional quanto para o paciente. Concluímos que a biossegurança nas práticas de odontologia, em especial a higienização das mãos, desempenha uma função protetora aos usuários, possui baixo custo, por tanto acessível, e diminui a transferência de germes de uma superfície a outra promovendo saúde ao realizar os trabalhos odontológicos.

ADULTIZAÇÃO E EROTIZAÇÃO PRECOCE: UMA ANÁLISE SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NOS ANOS 2000.

CARDOSO, Juliane*; PEREIRA, Karine Silva; MENESES, Renata Gonçalves; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Email: meneses.renata@gmail.com

Curso: Psicologia

A Adultização e erotização precoce são fenômenos emergentes, tal comportamento pode ser explicado pela forma como a sociedade passou a enxergar a criança, de forma ambígua e de certa forma contraditória, pois hora ela é vista como um pequeno adulto com alto poder de consumo e que pode tomar suas próprias decisões, e hora ela é vista como um ser que não tem conhecimento do que se passa a seu redor, sendo assim exposta a receber passivamente informações que não são adequadas para a sua idade. O objetivo será de analisar o fenômeno da adultização e erotização de crianças a partir dos anos 2000 identificando quais fatores culturais e sociais contribuíram para tal fenômeno. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter descritivo, utilizando textos, publicações e artigos disponíveis nos bancos de dados da SCIELO e no buscador google. Foram utilizados 25 trabalhos publicados no período de 2000 a 2015. As marcas da adultização e erotização precoce perpassam o desenvolvimento natural da criança, a impede de viver os fenômenos próprios da infância, traz

a gravidez na adolescência, incentiva a pedofilia entre outros, tendo em vista que a criança ainda não está preparada para lidar com estímulos recebidos que ainda não são próprios a sua faixa etária. O estudo mostrou fatores importantes que influenciam esses processos na vida infantil: a mídia e a família, entendendo também que as mudanças culturais e sociais afetaram o comportamento de adultos em relação às crianças e como consequência das crianças frente a sociedade.

AIDS, INTERDISCIPLINARIEDADE E QUALIDADE DE VIDA

MENDES, Vanessa Helena Leite*; OLIVEIRA, Thaynara Araujo; SAMPAIO, Karen Silva; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; LIMA, Rusiane Brito; LEITE, Zinole Helena Martins; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) representa um problema de saúde pública mundial dado o quadro de crescimento alarmante em que se encontra e também ao número de pessoas que morrem em função de aspectos relacionados a esta doença. Objetiva-se com este estudo bibliográfico e descritivo refletir sobre a importância de uma abordagem interdisciplinar no atendimento às pessoas com AIDS. Para a sua realização foram analisadas obras diversas sobre a temática bem como 20 artigos disponíveis nas bases de dados virtuais (Biblioteca Virtual de Saúde) no período de 2000 a 2015 utilizando-se como palavras chaves : AIDS, Interdisciplinariedade e Qualidade de Vida . Revisão: O diagnóstico da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida comumente vem acompanhado de sentimentos relativos à perdas ; os quais tem uma repercussão nas várias esferas da vida do pessoa acometida por esta doença. Somam-se a isso, inúmeros tabus , estigmas , preconceitos relativos à doença. Cuidados médicos constantes tendem a melhorar a qualidade de vida deste paciente. Entretanto a dificuldade na adesão ao tratamento por fatores psicossociais , culturais, preconceitos e estigmas compromete sobremaneira a vida do paciente, reafirmando a proximidade com a morte. Os cuidados para com estes pacientes devem levar em conta não somente os avanços clínicos e medicamentosos mas também a intervenção de outros profissionais da equipe de saúde , humanizando a assistência. Conclusão: Perspectivas interdisciplinares na terapia de pacientes com AIDS restituem-lhes condições favoráveis à manutenção da qualidade de vida.

ALIENAÇÃO PARENTAL, CRIME CONTRA A DIGNIDADE HUMANA: perfil dos envolvidos neste processo

SOARES, Juliana Avelar*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; FRANÇA, Celia Cantanhede; BRITO, Antonia Thacyara Dias; COSTA, Bianca Steves Barros; AQUINO, Daiane Rose Cunha Bentivi; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: josylma@hotmail.com

Atualmente, com a mulher fora do cenário doméstico e cada vez mais disputando o mercado de trabalho, as funções de cuidar do lar passaram a serem divididas entre o homem e a mulher. O pai passou a assumir o cuidado com os filhos, e passou a reivindicar a guarda destes, havendo então uma disputa entre os genitores pela guarda dos filhos. Buscou-se descrever o perfil do alienado e do alienador e as atribuições do Psicólogo Jurídico nesse processo, junto a estas famílias. Este estudo consistiu de um levantamento bibliográfico. Utilizou-se para a pesquisa às bases bvs- psi, capes e no buscador google acadêmico. Observou-se o alienador apresenta diversos comportamentos como excessivo ciúme, inveja, ódio, destruição do outro genitor, a superproteção dos filhos, raiva entre outros. A vítima alienada passa a desenvolver sentimentos aversivos pelo genitor que não detém a guarda apresentam um perfil de autodefesa, negam o conflito. Compreende - se neste estudo que a alienação parental é uma forma de abuso e que traz muitas consequências em todos os âmbitos para os que estão envolvidos principalmente os filhos.

ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM USUÁRIOS DA MACONHA

DE OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes*; FONSECA, Jéssica Silva; BRANDÃO JÚNIOR, Edimilson da Silva; DINIZ, Juliana Pinheiro; DUTRA, Grazielle Caldas; ALVES, Cândida Helena Lopes

Categoria: Graduação

Curso: Psicologia

Email: alessandra.oliveira06@hotmail.com

Cannabis Sativa é o nome científico da maconha, como é conhecida popularmente no Brasil. O seu preparo é diversificado, sendo assim, possui variações do THC (tetrahydrocannabinol); este conteúdo é psicoativo e estimula alterações tanto no corpo, como na mente do indivíduo, ocorrendo o aumento desse psicoativo na composição da maconha. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, afirma que o crescente interesse dos pesquisadores em relação ao consumo de maconha, ocorreu por causa do aumento de pessoas que utilizam esta droga, inclusive entre adolescentes. Os estudiosos também buscam compreender os efeitos adversos da maconha no organismo. O presente trabalho teve por objetivo elucidar as alterações cognitivas a longo prazo do uso da substância alucinógena. Trata-se de um estudo realizado através de uma revisão bibliográfica, por meio de consultas da base de dados SCIELO,

pesquisa em livros e noutros artigos científicos, publicados entre 2010 e 2016. Foi constatado que a utilização frequente da maconha, pode ocasionar prejuízos de ordem cognitiva em relação às tarefas executivas, habilidades psicomotoras, memória de curto prazo e alterações na atenção. Outros estudos detectaram que o uso prolongado e frequente da maconha gera alterações cognitivas no córtex pré-frontal, aspectos comportamentais, funcionamento executivo e da memória, após um determinado tempo de abstinência. Concluímos através desse estudo que o uso da maconha pode provocar déficits cognitivos em usuários ditos graves e a longo prazo.

ALTERAÇÕES PULPARES: COMO DIAGNOSTICAR?

CRUZ, Ana Julia Da Silva*; FALCAO, Tércia

Email: anajulia_scruz@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A endodontia tem como principal objetivo controlar e prevenir as infecções que acometem a polpa e os tecidos perirradiculares. No tratamento endodôntico, o diagnóstico é o alicerce da sua estrutura. Todo o seu processo engloba uma minuciosa consideração dos critérios subjetivos recolhidos pelo profissional, nomeadamente a história clínica e dentária, assim como os critérios objetivos, tais como: exame clínico de exploração, testes de vitalidade pulpar e meios auxiliares de diagnósticos. Sabe-se que estabelecer um diagnóstico correto é fundamental e decisivo para o sucesso do tratamento endodôntico, permitindo uma conduta terapêutica adequada. O diagnóstico representa a base para a estruturação do tratamento, sobretudo quando a queixa principal do paciente relaciona-se à dor de origem odontogênica. O grande desafio ao se reconhecer o fator etiológico responsável pelo processo de dor nas estruturas bucais, distingue a etapa de diagnóstico como fundamental e inigualável no contexto do tratamento odontológico. A capacidade de se estabelecer um diagnóstico endodôntico correto é decisivo, criando responsabilidade ao cirurgião-dentista pelo sucesso na etapa inicial do tratamento. Assim sendo, esta fase apresenta inúmeras situações adversas relacionadas não somente com as alterações fisiopatológicas, mas também à manifestação do mecanismo da dor, fatores condicionados à idade do paciente, à intensidade e frequência do dano pulpar, entre outros.

ALTERAÇÕES NUTRICIONAIS E METABÓLICAS DE USUÁRIOS DE CRACK ANTES E DEPOIS DA REABILITAÇÃO

PONTES, Kamylla Karolynne Bezerra*; SOARES, Ester Barbosa; PEREIRA, Jessica Bianca Passos; CARVALHO, Carolina Abreu; SILVA, Eliziane Gomes da Costa Moura; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu; CARVALHO, Wyllyane Rayana Chaves

Curso: Nutrição

Email: myllakarol@hotmail.com

O crescimento do consumo de crack é preocupante nos grandes centros urbanos, tornando-se problema de saúde pública. O crack é uma substância de absorção rápida, ocasiona diversas transformações como euforia, depressão e falta de apetite. Essa substância tem efeitos irritativos, vasoconstritores e ocasiona lesões no trato gastrointestinal superior além da desnutrição, e está vinculada ao alto índice de violência. **OBJETIVO:** Identificar alterações nutricionais e metabólicas dos usuários de crack antes e depois da reabilitação. **METODOLOGIA:** Revisão de literatura a qual foram utilizados artigos dos últimos 10 anos, disponíveis na Scielo e Google acadêmico. As publicações foram definidas a partir da análise dos descritores: crack, alterações metabólicas e estado nutricional. **RESULTADOS:** Os usuários possuem diagnóstico de desnutrição antes do tratamento decorrente da falta de apetite. Verificou-se alterações hepáticas e renais, danos neurológicos e intoxicação. Quando estão sob efeito da droga a alimentação é irregular ficando muitas vezes sem se alimentar, e quando estão em abstinência correm o risco de ter fome oculta devido ao consumo de alimentos calóricos e pobres em nutrientes. Entretanto, durante e após o processo de reabilitação encontram-se com excesso de peso devido a ansiedade, possivelmente pela abstinência da droga. **CONCLUSÃO:** O uso do crack provoca inúmeros prejuízos nutricionais e metabólicos aos usuários, pois ficam debilitados e a desnutrição é visível. Porém, na reabilitação o indivíduo tem mudanças corporais refletindo no ganho de peso. Ressaltando a necessidade da atuação do nutricionista no tratamento para desenvolver a educação nutricional o que contemplará mudanças na saúde dessas pessoas.

ANÁLISE DA PRECISÃO DE BRAQUETES AUTOLIGADOS

PINA, Gabriella Maria Martins Rendeiro*; SOUSA, Vinícios Coelho; ERDURAN, Rackel Hatice Milhomens Gualberto.

Curso: Odontologia

Email: gabriella.pina@hotmail.com.br

O objetivo do trabalho foi avaliar a concordância em relação aos valores definidos pela respectiva prescrição quanto a precisão do torque, paralelismo das paredes internas e altura das canaletas dos braquetes autoligados de oito marcas comerciais. Ao comparar os valores (do torque, do paralelismo entre as paredes internas e da altura das canaletas) das oito marcas, observou-se grande variabilidade de resultados quanto a todas as variáveis analisadas.

ANÁLISES CRONOMÉTRICAS DAS PROVAS DE NATAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO 2016

JÚNIOR, Fernando César Pestana Trovão*; FONTOURA, Gustavo Monteiro; BARBOZA, Nayana Maria Lopes dos Reis; DOS ANJOS, Natalia Nascimento; SOARES, Gleice Kerli Barros; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes; DA CUNHA, Marcio Luis Araújo

Email: l.alexnunes@hotmail.com

Curso: Educação Física

Resumo: O desempenho na natação está relacionado ao cumprimento de uma certa distância num determinado tempo. O objetivo desta pesquisa foi analisar os tempos parciais e finais das provas de 100 metros da natação e identificar o comportamento dos parâmetros temporais para servir como referência de treinamento para os atletas jovens. Foram analisadas as quatro técnicas em ambos os sexos, fazendo parte da amostra 64 atletas. É um estudo do tipo descritivo, na categoria revisão de literatura. Os dados foram coletados na página oficial dos Jogos Olímpicos na internet. A análise foi realizada com a utilização do Microsoft Excel e do programa BioEstat 5.3. Os resultados demonstraram que é na técnica de costas que os nadadores finalizam o percurso com os tempos mais próximos da primeira metade da prova para ambos os sexos ($1,54s \pm 0,03$), provavelmente pelo fato de que o início da prova é realizado de dentro da piscina. Quando comparados os sexos, os homens cumprem a segunda metade do percurso mais rápido que as mulheres em todas os estilos da natação, o que pode estar relacionado a uma maior resistência anaeróbia, provavelmente a uma mais elevada capacidade de tolerância ao lactato.

APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA PUNICA GRANATUM L, UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

MOREIRA, Watna Sales*; GONÇALVES, Jaciara Sá; BARROS, Thayná Fernandes; FIGUEIREDO, ISABELLA FERNANDES DA Silva; DOURADO, Ádylla Wilenna Alves; PINHEIRO, Aruanã Joaquim Matheus Costa Rodrigues

Curso: Farmácia

Email: watnasale@gmail.com

O uso de plantas medicinais tem ampla aceitação popular e apoio da Organização Mundial de Saúde, incentivando pesquisas científicas. Trata-se de uma terapia alternativa e vem sendo utilizada para o combate a doenças pelo seu baixo custo e fácil acesso. Dentre as plantas com potencial medicinal destaca-se a Punica granatum L. (Romã). Marques et al (2016) observaram uma atividade anti-inflamatória das folhas da Romã pela redução na dosagem de TNF- α e da contagem de leucócitos em ratos induzidos por peritonite. Michelin et al. (2005), observaram que o extrato das folhas de P. granatum L. inibiu o crescimento de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter sp. Sobre atividade clínica na odontologia, Pereira et al. (2006) verificou que o extrato da romã foi efetivo frente as bactérias Streptococcus mitis, Streptococcus

mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus sobrinus e Lactobacillus casei, inibindo a produção de biofilme dental. Das et al. (2001) avaliaram a atividade hipoglicemiante do extrato metanólico da semente de P. granatum em ratos diabéticos induzidos por streptozocina e observaram a redução significativa nos níveis sanguíneos de glicose dos animais tratados com o extrato. Kelawara & Ananthanarayan (2004), em ensaio in vitro, avaliaram a oxidação do ácido linoleico, observando que a casca pulverizada da romã obteve a maior atividade antioxidante. Kohno et al. (2004) observaram que o óleo da semente da romã inibiu a carcinogênese induzida por azoximetano via subcutânea em cólon de ratos. Assim, pode-se concluir que a literatura aponta a P. granatum como uma planta com grande potencial terapêutico contra várias doenças.

APROXIMAÇÕES ENTRE HIPNOSE E PSICOLOGIA POSITIVA

BEZERRA, João Alex Marques*; LIMA, Ana Beatriz Rocha.

Email: arcanjoj@hotmail.com

Curso: Psicologia

A Hipnose consiste em antiga tecnologia humana de notório valor histórico, técnico e científico cujo principal fundamento reside em sugestionamento empático, proporcionando ao cliente o alcance de estados alterados de consciência a partir do rebaixamento do próprio nível crítico, favorecendo auto estruturas cognitivas, bem como alterações psicossomáticas. A Psicologia Positiva pode ser definida como um estudo científico dos potenciais humanos, forças e virtudes que habilitam aos indivíduos e comunidades a prosperar, podendo também ser descrita como um termo abrangente relativo ao estudos das emoções e características positivas, permitindo instituir parâmetros a partir destes traços. No contexto de relacionamento terapêutico além do emprego de qualquer técnica contam-se com variáveis contextuais, relacionadas a itens como empatia, legitimidade, sintonia, expectativas, nível da demanda, dentre outros aspectos relacionados. Neste sentido, existe comprovado valor na estruturação dos aprendizados experienciais, sendo esta a janela onde a hipnose se encaixa de modo consistente ao possibilitar a construção de contextos terapêuticos favoráveis à associação de variáveis complexas. Dai o valor da utilização conjunta destas estratégias consistir no uso da hipnose como recurso da “semeadura positiva”, a partir da qual serão estimulados anseios, cujas respostas eclodirão gradativamente a partir da absorção focal de novas imagens mentais e ideias associadas à psicologia positiva. Outros construtos como à dinâmica dos processos atencionais, o potencial de sugestão, contextualização para suporte de exercícios, ampliação de percepções de caráter favorecem a integração da hipnose a esta promissora abordagem denominada Psicologia Positiva.

ASFIXIA NEONATAL: REVISÃO DE LITERATURA

CUTRIM, Lucelia Barros*;DOS SANTOS, Hellen Di Paulla Correa; DE ARAÚJO, Antonio Alves; SANTOS, Diego Romulo Francisco de Assis Vieira; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: luceliamuiraquita@hotmail.com

A asfixia neonatal é uma condição de sofrimento fetal agudo que se desenvolve quando há hipoperfusão tecidual significativa, diminuição da oferta de oxigênio, aumento de dióxido de carbono e diminuição do pH. Este trabalho tem por objetivo analisar as principais causas responsáveis por asfixia neonatal. Foi realizado na Universidade Ceuma, na Biblioteca Presidente José Sarney, São Luís – MA, de fevereiro a novembro de 2012. Foram utilizados na pesquisa dezesseis livros do acervo bibliográfico, edições 2000 – 2011 e seis artigos retirados de sites da web, através do banco de dados Scielo. Caracteriza-se como uma revisão de literatura com abordagem qualitativa. O estudo mostra que a taxa de mortalidade dos recém-nascidos asfixiados e que desenvolvem encefalopatia varia de 15 a 25%, e está relacionada com a idade gestacional e o peso ao nascer. 90% dos eventos de asfixia ocorrem no período anteparto ou intraparto em decorrência de comprometimento da troca gasosa através da placenta, levando o feto a hipoxemia, hipercapnia e acidose. Deve-se dar imediata assistência logo na sala de parto como cuidados com ventilação, perfusão, temperatura, correção dos distúrbios metabólicos e eletrolíticos, e controle das crises convulsivas. A maior parte dos sobreviventes da asfixia neonatal não apresentam sequelas maiores, porém o prognóstico de infantes com longo período de asfixia e desenvolvimento de encefalopatia hipóxico-isquêmica grave é sombrio.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE HISTATINA-5 CONTRA CÉLULAS PLANCTÔNICAS DE CANDIDA ALBICANS

COSTA, Paola Caroline da Silva*; FERRO, Amanda Costa; MOFFA, Eduardo Buozi; MONTEIRO, Cristina de Andrade

Curso: Odontologia

Email: paolacosta18@gmail.com

O uso indiscriminado de agentes antifúngicos , tópicos e sistêmicos, para o tratamento convencional da candidíase oral culminou na seleção de cepas resistentes. Dessa forma, o desenvolvimento de terapias alternativas em substituição a terapêutica convencional se faz importante e necessária. A Histatina-5 (HST-5) é uma proteína salivar presente em humanos que apresenta propriedades antifúngicas, uma vez que é extremamente rica em aminoácidos específicos, que são carregadas positivamente a pH fisiológico, inibindo assim a formação de

biofilme. Este estudo avaliou a atividade antimicrobiana de uma solução de HST-5 contra *C. albicans* (ATCC 90028). A HST-5 foi sintetizada e sua atividade antimicrobiana foi avaliada pela concentração inibitória mínima (CIM) sobre células planctônicas. Os valores CIM foram determinados por incubação dos microrganismos em placas de 96 orifícios durante 48 horas a 37°C, expostos a diluição seriada da solução de HST-5. O valor da CIM foi definida como a concentração da solução de HST-5 que apresentou maior efeito inibitório no crescimento da *C. albicans*. Para estabelecer os valores de CIM, alíquotas de cada orifícios foram removidas e inoculadas em Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Após 48 h de incubação a 37°C, as unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL) foram calculadas. A maior atividade antifúngica contra *C. albicans* foi obtida com a concentração de 67,7 mM de HST-5. Os dados demonstraram que a HST-5 sintetizada poderia ser uma alternativa viável no desenvolvimento de um novo agente antifúngico contra *C. albicans*.

ATIVIDADE INIBITÓRIA DE PROTEÍNAS SALIVARES SOBRE A FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE CÁLCIO E FOSFATO

FERRO, Amanda Costa; COSTA, Paola Caroline Da Silva; MOFFA, Eduardo Buozi; MONTEIRO, Cristina De Andrade

Curso: Odontologia

Email: a.ferro1604@gmail.com

A saliva é um fluido com uma mistura complexa de constituintes orgânicos e inorgânicos. A regulação do processo de biomineralização do esmalte é devida em parte às proteínas salivares que se ligam ao esmalte, formando uma estrutura importante presente na cavidade oral denominada Película Adquirida (PAE). A Estaterina é a proteína salivar com maior potencial de inibição da precipitação de fosfato de cálcio e, assim, acredita-se ser a principal proteína relacionada com a manutenção da saliva num estado supersaturado. No presente estudo, avalia-se a capacidade de um dímero fosforilado da Histatina 5, em inibir o crescimento dos cristais HA in vitro. Para a realização do ensaio, uma placa de microtitulação de 96 orifícios foi revestida com 80 uL dos peptídeos. Consecutivamente, foi realizada a formação dos cristais de HA seguindo o protocolo de Siqueira et. al 2015. A utilização dos peptídeos fosforilados derivado da Histatina 5 apresentou atividade moduladora 20% maior na formação dos cristais de cálcio e fosfato. Dessa forma, esses peptídeos mostraram um grande potencial para a formulação de produtos que poderão ser utilizados para a prevenção da desmineralização do esmalte bem como a formação de cálculo dentário, que é um fator precursor no desenvolvimento da doença periodontal

AUTISMO E SEXUALIDADE

DA SILVA, Daurinete Gomes*; REMIGGI; Marina Soares

Curso: Psicologia

Email: daurinetegomes@gmail.com

O Transtorno do Espectro Autista apresenta-se de formas variadas, mas têm características singulares, o autista costuma ter dificuldade de comunicação e grande rejeição ao contato físico e social. A sexualidade é inerente ao ser humano, no autista não é diferente, embora não esteja associada a uma necessidade de relacionar-se com o outro. Este estudo objetiva, a partir de uma revisão de literatura, investigar de que forma a sexualidade é abordada nessa população. Estudos apontam que há uma grande dificuldade em lidar com a sexualidade do autista, pois embora existam muitos estudos acerca do autismo, há um déficit de pesquisas empíricas sobre sexualidade. O autista vivencia a sexualidade de forma diferenciada e geralmente não compreende como ela ocorre devido às dificuldades que possui em conhecer as sensações emitidas naturalmente pelo próprio corpo. As famílias tendem a tratar o autista de forma infantilizada, fator que implica na não aceitação do desenvolvimento e vivência da sexualidade. A falta de conhecimento e orientação fazem com que o autista manifeste comportamentos como toque íntimo e masturbação, inclusive em público. Conclui-se que as estereotípias e os movimentos repetitivos e a deficiência de estudos sobre esta temática dificultam uma aprendizagem de comportamentos adequados. Faz-se necessário a realização de pesquisas que visem melhorar a comunicação verbal e as habilidades sociais dos autistas, podendo assim diminuir o isolamento que lhe é imposto, assim como maior orientação e intervenção psicoterápica e multidisciplinar, envolvendo familiares e o meio social no qual o autista está inserido

ASPECTOS PSICOLÓGICOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ADOÇÃO

SANTOS, Querlenilda Ferreira*; SILVA, Jozielma Bastos; Josiele Dias; SOUZA; SANTOS, Maria da Graça Pereira; CHAVES, Jessica Bastos; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: querle.ferreira@gmail.com

Estudos recentes indicam que a idade da criança está relacionada com a sua chance de ser adotada. O processo de adoção ainda é visto com preconceitos devido a correntes biologicistas, baseadas em um entendimento errôneo acerca da hereditariedade. Sobre este mérito, este trabalho busca descrever a atuação do psicólogo no processo de adoção, bem como, compreender os aspectos psicológicos envolvidos. Trata-se de estudo descritivo de revisão de literatura a partir da leitura de 15 artigos publicados a partir de 2010. Alguns aspectos

psicológicos devem ser verificados como a motivação da adoção, entende-se que o único motivo deva ser em ter a criança como filho no seio familiar. Alguns motivos podem ser apontados como causa da procura pela adoção como: a situações de casais inférteis, quando filho do casal veio a óbito, ainda adoção por caridade, quando famílias adotam apenas para tirar a criança de uma situação de vulnerabilidade social. Cabe ao psicólogo, no combate a toda forma de preconceito e discriminação, compreender e atuar frente à resistência de ser integrado a uma nova família, trabalhar o sofrimento causado na criança pela situação de abandono, trabalhar com as expectativas da criança sobre a nova família e um lugar de cuidado, auxiliando sua compreensão quanto aos limites, regras.

AFLATOXINA: UM RISCO ALIMENTAR EVIDENTE

PEREIRA, Carlos Drielson da Silva*; NUNES, Márcio Anderson Sousa; DA ROCHA, Marla Raquel Pontes

Curso: Biomedicina

Email: drielsonn.sousa@gmail.com

Introdução: Aflatoxina é uma micotoxina produzida por fungos, do gênero *Aspergillus*: *A. flavus*, *A. parasiticus* e *A. nomius*. Muitas das vezes, podendo ser encontrados em alimentos, a toxina quando encontrada em grandes quantidades no corpo humano ou animal podendo provocar doenças como necrose aguda e crônica, cirrose hepática, e carcinoma no fígado. Revisão: Os principais tipos são identificados como B1, B2, G1 e G2. A aflatoxina B1 é uma das mais perigosas, tendo como primeiro alvo de ataque o fígado. Esses fungos e micotoxinas geralmente são encontrados em milho, feijão, amendoim, arroz, trigo, dentre cereais, rações e até no leite de animais. Além de rações e produtos de origem animal quando contaminada. Desde a descoberta, em 1960, diversos países adotaram limites de tolerância para essas toxinas em produtos destinados ao consumo humano. Nos últimos anos, intensas pesquisas contribuíram para melhor caracterizar os possíveis efeitos das aflatoxinas sobre a saúde do homem, destacando-se os experimentos sobre a atividade biológica da AFB1 nas células hepáticas. A melhor forma de prevenção é a utilização de inibidores de crescimentos fungicos em alimento que possa ter grande potencial de infecção. Para o tratamento compreende-se um conjunto de medidas empregadas no tratamento de complicações clínicas associadas à descontaminação, geralmente, é suficiente para a recuperação completa do paciente. Conclusão: A existência de aflatoxinas nos alimentos para consumo humano presume um risco óbvio potencial para a saúde pública. É notório o risco eminente que tanto o ser humano quanto os animais correm ao consumir alimento contaminado.

A IMPORTÂNCIA DA AFERIÇÃO E DO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL NA ODONTOLOGIA

MOREIRA, Falcão Marcela*; DE SANTANA, Yasmim Borges Bringel; DUAILIBE, Silvana Alves de Carvalho

Curso: Odontologia

Email: Yasmin_bringel@outlook.com

A pressão arterial possui uma interrelação fundamental com os procedimentos odontológicos, porque em pacientes com pressão alta ou hipertensão, apesar da cavidade oral estar na periferia do corpo, correm o risco, entre outros, de terem os seu vasos da região com a pressão elevada e, conseqüentemente, o fluxo sanguíneo vai ser aumentado, havendo maior dificuldade de cicatrização. Já nos casos de pressão baixa ou hipotensão, o paciente pode apresentar a mesma por aflição ou até mesmo traumas de procedimentos, ficando, assim, submetido a alterações que podem comprometer a frequência cardíaca e os procedimentos odontológicos necessários. É comum nas duas situações alterações que precisam de um controle frequente durante todo procedimento. Uma pessoa hipertensa pode ter dores no peito, dores de cabeça, tonturas entre os outros sintomas que podem ser identificados pelo cirurgião dentista, assim como a hipotensão também pode apresentar frequência cardíaca irregular, náuseas, visão embaçada, entre outros sintomas. É de responsabilidade do cirurgião dentista aferir a pressão antes de qualquer procedimento, cabendo a ele também monitorar com atenção e regularmente a pressão do paciente, como em procedimentos cirúrgicos ou em procedimentos que possam causar maior desconforto ao paciente. Há varias maneiras de fazer essa monitorização da pressão, sendo o método mais utilizado o esfigmomanômetro com o estetoscópio ou o método digital.

A INFLUÊNCIA DO ACOMPANHANTE SOBRE O COMPORTAMENTO DA CRIANÇA DURENTE O PROCEDIMENTO ODONTOPEDIÁTRICO

CALDAS, Talita Aguiar de Souza*; CARVALHO, Vanessa Cavalcante; VIEIRA, Clarissa Lopes

Curso: Odontologia

Email: Talita 3030@hotmail.com

Um dos maiores desafios para o dentista é o controle das crianças durante o procedimento odontológico. Uma boa parte dessas crianças dificulta o atendimento apresentando comportamentos agressivos, recusa em abrir a boca, choros ou gritos. Nessas situações, é necessária a intervenção do dentista e dos pais. Entretanto, essa intervenção pode refletir diretamente sobre a criança, influenciando-a de maneira positiva ou negativa. A avaliação do comportamento dos pais durante o atendimento é essencial para explicar o comportamento infantil de colaborar ou não com o odontopediatra. Alguns estudos relatam que as crianças

menos colaboradoras estavam acompanhadas por mães que apresentaram maiores indicadores de ansiedade, de estresse e medo durante a consulta. Outros estudos demonstram que as crianças se mostram mais colaboradoras com os pais ausentes da sala. Sabendo-se que a maioria dos pais preferem estar presentes durante a consulta, os mesmos podem receber orientações sobre como agir, recebendo treinamento específico para uma possível intervenção, se necessária, para facilitar a colaboração infantil. Assim, a opinião dos dentistas sobre esse assunto é bastante controversa. O profissional deve analisar os casos individualmente, levando em conta o estado psicológico dos pais e da criança e orientá-los sobre como eles podem agir para facilitar a abordagem e assim determinar se é necessária ou não a presença do acompanhante.

ACIDENTES EM ANESTESIA LOCAL

RAMOS, Lucas Teixeira*; COUTO, Wellington Maciel; MACIEL; Andrezza de Almeida Bastos

Curso: ODONTOLOGIA

Email: priscila_sp_12@hotmail.com

É de grande importância o conhecimento do profissional de Odontologia sobre técnicas anestésicas, bem como causa de acidente que podem ocorrer, para que seja feita uma prevenção, e diante de qualquer desvio do padrão normal, seja realizado o tratamento correto. Vários acidentes potenciais durante o ato cirúrgico estão associados à administração de anestésicos locais, no entanto, esses acidentes que ocorrem localmente na região da punção podem desencadear complicações sistêmicas. Os acidentes locais na prática anestésica odontológica geralmente estão associados ao erro da técnica, fratura de agulha, alergia, dor, ardência, Lesões tecidos moles, neuropraxia e deglutição do líquido anestésico, estes acidentes ocorrem comumente na prática clínica odontológica, e podem ser evitados com o conhecimento correto da técnica e das estruturas anatômicas do sistema estomatognático.

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: desafios e perspectivas

LEITE, Zinole Helena Martins*; DUARTE, Raimundo Nonato Pinheiro; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SILVA, Yanlessa de Jesus David; SAMPAIO, Karen Silva; MENDES, Vanessa Helena Leite; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

A ocorrência do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade(TDAH) tem sido frequente, ocasionando inúmeras implicações na vida das crianças acometidas por este quadro. Buscou-se neste estudo bibliográfico e descritivo caracterizar o TDAH quanto aos seus aspectos clínicos,

sintomatologia, etiologia e tratamento, bem como delimitar os desafios e perspectivas da Terapia Cognitivo Comportamental frente a esses casos. Para a realização desta pesquisa, foram analisadas obras sobre a temática e 20 artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, disponíveis na ABDA (Associação Brasileira do Déficit de Atenção), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Pubmed, através das seguintes palavras-chaves: “ Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade”, “Terapia Cognitivo Comportamental”, “Psicologia”. Revisão: O TDAH como tríade sintomatológica básica impulsividade, desatenção e hiperatividade. Trata-se de um transtorno neurobiológico cuja sintomatologia compromete o desempenho acadêmico e social da criança e do adolescente. O tratamento do TDAH exige uma proposta interdisciplinar e às vezes prescinde do uso de medicamentos. Conclusão: A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) tem se mostrado como uma das mais eficazes intervenções terapêuticas indicadas para o tratamento psicológico deste transtorno. Salienta-se a necessidade de mais pesquisas na área que venham a elucidar aspectos relativos a este transtorno, melhorando a qualidade de vida das pessoas acometidas, uma vez que a mesma não tem cura e pode vir acompanhada de comorbidades.

ATIVIDADES FITOTERÁPICAS DA JANAGUBA: HIMANTHUS SUCUUBA

VIANA, Ana Paula Pereira*; VIANA, Juliane Flávia Cançado

Email: anadevianna@hotmail.com

Curso: Farmácia

Resumo: O conhecimento popular pode originar informações relevantes para pesquisas científicas sobre uso medicinal da planta conhecida como janaguba (*Himatanthus sucuuba*), utilizada empiricamente por comunidades tradicionais, na forma de extrato das cascas do caule e látex para o tratamento de tumores e inflamações (Waltenberger et al., 2011). Ademais, há estudos farmacológicos que demonstraram que os extratos e componentes da *Himatanthus sucuuba* possuem potencial terapêutico (Amaral et al., 2007). Revisão: Atividades, antifúngica, antitumoral, vermífuga e antianêmica da *Himatanthus sucuuba* foram estudadas em experimentos testados contra fungos fitopatogênicos (*Cladoporium sphaerospermu*) utilizando o extrato hexânico das cascas do caule (Silva et al., 1998). Em outro estudo, Amaral e colaboradores (2007) utilizaram o látex (extraído com hexano) da referida espécie para o estudo das atividades anti-inflamatória, antianêmica, fungicida e anticancerígena, onde a fração aquosa foi submetida a análises de cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massa com ionização por “electrospray” resultando no isolamento e purificação das substâncias: iriodóide, desmetilplumierídeo, plumierídeo e isuplumierídeo. Em outro estudo, o plumericin, um inibidor potente da via de NF-kB, isolado das cascas do caule da janaguba, demonstrou

atividade anti-inflamatória in vitro e in vivo (Fakhrudin et. al, 2013). Os artigos comprovam haver uma relevante atividade fitoterapêutica presente na composição química da estrutura da planta janaguba (*Himatanthus sukuuba*), sendo necessário aprofundar a condução de estudos científicos para oficializar o seu potencial terapêutico.

A PERCEPÇÃO DAS GESTANTES SOBRE ATENÇÃO PRÉ-NATAL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PRAZERES, Victória Goretth Pires; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira Passos; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A percepção da gestante com relação à assistência gestacional, quando intercedida por diálogo e respeito entre profissionais de saúde e gestantes, representa o primeiro passo para um parto mais humanizado. O estudo teve por objetivo principal conhecer a percepção das gestantes a respeito da atenção ao pré-natal realizada pelos profissionais de enfermagem em uma UBS no período de novembro de 2015 a março de 2016. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 28 artigos nacionais e que atenderam aos critérios de inclusão e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma português, publicados no período de 2000 a 2015. De acordo com os dados encontrados, percebeu-se que a maioria dos estudos as gestantes que fazem pré natal na UBS estavam na faixa etária de 16 a 21 anos, eram solteiras e possuíam fundamental incompleto. Referente aos dados produtivos das gestantes averiguou-se que a maioria tinha 3 ou mais filhos e nunca tiveram aborto. Em relação às consultas de pré-natal, as pesquisas demonstraram que havia uma média de 1 a 3 consultas, e as gestantes adolescentes, afirmaram ter dificuldades de realizar o pré natal por morar no interior, quanto ao nível de satisfação sobre a assistência de pré-natal houve um emparelhamento nas respostas encontradas nos estudos, entre satisfeitas e insatisfeitas, sendo que as gestantes insatisfeitas, estavam insatisfeitas principalmente com a recepção da unidade.

ADRENOLEUCODISTROFIA

SILVA, Shayanna Sousa*; SILVA, Samila Sousa; DOS SANTOS, Anna Klennya Fontes; MARQUES, Felipe Albuquerque;

Email: shayannasousa@hotmail.com

Área / Especialidade: Farmácia

A adrenoleucodistrofia é uma doença genética rara e progressiva, incluída no grupo das leucodistrofias, com incidência de 1:10.000 indivíduos do sexo masculino, transmitida por mulheres portadoras e que afeta principalmente os homens sendo uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, apresentando-se em fases e faixas etárias diferentes. DESENVOLVIMENTO: A ALD-X é decorrente de um defeito no gene ABCD1 localizado no Xq 28, o qual codifica uma proteína de membrana peroxissomal ALD-P, responsável por transportar os ácidos graxos de cadeia muito longa para dentro dos peroxissomos para degradação. Consequentemente, esses ácidos se acumulam no sangue e tecidos, principalmente na mielina e células do córtex adrenal, podendo levar a um quadro neurodegenerativo. A doença é diagnosticada clinicamente através de sinais e sintomas característicos e com análise laboratorial de sangue específico em que se detecta a quantidade de ácido graxos de cadeia muito longa. O tratamento tem o objetivo de retardar a evolução da doença e se baseia em restrição e suplementação alimentar específica. CONCLUSÃO: Apesar da cura não ser efetiva o tratamento é essencial, pois impede a progressão rápida que após detectada deve-se dar início imediatamente. Também é indicado o acompanhamento através de aconselhamento genético e rastreio para famílias com antecedentes desta patologia, para evitar novos filhos afetados.

ANÁLISE DE EXOMA E SUA APLICAÇÃO NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

CALDAS, Maysa Yzabety da Silva*; NETO, Roberval Nascimento Moraes; NETO, Eduardo Balluz; SOUSA, Roniere Viana; MARQUES, Felipe Albuquerque;

Email: maysacaldas55@gmail.com

Área/Especialidade: Biomedicina

Introdução: Análise de Exoma é a interpretação de dados obtidos a partir do sequenciamento genético molecular de todos os exons conhecidos em determinado organismo. (PROTA et. al., 2015) É uma técnica extremamente eficaz pois pode detectar mutações do tipo SNP (single nucleotide polymorphism) e SNV (single nucleotide variant). (Huyghe, et. Al. 2013). Sendo extremamente útil para diagnosticar de maneira eficiente qualquer doença genética de origem mendeliana, assim como para descobrir e investigar novas mutações e patologias. Revisão: Este artigo de revisão traz um conjunto de informações publicadas por diversos autores a respeito da análise de Exoma e suas aplicações no diagnóstico clínico, tais como a etiologia de deficiência intelectual inespecífica, diversos tipos de carcinoma, acidose tubular renal, homocistinúria, fenilcetonúria, acondroplasia, craniossinostose, assim como algumas síndromes como a Síndrome de Rodrigues e a Síndrome de Nager e diversas má-formações anatômicas de etiologia dificilmente diagnosticadas apenas no exame clínico. Conclusão: A análise de Exoma é uma

importante ferramenta para a obtenção de dados clínicos e para auxílio diagnóstico de diversas patologias, podendo identificar até mesmo doenças cujo gene responsável ainda é desconhecido (MARQUES, 2012) contribuindo com a descoberta de novas mutações. Fornecendo um conjunto de informações moleculares muito amplo, podendo ser útil para definir de maneira precisa um prognóstico adequado para o paciente.

ATENDIMENTO INICIAL AO POLITRAUMATIZADO – ATLS

ARAÚJO, Leanderson Cutrim*; CASTRO, Arthur Amorim; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, FRANCISCO JOSÉ LIMA

Email: leo.cutrim@icloud.com

Área/Especialidade: Odontologia

Sabe-se que no Brasil o trauma já é a segunda maior causa de mortes, com cerca de 130000 mortes/ano, ou seja, 15 mortes por hora. As vítimas de trauma não recebem tratamento definitivo no ambiente pré-hospitalar. A maioria das mortes evitáveis decorre do retardo no início do tratamento cirúrgico. O tratamento dos politraumatizados requer economia de tempo no pré-hospitalar e no transporte do paciente. A “Hora de Ouro” começa no momento em que a vítima se fere e não quando inicia o seu atendimento. Os minutos perdidos antes da chegada do socorro são tão importantes quanto os perdidos por ações desorganizadas durante o atendimento. Para otimização do tempo a avaliação pré-hospitalar da vítima é dividida em três fases: exame primário, exame secundário e reavaliação. O preceito básico do atendimento ao politraumatizado é a avaliação do doente. O objetivo desta avaliação é determinar a condição atual do doente e servir de base para a tomada de decisões em relação ao tratamento e transporte do mesmo. Dessa forma, esse processo de avaliação deve ser realizado de forma sistemática, rápida e organizada. Este trabalho tem como objetivo expor e informar a cerca deste protocolo que visa sistematizar o atendimento pré-hospitalar móvel ao politraumatizado, com o objetivo de minimizar o tempo gasto na cena e melhorar a qualidade do atendimento, abordando os princípios da Avaliação dos doentes e seu tratamento adequado.

AValiação DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO EM UM CENTRO DE SAÚDE

COSTA, Sophia Marta Mendes*; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; DOS SANTOS, Daisy Maria Conceição; CORTEZ, Denise Carneiro Machado

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

Tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença, pois a nicotina que o cigarro contém causa dependência e provoca alterações físicas, emocionais e

comportamentais na pessoa que fuma. O estudo objetiva avaliar o programa de controle do tabagismo no Centro de Saúde. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 30 artigos nacionais que atenderam aos critérios de inclusão e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma português, publicados no período de 2005 a 2015. A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro e março de 2016. Conclui-se que antes de iniciar o Programa o usuário fumava em média o dobro de cigarros por dia, os participantes do Programa fumavam menos de 10 cigarros por dia, no que diz respeito à idade que utilizaram o primeiro cigarro, os estudos referiram que há uma prevalência entre 10 a 15 anos. Quanto aos motivos que o levaram a fumar as pesquisas relatam que o principal motivo foi a ansiedade. Depois das reuniões do Programa 80% dos participantes informaram que pararam de fumar, a maioria dos fumantes eram portadores de doenças crônicas e a falta de apoio familiar como a principal dificuldade na sua permanência no programa. Dessa forma, percebe-se que o sucesso da adesão e manutenção desse paciente depende não só da história clínica, mas também do apoio familiar. Palavras-chave: Tabagismo. Programa de Controle. Dependência.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS ENFERMEIROS

MUNIZ, Arislene de Fátima Pires*; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; MONTEIRO, Pablo De Matos; CORTEZ, MACHADO, Denise Carneiro; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira.

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A qualidade de vida é um tema que vem sendo muito abordado nos últimos anos, tanto no campo social como no profissional. Acentua-se então, a avaliação da correlação existente entre a qualidade de vida do enfermeiro e as cargas de trabalho onde os mesmos são expostos. O estudo teve por objetivo avaliar a qualidade de vida dos enfermeiros. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 28 artigos nacionais e que atenderam aos critérios de inclusão e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma português, publicados no período de 2002 a 2015. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2015 a março de 2016. De acordo com a análise dos dados, observou-se que na presente pesquisa que se torna necessário a definição de melhores políticas públicas voltadas para as melhorias das condições de trabalho desses profissionais e a promoção de ações que

contribuam para o desenvolvimento da qualidade de vida do profissional de enfermagem em virtude da forte influência na qualidade da assistência prestada.

AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA

SOARES, Lucas Webá; SOUSA, Eduardo Martins de; ZAGMIGNAN, Adrielle

Curso: Biomedicina

Email: weba-soares@hotmail.com

Resumo : INTRODUÇÃO: A partir da década de 60, com um aumento da evolução tecnológica e maior qualidade de vida de países com rápido crescimento econômico, ocorreu um aumento substancial no desenvolvimento de doenças cardiovasculares causadas por dislipidemias. Estas doenças são atualmente a principal causa de morbimortalidade nos países mais desenvolvidos e em desenvolvimento. Com base nisso, foi-se realizado a busca em bancos de dados como Scielo e Capes, utilizando-se as palavras-chave: Dislipidemias, perfil lipídico e adolescentes, fazendo uso de artigos do período de 2000 a 2016. Ao estudar os artigos, foi levado em consideração a metodologia empregada, os exames realizados, a quantidade de adolescentes participantes, a área do país onde fora realizado a pesquisa e os dados obtidos. REVISÃO: Dos artigos analisados até o momento, chegou-se a uma média de que cerca de 30% dos participantes apresentaram dislipidemia, sendo o maior número encontrado até agora de estudo realizado com 180 adolescentes, nele cerca de 60% dos participantes apresentaram este quadro. Os fatores de riscos entre os adolescentes incluem o sedentarismo, alimentação, obesidade e fatores genéticos. CONCLUSÃO: Uma doença silenciosa que é capaz de se iniciar nos estágios iniciais da vida precisa ser estudada com mais afinco pela comunidade científica, especialmente o grupo jovem, que atualmente possuem poucas publicações referentes aos fatores de risco a curto e longo prazo, a fim de que sejam adotados programas preventivos, que estimulem esses grupos a buscarem uma vida saudável, fortalecendo futuras gerações.

BENEFÍCIOS DA BIOMASSA DA BANANA VERDE

LIMA, Christiane Thays Barbosa*; SILVA, Michelle Costa; VALE, Camila Costa; CARVALHO, Wyllyane Rayana Chaves; CARVALHO, Janaina Rayana Chaves

Curso: Nutrição

Email: christianelimanutri@hotmail.com

Os alimentos funcionais vêm despertando um interesse considerável da população, pois os mesmos oferecem inúmeros benefícios à saúde e apresentam-se disponíveis de forma diversificada no mercado. A biomassa da banana verde (BBV) é um tipo de alimento funcional, feita a partir da polpa da banana verde cozida e processada para aprimorar a qualidade

nutricional da banana. Pode ser incluída em diversas preparações, não apresenta sabor característico; e é utilizada também como um espessante natural. Pode ser incluída em bolos, sorvetes, biscoitos, entre outros. A BBV é uma alternativa excelente para compor a dieta, pois possui riqueza de nutrientes. Estudos demonstram que o potássio, presente na banana, ajuda no funcionamento celular e colabora nos processos musculares do organismo. Também auxilia na prevenção da perda de cálcio, inibindo a osteoporose. Em sua composição encontra-se ainda, o manganês que é responsável pelo relaxamento muscular e energia celular; o fósforo que é responsável pela constituição de ossos e dentes e participa do metabolismo dos carboidratos. A BBV atua na absorção lenta da glicose, evitando um estímulo desnecessário da mesma pelo corpo, o que em longo prazo auxilia na prevenção do surgimento do diabetes Tipo 2. Todos esses benefícios só são possíveis porque a banana verde se comparada com a fruta em seu estado de maturação é diferenciada. Portanto, a BBV possui considerável diferença nos teores de amido, sacarose e açúcares e é rica em amido resistente que apresenta uma qualidade nutricional similar às fibras alimentares na prevenção de doenças degenerativas associadas ao intestino. Palavras –chaves: Biomassa. Banana Verde. Alimento funcional.

BELEZA EM AÇÃO

DE ARAÚJO, Thais Luana Ferreira*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; DE CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira; BACELAR, Solange; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima N; RIBEIRO, Josênia Costa; GRISOTTO, Rosely

Curso: Estética

Email: thaisluana26@hotmail.com

A área da saúde e tecnologia que engloba o curso de Estética vem ao longo do tempo se expandindo e ganhando espaço com uma rapidez inexplicável. Sob essa perspectiva, faz-se necessária a realização de projetos de extensão com discentes do curso de estética para a obtenção de conhecimentos práticos e experiência na área. Assim, com o projeto de extensão Beleza em ação, os alunos do curso de graduação em estética da Universidade Ceuma participam de forma ativa de ações sociais nos bairros de periferia, igrejas, escolas, feiras e demais eventos, realizando atendimento na área da estética, como higienização facial, maquiagem e massoterapia relaxante corporal. Isto ocorre sob a supervisão dos docentes específicos da área, transformando as ações um momento de aprendizagem prática. Para a efetivação do projeto, conta-se com o apoio de várias empresas privadas, que auxiliam com os recursos materiais necessários. Destaca-se que através deste projeto, pode-se levar a procedimentos e técnicas de estética para periferias, beneficiando pessoas de baixo poder aquisitivo, ao mesmo tempo, proporcionar ampla experiência e conhecimento para os discentes que complementarão a sua formação profissional.

BRAND AWARENESS DE FRANQUIAS ODONTOLÓGICAS EM SÃO LUÍS

SANTOS, Thiago Filipe Linhares*; ARAÚJO, Skarlet Policarpo; MARQUES, Daniele Meira Conde;

Curso: Odontologia

Email: nzthiago@yahoo.com

Este trabalho busca apresentar um breve panorama do mercado de odontologia no Brasil e explorar o Brand Awareness (consciência da marca) no crescente setor de franquias de clínicas odontológicas na cidade de São Luís (MA). As marcas apresentadas no estudo são presentes nesta localidade e encontradas em reportagens sobre franquias odontológicas publicadas em sites de visibilidade nacional. Utilizando-se da revisão de literatura, busca-se compreender os aspectos distintos da consciência da marca: memorização e reconhecimento, que permitem identificar: (a) a marca Top of Mind; (b) a marca de maior preferência; (c) as marcas mais conhecidas; (d) as marcas mais recomendadas; e, (e) as marcas menos recomendadas. Elaboraremos conhecimento multidisciplinar acerca do Brand Awareness em odontologia. O estudo sugere que há uma necessidade de que as empresas do setor odontológico tenham uma maior atenção à sua gestão de marca, desenvolvendo ações de comunicação e marketing sem negligenciar o Brand Awareness, de modo a potencializarem as suas participações no mercado e a fidelização de consumidores, tanto internos quanto externos

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A MÚSICA COMO FORMA DE LINGUAGEM NO PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO

LISBOA, Regia da Silva; PEREIRA, Maria do Socorro dos Santos; RODRIGUES, Sandro Eduardo

Curso: Psicologia

Email: regialis@hotmail.com

O presente trabalho busca pensar o papel da música no processo de produção de subjetividade, tendo em vista o encontro entre características singulares de cada ser humano e os efeitos sonoros experimentados por este, desde antes de seu nascimento. Para tanto, é realizada uma revisão de literatura acerca das influências da música como forma de linguagem no processo de subjetivação. Revisão: A música se encontra presente no mundo desde os primórdios e, de alguma forma, os sons e ruídos permitem algum tipo de comunicação, consciente e inconsciente, entre as pessoas. Um tipo muito peculiar de experiência musical se faz presente na vida de cada ser humano, desde antes de seu nascimento, quando este, ainda bebê, no ventre de sua mãe, é capaz de notar os sons advindos da parede uterina e que, aos poucos, vão lhe dando sentido conforme vai se estabelecendo comunicação entre mãe e filho, durante a gravidez e após o nascimento. Buscamos também, através desse pensamento, compreender

como um universo sonoro qualquer pode ter um efeito marcante na vida do sujeito, demarcando um lugar e um tempo na sua vida, que pode, a qualquer momento, ser evocado, convocando-o a retornar a algum território existencial já percorrido, tal qual a música, em seus trechos e versos, igualmente o faz, através da noção de ritornelo. Conclusão: O universo sonoro experimentado pelo homem, fará parte da sua constituição subjetiva, iniciando-se muito antes de seu nascimento e continuando ao longo de toda a sua vida.

BICHECTOMIA

COUTINHO, Matheus Felipe Veloso*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; NASCIMENTO, Heney Kayo Lima; CHAVES, Franceilton Moura; JUNIOR, Jurandir Burgos Ribeiro; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Email: matheuscoutinho60@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Atualmente, a beleza está sendo cada vez mais requisitada e com isso, pacientes que procuram um bem-estar físico e psicológico além da melhora da estética facial recorrem cada vez a realização de tratamentos estéticos. Devido ao seu grande sucesso estético, a Cirurgia conhecida como Bichectomia está ganhando cada vez mais atenção da mídia. Nesse procedimento remove-se parte do corpo adiposo da bochecha, uma massa de gordura localizada entre os músculos masseter e bucinador, muito conhecida como bola de Bichat. Para realizar esse procedimento, o cirurgião dentista deve ter conhecimentos prévios sobre a anatômica dessa região, além da sequência de execução cirúrgica. Assim, deve-se dar atenção as estruturas anatômicas reparo, em especial ao ducto da glândula parótida. A incisão deve ser realizada logo abaixo do ducto e ligeiramente à frente ou atrás do mesmo, com aproximadamente 1,5 cm na sua maior extensão. A divulsão, deve ser feita delicadamente, tendo em vista que estruturas nobres tais como ramos da artéria facial, maxilar e do nervo facial encontram-se nessa região. Realiza-se movimentos circulares e assim grande parte da bola de Bichat é removida, levando em consideração que o cirurgião-dentista deve remover no máximo 2/3 do volume total.

BILINGUISMO VERSUS ORALISMO: IMPASSES NA INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS SURDAS

LEITE, Zinole Helena Martins*; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SAMPAIO, Karen Silva; VIANA, Otávio Wellington Rodrigues; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: patriciamary2011@live.com

A inclusão de pessoas surdas na escola encontra-se envolta num debate político e epistemológico acerca de qual método de ensino é mais eficaz na aprendizagem desta categoria . Esta pesquisa bibliográfica e descritiva objetiva refletir sobre as vantagens e desvantagens do bilinguismo e do oralismo para a inclusão escolar de surdos .Procedeu-se á análise de livros e 15 artigos compreendidos entre 2007 e 2016 que versavam sobre a comparação de métodos de ensino para surdos disponíveis nas bases de dados Scielo, Lilac e Google acadêmico, através das palavras chaves: “Oralismo”, “Bilinguismo”, “Deficiência Auditiva”. Revisão: Os métodos mais utilizados na educação de surdos são o Bilinguismo, proposta de ensino que tem sido utilizada por escolas que se propõem tornar acessível ao sujeito surdo à língua de sinais e a língua portuguesa e o Oralismo, que objetiva fazer com que o surdo assimile a linguagem oral, tornando-o um “falante” da língua oral e dessa forma integrar o surdo na comunidade de ouvintes. Conclusão: A inclusão de surdos no contexto escolar prescinde de uma análise das vantagens e desvantagens dos métodos de ensino a serem utilizados, considerando-se a especificidade , a história e as características do grupo de educando com deficiência auditiva. A imposição de métodos á comunidade surda, desconsiderando a sua especificidade pode gerar obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem , favorecer o desenvolvimento de atitudes sociais negativas frente aprendiz surdo e conseqüentemente a sua exclusão social.

BIÓPSIAS COMO ADJUVANTES NO DIAGNÓSTICO BUCAL

MELO, Bruno Felipe Ferraz*; SANTOS, Jorge Igor Melo; MACEIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: brunoferrazz@outlook.com

Curso: Odontologia

Resumo: A biópsia baseia-se na retirada de amostras de tecidos de um organismo vivo, sendo assim enviado para o laboratório de Patologia, onde é processado e analisado, e assim, efetuado uma análise histopatológica para o diagnóstico de lesões. O tipo de biópsia a ser escolhida irá depender da suspeita clínica, o tipo de lesão e sua extensão. Na cavidade bucal, são mais realizadas as seguintes: excisional, incisional, punção e por congelação. A biópsia excisional é realizada pelo cirurgião onde é feito um corte na pele para remover totalmente o tumor, ocorrendo a remoção total. Já na biópsia incisional é feito um corte e retirado um pouco do tumor, esse procedimento é realizado com anestesia local ou regional, ocorrendo a remoção parcial. A punção tem pouca relevância dentre as biópsias da cavidade bucal, por ser obtido pouco material para análise, é indicada para lesões profundas e de difícil acesso como, por exemplo, glândulas salivares. A biópsia por congelação é a que é examinada durante o ato cirúrgico, com o paciente na sala de cirurgia e anestesiado. É retirada uma pequena quantidade

de material para ser analisado pelo patologista com rapidez. Ainda que o corte histopatológico tenha uma boa qualidade, há uma limitação ao patologista, pelo fato de que alguns detalhes sejam perdidos, podendo gerar dúvida quanto ao diagnóstico.

CÂNCER DE BOCA: SINAIS, SINTOMAS E HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS

NASCIMENTO, Lucas Sousa*; ARAUJO, Talía Costa; SILVA, Andressa Lima; SAUAIA, Bismarck Ascar.

Curso: Odontologia

Email: lucas-nascimento12@hotmail.com

O reconhecimento das alterações sintomatológicas e clínicas, para o câncer de boca que atinge um grande número de jovens e adultos fumantes e que fazem uso de bebida alcoólica, no Brasil e no mundo pode promover um estado de redução de casos a partir de medidas profiláticas. Os dados informativos da presente pesquisa foram colhidos a partir de bibliografias e artigos de acesso livre em bibliotecas virtuais. Os resultados demonstraram que o câncer de boca se manifesta com presença de feridas que não cicatrizam, úlceras superficiais menor que dois centímetros de diâmetro e indolor com ou sem sangramento, manchas nos lábios e mucosa, dificuldade na fala, na mastigação, na deglutição, emagrecimento acentuado. Como causas principais também destacam-se traumas crônicos na mucosa geradas por próteses mal adaptadas, coroas fraturadas, raízes residuais e outros. O levantamento descritivo sobre a manifestação dos sinais de câncer de boca associados a hábitos de vida pode promover um menor número de casos da doença e reduzir os custos sociais no tratamento e reabilitação dos portadores.

CÂNCER DE PÊNIS: IDENTIDADE MASCULINA, SEXUALIDADE E CUIDADO DE SI

GONÇALVES, Camila Lima Ribeiro Gonçalves; SERRA, Melina Serra

Curso: Psicologia

Email: milacastelo@hotmail.com

Resumo: O câncer de pênis é uma doença rara, causada principalmente pela falta de higiene. Tem forte prevalência no Estado do Maranhão e estudos no Brasil apontam incidência em 74% de homens com fimose, além de associação à infecção pelo vírus HPV. O carcinoma pênis representa 2% dos casos de câncer em homens no país. O presente estudo é uma revisão literária apresentada com o objetivo de estabelecer recortes entre os referenciais para a construção da identidade masculina numa interface com a sexualidade e as implicações para o cuidado de si. Os questionamentos envolvem a forma como a identidade de gênero masculina é construída, como esse imaginário social se estabelece diante da sexualidade e seus reflexos

diante da saúde do homem com câncer de pênis. Pontos importantes da construção da identidade masculina atravessada pela sexualidade serão expostos com o objetivo de determinar alguns vieses que contribuem para essa formação. Conclui-se que fatores relacionados às questões culturais, familiares, subjetivas interferem na formação da identidade e no autocuidado. Estudos apontam que os referenciais sociais, econômicos e culturais impostos ao homem surgem como uma força implantada em falsas verdades e tem colocado esse homem num lugar de vulnerabilidade preocupante, desta forma o cuidado de si é frequentemente negligenciado, paralisando o homem diante de uma postura de prevenção e cuidados com a própria saúde, influenciando no diagnóstico prévio do câncer de pênis. Concluímos que estes levantamentos confirmam a necessidade de novas Políticas Públicas de conscientização, colocando o homem no lugar de protagonista da sua saúde.

CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS

SERRA, Dalvina Tatiane Garcia Gomes*; FONSECA, Thailson Márcio Pinheiro; CORREA, Valeria Cristina dos Anjos; FRANCO, Rauanna Ketlin Silva; JACOME, Evyla Rayra Costa; HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho Barbosa.

Curso: Fisioterapia

Email: thaty.projeto28@hotmail.com

Com o passar do tempo a expectativa de vida vem aumentando, podendo chegar atualmente a uma média de 74 anos. Cerca de 650 mil novos idosos estão sendo incorporados no Brasil, a cada ano, estes dados refletem principalmente, aos avanços das condições de saúde oferecidos à população com idade mais avançada. REVISÃO: Trata-se de um estudo de revisão de literatura. As buscas de artigos incluiu pesquisas em bases eletrônicas. Foram utilizadas palavras-chave em inglês, sendo quality of life, funcional capacity, elderly entre as palavras-chave foram utilizados os operadores booleanos AND e as ASPAS para melhorar a precisão das buscas, estas foram realizadas no período de Março a Maio de 2016. A pesquisa inicial, realizada nas bases de dados eletrônicas, identificou-se 229 artigos, foram encontrados 18 artigos relevantes, dentre os quais 14 artigos são estudos transversais, 1 descritivos intervencionais, 1 experimental longitudinal, 1 prospectivo de intervenção e 1 ensaio randomizado. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos demonstram que existe íntima relação da qualidade de vida com a capacidade funcional, além disso, os estudos apontaram que a qualidade de vida também é influenciada por aspectos como a escolaridade e a religiosidade.

CASAIS INFÉRTEIS: UMA LEITURA BIOPSISSOCIAL

PEREIRA, Debora Layanne da Conceição*; MANDU, Ana Carolina Soeiro; ARAGÃO, Jessica Sirlan; BRAGA, Mariana Amelia; CARVALHO, Ana Guaracy; DE OLIEVIRA, Christianny Valente

Email: cacau.fortes@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: O artigo traz uma leitura pautada nos aspectos biopsicossocial no que se refere ao contexto de casais inférteis, atribui-se o conceito de fertilidade, infertilidade, destacando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais que possam interferir no processo funcional da reprodução humana. Contribui para uma reflexão psicossomática por acreditar que tais eventos possam eliciar um processo de somatização na vida conjugal e intrafamiliar. Apresenta-se um estudo de caso com intuito de analisar qualitativamente como o terapeuta pode intervir no processo de enfrentamento a infertilidade.

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE

PINTO, Isabella Maria Pereira*; SANTOS, Sandra Marisa Pereira Dos; DINIZ, Marinete Farias; SANTOS, Rayane Rabelo; ARAUJO, Ione Cristine Da Silva De; SOUZA, Célio Roberth Oliveira de.

Email: isabella_1605@hotmail.com

Curso: Enfermagem

O leite humano é muito mais do que um simples conjunto de nutrientes; pela sua complexidade biológica, é uma substância viva, com atividade protetora e imunomoduladora. Para a criança, proporciona proteção contra infecções e alergias, como também estimula o desenvolvimento adequado do sistema imunológico e a maturação do sistema digestivo e neurológico. O objetivo do trabalho é conhecer as causas e consequências do desmame precoce. A metodologia adotada foi a revisão integrativa de literatura em que foram selecionados 10 artigos e demais trabalhos científicos que versassem sobre a temática proposta e atendessem aos descritores. O enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se relaciona com a mãe neste período, portanto, deve preparar a gestante para o aleitamento, facilitando sua adaptação na fase puerperal, evitando assim dúvidas, dificuldades e possíveis complicações. Conclui-se que o aleitamento materno oferece inúmeros benefícios, tanto para mãe como para o filho. A importância dessa prática tem sido abordada cada vez mais, pelos profissionais enfermeiros, tendo em vista a necessidade de implantar ações que incentivem a amamentação, uma vez que vários fatores interferem na realização do aleitamento materno adequado.

CÉLULAS SATELITES E AÇÃO NA PLASTICIDADE MUSCULAR (REGENERAÇÃO E HIPERTROFIA). REVISÃO DE LITERATURA.

DE CASTRO, Pablo Reis*; MADEIRA, Ana Paula Pinheiro; COSTA, Alana Dias; ARAÚJO, Rui Guilherme Barros; GOMES, Isabella Alice Rosa; DE SOUSA Leila Cristina Almeida

Curso: Educação Física

Email: leila-sousa@uol.com.br

As células satélites são pequenas células miogênicas, em estado quiescente localizadas entre o sarcolema e a lamina basal das fibras musculares. Enquanto o tecido muscular esquelético mantém-se livre de agressões, as células satélites permanecem em estado de quiescência. Entretanto, em resposta a estímulos como crescimento, remodelação ou trauma, as CS são ativadas, proliferam-se e expressam marcadores da linhagem miogênica. Assim o objetivo desta revisão narrativa é apresentar os aspectos relacionados à regeneração e a hipertrofia muscular. Revisão: a revisão baseou-se em 30 artigos, dos mais clássicos aos atuais, todos relacionando as células satélites no contexto da fisiologia, evidenciando sua importância no processo de regeneração muscular através da sua diferenciação em mioblastos, podendo dividir-se, difundir-se e migrar. O papel das células satélite na homeostasia do tecido muscular submetido a estresse mecânico tem sido cada vez mais considerado de importância vital. Conclusão: A capacidade de regeneração das fibras musculares esqueléticas é uma realidade estabelecida e aceita pelos citologistas, embora numerosos profissionais engajados no tratamento de pacientes com lesões musculares. Acredita-se que o exercício rigoroso conduz ao aparecimento de micro-rupturas de fibras musculares. A área danificada atrai células precursoras (satélites), que se incorporam ao tecido muscular e iniciam a produção de proteínas para preencher o intervalo lesado. O tecido muscular possui uma alta capacidade de regeneração, porém, pode ser limitada depende da extensão, da natureza da lesão, da integridade da lâmina basal e da sua revascularização.

CICLO DE MASSAGEM

SANTANA, Rayanne Karoline Lemos*; FERREIRA, Patricia Rodrigues; CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira de; CARVALHO, Laíse Neves; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima N.; LEVI, Josenia Costa Ribeiro; BACELAR, Solange de Almeida.

Email: rayanne.lrmos@hotmail.com

Curso: Estética

Ciclo de Massoterapia O ritmo acelerado da vida moderna demanda o emprego de recursos relaxantes e vigorantes, como a massoterapia, que inclui um conjunto de manobras, realizadas de forma sistemática, capaz de provocar reações fisiológicas, psicológicas, químicas ou mecânicas. Dentre as técnicas de massoterapia, destaca-se o Shiatsu, considerada uma

“massoterapia oriental”, que visa o reequilíbrio físico e energético, através de pressões sobre os pontos dos meridianos do corpo humano. No entanto, para o emprego adequado desta técnica faz-se necessário a formação de profissionais aptos e conscientes dos efeitos, indicações e contra-indicações de esta técnica. Neste contexto, o projeto ciclo de massoterapia é realizada com as discentes do Curso de Graduação em Estética da Universidade Ceuma, dando-lhes oportunidade de prática e promovendo habilidades e competências relacionadas à técnica empregada, bem como à interação com o público, sempre sob supervisão dos docentes. Ao mesmo tempo, fornece aos participantes os efeitos benéficos do shiatsu, tais como relaxamento e tonificação dos músculos da face, melhora da circulação sanguínea, maior hidratação da pele, diminuição do cansaço físico e mental, redução e tratamento de linha de expressão, diminuição da irritabilidade, tensões e estresse. No primeiro semestre de 2016 o projeto foi desenvolvido em nove oportunidades, com 280 atendimentos à população, incluindo comunidades, empresas públicas e particulares.

CLAREAMENTO INTERNO COMO UM COADJUVANTE NA ESTÉTICA

CASANOVA, Rayanne Ribeiro*; OLIVEIRA, Rita de Cássia Da Rocha; GUIDA, Thamires Ferreira Martins; JUNIOR, Wlisses Furtado Muniz; MARQUES, Tarcia Virginia Falcão; RIZZI, Claudia de Castro.

Curso: Odontologia

Email: raycasanova@outlook.com

A estética atualmente tem sido exigida pelos pacientes com mais frequência nos consultórios odontológicos. O escurecimento dental é um fator que implica diretamente com essa exigência, e o mesmo pode ocorrer por diversos fatores, tais como: escurecimento natural, traumatismo, necrose pulpar, iatrogenias durante o tratamento endodôntico e outros. Um método alternativo para o restabelecimento da cor de um ou mais elementos dentais é o clareamento interno. Existem dois métodos de clareamento interno: walking bleach ou técnica mediata e power bleaching ou técnica imediata, sendo este o mais utilizado. Na técnica mediata a forma de clareamento é por aplicação do produto clareador (pasta do pó de perborato de sódio misturado ao peróxido de hidrogênio) no interior da câmara pulpar, onde este deve permanecer ali de 3-5 dias. Na técnica imediata, o peróxido de hidrogênio é aplicado isoladamente na face vestibular e intra câmara pulpar e deve permanecer ali conforme as instruções do fabricante. O clareamento interno quando bem realizado pode permitir ou devolver a estética desejada, além de poder contribuir para melhoria da auto-estima do paciente.

COAGULOGRAMA E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

RIBEIRO, Sabrina de Campos*; COSTA, Aryadne Cristinne; CAVALCANTE, Thalita Andrade; MORENO, Alice; FARIAS, Larissa Bianca; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Email: aryadne10@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

O coagulograma se trata de um exame solicitado com o objetivo de ter conhecimento das condições do sistema de coagulação de pacientes, para que haja um planejamento adequado com relação a intervenção cirúrgica a ser feita, bem como ao seu devido processo de recuperação. Além disso, ele auxilia em investigações de sangramentos espontâneos que, por vezes, comprometem a homeostasia do corpo humano. O compõem: TS - Tempo de Sangramento, que consiste numa avaliação da eficiência das plaquetas na formação do coágulo, somada a verificação da quantidade das mesmas. Seu valor de referência é de 1 a 3 minutos; TC - Tempo de Coagulação, cujo valor de referência é de 2 a 12 minutos; TAP - Tempo de Protrombina Ativada, que testa os parâmetros de coagulação da via extrínseca. Seu valor de referência é de 12,5 a 15,5 segundos; PTT - Tempo de Tromboplastina Parcial, que testa os parâmetros de coagulação da via intrínseca. Seu valor de referência é de 24 a 45 segundos; e Avaliação Plaquetária, a qual tem a responsabilidade de complementar informações para que haja uma análise segura dos dados, tendo valor de referência de 120.000 a 400.00/mm³. Conclui-se que, o exame clínico necessita exames que complementem suas informações, somados com o histórico completo do paciente, bem como um exame físico feito com atenção, pois as pessoas, dentro de suas idiosincrasias, podem receber um diagnóstico correto, incorreto ou, até mesmo, incompleto, se todas as variáveis envolvidas na possibilidade de se ter uma certa patologia forem consideradas ou não.

COMPLICAÇÕES APÓS A INJEÇÃO DE SILICONE LÍQUIDO INDUSTRIAL: REVISÃO DE LITERATURA

LEAL, Morgana Rúbia Alves Veloso; FIRMO, Wellsyon da Cunha Araújo; SILVA, Naime Diane Sauer Holanda; NUNES, Marcio Anderson Sousa

Curso: biomedicina

Email: morganavelosoo@hotmail.com

Resumo: INTRODUÇÃO O Silicone líquido foi usado como preenchimento e substituto para os tecidos moles nos seres humanos, inicialmente na América do Norte, sendo introduzido posteriormente na Ásia, Europa, e América do Sul.1 REVISÃO Complicações locais variam desde alterações na coloração e consistência da pele, a intenso processo inflamatório, ulcerações com eliminação do material injetado, necrose associada a infecções secundárias, retrações e

deformidades cicatriciais do contorno corporal.^{1,2,3} No artigo publicado por Silva⁴ a paciente recebeu silicone líquido industrial injetável nas mamas, apresentando complicações 10 anos depois. Evoluiu com abscessos que levaram à mastectomia bilateral após 35 anos, por complicações pelo siliconoma. Há ainda o caso de uma mulher que fez aplicação de silicone líquido injetável em região glútea em ambas as nádegas com aparecimento tardio de ulcerações de difícil resolução.⁵ **CONCLUSÃO** Diante da presente revisão de literatura, conclui-se que o uso do silicone líquido industrial é uma prática que deveria ser contraindicada para finalidades estéticas, visto que as complicações podem ser inúmeras e graves.

COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO

PEREIRA, Fernando Felix de Jesus Vieira*; DA SILVA, Lucas Gabriel Pinto; DA SILVA, Rodrigo Gonçalves; DE OLIVEIRA, Jardel Simão; SAMPAIO, João Manoel Silva; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: fernandofelixeduc@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Radioterapia é um tratamento de câncer amplamente utilizado ao redor do mundo. Porém, como se trata de um procedimento que utiliza radiação ionizante, pode acarretar em vários efeitos indesejados. Muitos pacientes são submetidos à altas doses de radiação em grandes áreas, incluindo a cavidade oral. O que induz a uma elevada morbidade e o decaimento da qualidade de vida do paciente. Os efeitos adversos da radioterapia dependerão da dose de radiação aplicada, da idade do paciente, do volume e da área que está sendo irradiada e dos tratamentos associados. Complicações acontecem em todo o momento do tratamento, mas são reversíveis. Complicações tardias, porém, são irreversíveis, afetando significativamente a qualidade de vida do paciente. Pacientes submetidos à altas doses de radiação podem vir a ter efeitos adversos, estes podem acontecer no estágio agudo ou crônico. A severidade de complicações orais agudas dependerão do grau de inclusão das estruturas e da área irradiada. Mucosite, candidose, disgeusia, cáries de radiação, osteoradionecrose e xerostomia são alguns exemplos de complicações na radioterapia. A radioterapia é um tratamento bastante utilizado em pessoas com câncer, com melhoria nas taxas de sobrevivência dos pacientes. O tratamento, contudo, é acompanhado por inúmeras complicações. Então, é de suma importância que o profissional esteja familiarizado com os efeitos adversos que podem resultar no tratamento. Portanto, o tratamento multidisciplinar seria a melhor maneira de prevenir ou minimizar essas complicações.

COMPLICAÇÕES EM ARTROSCOPIA

OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos*; OLIVEIRA, Matheus Felipe Veloso; RAMOS, Thalita Sousa; ARRAIS, Ives Reis; BEZERRA, Rebeca Ferreira Pitanga; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Email: sidney-12@hotmail.com

A Artroscopia consiste em um procedimento cirúrgico pouco invasivo, que através de câmeras inseridas na articulação, tem como objetivo explorar e tratar possíveis alterações, além de proporcionar ao paciente uma recuperação mais rápida e menos dolorosa em comparação a outros procedimentos com mesma finalidade. Entretanto, não é utilizado como método de primeira escolha, uma vez que ajustes oclusais, terapia farmacológica (analgésico e anti-inflamatório), fisioterapia, termo terapia, estimulação elétrica transcutânea (TENS), além do controle do estresse emocional que deve ser instituído e durar durante todo o tratamento possibilitam um procedimento mais conservador. A ATM possui proximidades com várias estruturas anatômicas importantes como artérias superficiais do temporal, nervo facial e auriculotemporal, contudo auditivo externo, entre outras. Logo, quaisquer procedimentos realizados nas imediações da ATM requerem uma maior atenção para evitar complicações que podem surgir durante o procedimento como quebra de instrumentais, parestesia do infra orbital, extravasamento do fluido articular e morte

COMUNICAÇÃO BUCOSINUSAL INDUZIDA PELO USO CRÔNICO DE COCAÍNA: OCORRÊNCIA E POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS

CARDOSO, Lais Ines Silva*; BARBOSA, Saulo De Matos; SOUZA, Ingrid Araújo De Oliveira; ASSIS, Diogo Souza Ferreira Rubim De.

Email: laisinescardoso@gmail.com

Curso: Odontologia

A inalação de cocaína causa significativa isquemia sanguínea, levando à inflamação, ulceração, e conseqüente necrose e destruição dos tecidos nasais e de osso e mucosa da região média do palato, levando ao desenvolvimento de uma comunicação e conseqüente fístula bucosinusal, especificamente chamada de destruição de linha média induzida por cocaína. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura quanto à incidência, dimensão da lesão e possíveis tratamentos da destruição de linha média induzida pelo uso da cocaína. Foram pesquisados na base PubMed os termos: cocaine induced midline destructive lesion, repair with free flap, e combinações destes. Devido a pouca oferta de artigos específicos, foram selecionados artigos de cirurgia sobre as possibilidades terapêuticas em defeitos de palato de diferentes causas, nos períodos de 2006 a 2016. Foi possível concluir que o efeito anestésico causado pela droga parece ser de grande importância para evolução da lesão, e procura tardia

por atendimento médico. Clinicamente e radiograficamente, a destruição de linha média é caracterizada por: perfuração do septo nasal, destruição da parede nasal lateral, e grande envolvimento do palato. As possibilidades terapêuticas possíveis para fechamentos de defeitos no palato vão desde uso da bola de bichat, retalhos pediculados, e retalhos livres, esse último teve ampla indicação, pois obteve os melhores resultados. É necessário ressaltar, porém, que a viabilidade do retalho depende da colaboração do paciente em interromper o uso da droga, caso contrário, o retalho torna-se inviável.

COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS, ESTUDO SOBRE BULLYING ENTRE ESCOLARES NO BRASIL

CANTO, Julia Araujo Silva*; SILVA, Jozielma Bastos; CHAVES, Jessica Bastos; LACERDA, Sarah Sales; SOUSA, Erica Louzeiro; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: julia.13araujo@hotmail.com

A escola é um espaço multifacetado e que vem presenciando situações de violência que tem tomado proporções assustadoras em nossa sociedade. As situações de violência na escola que eram esporádicas tornaram-se uma constante em nossos dias. Esta pesquisa busca caracterizar o bullying nas escolas e os efeitos produzidos nos comportamentos e sentimentos dos vitimizados. Estudo de uma revisão de literatura e de caráter descritivo. Buscou - se estudos publicados a partir de 2010 que contemplava a temática em questão. Utilizou - se os descritores: “Violência nas escolas”, “Comportamentos Agressivos”, “Bullying” para busca nas bases de dados. Na literatura estudada pelos pesquisadores constou-se que a violência nas escolas tomou uma proporção como nunca visto antes. O fenômeno bullying não é praticado apenas no Brasil, mais em diversos países. O perfil dos atores envolvidos neste tipo de comportamento como os praticantes do bullying, são conhecidos como autores agressores. Os alvos dessas práticas são geralmente pessoas vitimizadas, pouco sociáveis, inseguras e com baixa auto- estima. As testemunhas do bullying geralmente ficam caladas por medo serem as próximas vítimas. Compreende-se que as dimensões deste fenômeno têm repercutido na sociedade e atualmente vem sendo desenvolvidos vários estudos com intuito de minimizar ou até mesmo eliminar de uma vez esses tipos de ações nas escolas.

CONCEPÇÃO DO USO ABUSIVO DO CRACK ENTRE PESSOAS PARTICIPANTES DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA

CARVALHO, Ana Guaracy Monteiro*; OLIVEIRA, Christhianny Valente de.

Email: aguaracy@hotmail.com

Curso: Psicologia

Percebe-se que é cada vez mais frequente o discurso e a relação da fé ou religiosidade com processos de cura. Assim, a partir da experiência de estágio na área da saúde, foi possível observar efeitos danosos do crack na vida de pessoas em busca de tratamento em comunidades terapêuticas. Naquele espaço não é utilizado nenhum tipo de prática medicamentosa, pois acreditam no modelo terapêutico laboral e espiritual. Todos seguem uma rotina diária com momentos de acolhimento e relato de experiências. Crêem que todos podem aprender uns com os outros, dentro da comunidade. O acompanhamento dá-se em um período mínimo de três meses, de forma abrangente, com intuito de possibilitar aos usuários melhor qualidade de vida. O estudo faz-se relevante por trazer ao campo científico novos conteúdos que poderão ampliar os conhecimentos na área da dependência do crack, acreditar no processo de reabilitação e retorno satisfatório ao convívio social. Neste sentido pretende-se descrever as concepções do uso abusivo do crack, bem como as implicações das práticas de comunidades terapêuticas sobre o processo de reabilitação de pessoas em dependência química, além de identificar os comportamentos que caracterizam a reincidência do uso do crack em usuários acompanhados em comunidades terapêuticas. Acredita-se que o estudo poderá contribuir com a área da saúde, com a comunidade acadêmica, bem como com a área social por oferecer uma possibilidade de ressocialização, bem estar e qualidade de vida às pessoas em processo de reabilitação

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de; LOBO, Eliene Aquino; SILVA, Eldi Pereira; SANTOS, Ednamara de Oliveira; RIBEIRO, Wallyson Martins; GALVÃO, Pollianna; Márcia Beckman

Curso: Psicologia

Email: elianek2@hotmail.com

Resumo: Os estudos sobre formação e atuação docente têm se direcionado àqueles profissionais que atuam em espaços de escolarização formal, principalmente em referência às características julgadas como necessárias para a composição desse perfil. No entanto, tem-se observado pouca atenção acadêmica aos educadores sociais que trabalham em contextos educativos não-formais, cuja atuação volta-se para o atendimento direto às demandas e problemas sociais da nação. No Brasil, as organizações não-governamentais, geralmente, são lócus de trabalho do educador social, que ainda comparece com um perfil profissional pouco definido para uma atuação específica a esse cenário. Este trabalho trata-se de um ensaio teórico que objetiva destacar a importância da atuação do psicólogo escolar na formação dos educadores sociais para a consolidação de sua identidade profissional. Primeiramente, visa-se

apresentar a literatura da Psicologia Escolar crítica quando voltada a contextos de educação social direcionado às classes populares. Em seguida, sugere-se uma proposta de atuação do psicólogo escolar na formação do educador social a partir de três eixos de ação: (1) assessoria à elaboração de projetos pedagógicos criativos que busquem diferentes linguagens e formas de potencializar a aprendizagem humana; (2) escuta psicológica aos educadores, a fim de construir espaços de interlocução dos sentidos sobre situações de adversidade vivenciadas na atividade profissional; (3) momentos de estudos coletivos, orientados por conhecimentos específicos da ciência psicológica. Conclui-se que o psicólogo pode colaborar nos planejamentos de projetos sociais, na elaboração de políticas públicas, na formação de educadores, no apoio psicológico e na assessoria ao educador no enfrentamento de conflitos.

CONTROLE DE ANSIEDADE NÃO FARMACOLÓGICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – HIPNOSE

MOURÃO, Thaianne Polanna de Carvalho*; VINICIUS, Karlos; MENDES, Allyne de Pádua Pinheiro; PINHEIRO, Izaerika Amaral; DURANS, Jadna; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: moniquemnq@hotmail.com

A ansiedade é ocasionada pelo desconhecimento de determinadas situações, medo, incerteza, insegurança, podendo ser vista pelo indivíduo como uma fonte de ameaça e impotência gerando um estresse emocional e angústia. Em Odontologia, alguns estudos comprovam que o medo pode iniciar-se na infância, que podem estar relacionados ao comportamento de profissionais cirurgiões dentistas e aos procedimentos utilizados, influenciando negativamente o tratamento. No que se refere ao Procedimento Cirúrgico, essa ansiedade é somatizada em decorrência de situações apresentadas, tais como: anestesia, presença de sangue, ruídos de instrumentais, entre outros procedimentos que remete a sensações dolorosas. Dessa forma, existem métodos que minimizam esses impactos psicológicos, que são importantes na substituição do uso de fármacos. A Hipnose em Odontologia é um recurso terapêutico auxiliar que tem como objetivo acelerar o processo de terapia e diminuir o tempo de tratamento. Diante disso, o presente trabalho irá abordar como as técnicas de Hipnose que podem colaborar com o alívio da ansiedade em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.

CONTROLE DE ANSIEDADE NÃO FARMACOLÓGICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PSICOTERAPIA

SILVA, Monique Lemos*; RODRIGUES, Ana Porcina Santana; SANTOS, Diego Silva; JUNIOR, Fláσιο Bessa; SILVA, Michelle Nascimento; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: anaporcina@hotmail.com

A ansiedade é ocasionada pelo desconhecimento de determinadas situações, medo, incerteza, insegurança, podendo ser vista pelo indivíduo como uma fonte de ameaça e impotência gerando um estresse emocional e angústia. Em Odontologia, alguns estudos comprovam que o medo pode iniciar-se na infância, que podem estar relacionados ao comportamento de profissionais cirurgiões dentistas e aos procedimentos utilizados, influenciando negativamente o tratamento. No que se refere ao Procedimento Cirúrgico, essa ansiedade é somatizada em decorrência de situações apresentadas, tais como: anestesia, presença de sangue, ruídos de instrumentais, entre outros procedimentos que remete a sensações dolorosas. Dessa forma, existem métodos que minimizam esses impactos psicológicos, que são importantes na substituição do uso de fármacos. A Psicoterapia é de natureza psicológica que tem como intuito proporcionar uma boa qualidade emocional deixando o paciente suficientemente estabilizado quanto ao aspecto psicológico para que esse não interfira nos procedimentos cirúrgicos. Diante disso, o presente trabalho irá abordar como as técnicas de Psicoterapia que podem colaborar com o alívio da ansiedade em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.

CONVERGÊNCIAS ENTRE A ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA E A PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA: ATUAÇÃO DO PSICOTERAPEUTA

LIMA, Robson*; PEREIRA, Auriclê Rodrigues; AZEVEDO, Ângela Maria Oliveira Barros; CAMARGO, Dr. Amilton Carlos

Curso: Psicologia

Email: robsonlima.misc@bol.com.br

A produção deste artigo tem a finalidade de refletir sobre as convergências entre a Abordagem Centrada na Pessoa e a Psicologia Social Comunitária, com direcionamento para as competências do psicoterapeuta humanista, com base na contribuição de Carl Rogers, acerca da Abordagem Centrada na Pessoa, que situa-se na perspectiva humanista da Psicologia. Dessa forma, objetiva-se uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, visando compreender conceitos fundamentais da teoria rogeriana, que permitem aproximações com a atuação profissional voltada para a psicologia social comunitária, como: tendência atualizante e

condições facilitadoras para o crescimento pessoal: compreensão empática congruência e aceitação incondicional positiva. Nesse sentido, fazendo uma correlação com a atuação do psicólogo humanista, Rogers nos dá um novo olhar para a atuação do Psicólogo no cenário comunitário, possibilitando a crença de que as pessoas uma tendência autoatualizante, um potencial positivo para a mudança e crescimento pessoal, e esta possibilidade inerente à pessoa pode dar um novo direcionamento para sua vida.

CORYNEBACTERIUM PSEUDODIPHtheriticum: REVISÃO DE LITERATURA DOS MECANISMOS DE VIRULÊNCIA

MORAES, Ruana Andréa Frazão; SABBADINI, Priscila Soares; ARAÚJO, Jéssica Mayara Mendes

Curso: Biomedicina

Email: rufrazao@gmail.com

Resumo: *Corynebacterium pseudodiphtheriticum* é um bacilo gram-positivo irregular, pertencente à microbiota humana. Apesar de ser caracterizado como um comensal inofensivo, é um agente patogênico oportunista e pode causar infecções graves. Segundo estudos, entre as espécies de corinebactérias, *C. pseudodiphtheriticum* foi o micro-organismo mais isolado de infecções do trato respiratório superior, especialmente nas infecções adquiridas no âmbito hospitalar. No entanto, fatores de virulência deste patógeno ainda não estão completamente elucidado. *C. pseudodiphtheriticum* vêm apresentando multirresistência aos antimicrobianos utilizados na antibioticoterapia acarretando impacto tanto sobre a morbimortalidade quanto aos custos da terapia. Além disso, a natureza multifatorial deste patógeno pode ser considerada, visto que são capazes de (i) aderir a hemácias de carneiro tripsinizadas, a células epiteliais e a proteínas de matriz extracelular; (ii) formar biofilme em superfícies bióticas e abióticas; (iii) invadir e sobreviver dentro de células epiteliais e (iv) induzir apoptose. A habilidade para produção da enzima desoxirribonuclease também foi descrita para o micro-organismo. Estes mecanismos de virulência constituem elementos importantes da patogenicidade da espécie, podendo contribuir para disseminação da infecção no hospedeiro e/ou favorecer a resistência aos antimicrobianos. Portanto, verifica-se a necessidade de mais investigações relativas ao potencial patogênico da espécie em questão.

CREMES DENTAIS CLAREADORES E O MARKETING

SILVA, Andressa Lima*; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; BRUZACA, Karoline Guará; MAIA, Mariana Lopes; CARNEIRO, Karina Gama Kato; KUSSANO, Sandro Carvalho; GOMES, Isabella Azevedo.

Curso: Odontologia

Email: andressa.da.lima@outlook.com

Ter dentes brancos sempre foi o sonho de consumo de todo o mundo, aumentando o apelo a estratégias voltadas para a estética dental. A indústria cresce em tecnologia, inovando com produtos clareadores e junto ao marketing, que se torna cada vez mais forte e apelativo. A disputa pela preferência dos cremes dentais clareadores disponíveis no mercado é evidente. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é demonstrar as estratégias de marketing empregadas nas embalagens de cremes dentais que afirmam possuir efeito clareador. Observa-se a presença de palavras na língua inglesa, bem como embalagens reluzentes, que denotam sofisticação e glamour com o uso de dentifrícios clareadores.

CROMOBLASTOMICOSE: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARA EFICÁCIA DO TRATAMENTO

MENDES, Amanda Graziela Gonçalves*; JÚNIOR, Alexsander Rodrigues Carvalho; RABELO, Vannyana Gomes; SANTOS, Juliana Ribeiro Alves.

Email: grazielamendes29@gmail.com

A cromoblastomicose (CMB) é uma doença fúngica que se localiza principalmente nos membros inferiores, apresentando-se como nódulos e placas verrucosas que podem ulcerar. Acomete a epiderme, derme e o tecido subcutâneo e pode apresentar infecção secundária. A penetração do fungo no organismo ocorre geralmente por implantação traumática de material orgânico contaminado, cujo principal agente etiológico é *Fonsecaea pedrosoi*. Este fungo apresenta distribuição cosmopolita com maior incidência nas regiões tropicais e subtropicais de clima quente e úmido. O Maranhão é uma das áreas endêmicas para a CMB. A diversidade polimórfica da lesão dificulta um diagnóstico médico preciso, em decorrência de similaridade clínica com outras entidades dermatológicas, evidenciando a importância do diagnóstico micológico e histopatológico. A CMB ainda é tida como desafio terapêutico, principalmente devido à natureza recalcitrante da doença, sobretudo nas formas clínicas graves. A terapia é longa e podem ocorrer recidivas, dependendo da situação clínica e da extensão das lesões, os procedimentos terapêuticos podem variar. Existem três modalidades de tratamento: físico, quimioterápico e combinação de terapias. O principal antifúngico utilizado é o itraconazol. Por ser uma micose de alcance mundial relevante na saúde pública, a CMB precisa ter seu diagnóstico clínico e laboratorial precoce para diminuir o agravamento da doença e realizar o tratamento farmacológico e físico adequado. Palavras-chave: Cromoblastomicose, tratamento, diagnóstico, *Fonsecaea pedrosoi*.

CUIDADOS PALIATIVOS

LIMA, Vanessa Ribeiro Azzolin* ; PEREIRA, Iana Raissa Neves; GONÇALVES, Dalya de Sousa; REDRIGUES, Cianna Nunes Rodrigues;

Email: nessinha.r@hotmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto ela durar: esses são alguns dos princípios dos Cuidados Paliativos que, finalmente, começam a ser reconhecidos em todas as esferas da sociedade brasileira. Os cuidados paliativos atuam nas necessidades do paciente e de sua família, comprometendo-se a avaliar e tratar os sintomas físicos de desconforto, como dor, fadiga, cansaço, falta de ar e outros que possam causar sofrimento e piora da qualidade de vida. Ao mesmo tempo em que trata os sintomas da dimensão física, orienta-se no sentido de avaliar e cuidar das necessidades emocionais, sociais, familiares e espirituais do paciente e de sua família, respeitando seus valores e crenças. No Brasil, as atividades relacionadas a cuidados paliativos ainda precisam ser regularizadas na forma de lei, pois aqui ainda impera um enorme desconhecimento e muito preconceito relacionado aos cuidados paliativos.

CURCUMINA (CÚRCUMA LONGA L.) E PIMENTA (PIPPER NIGER L.): DA CULINÁRIA A ARMA PROTETORA.

LIMA, Patrícia de Souza Duarte*; MATOS, Ana Cinara; DE CARVALHO, Marcia Liotto; SOUZA, Ângela Tamara Lemos

Email: psdlima@hotmail.com

Curso: Nutrição

Resumo: O Açafrão da Índia (Curcuma longa Linn.) raiz mais utilizada na culinária como na medicina asiática, ayurvedica e chinesa. É no rizoma da Curcuma longa que está o componente mais ativo da planta, a curcumina presente associado a pimenta negra aumenta a biodisponibilidade do princípio ativo da curcumina, apresentando características funcional e nutritiva, além de promover a defesa do sistema nervoso. O fato de a curcumina estar se mostrando uma molécula altamente pleiotrópica, desperta o interesse dos cientistas, pó insolúvel na água. Já considerada como um nutracêutico, com objetivo de prevenir e tratar doenças multigênicas complexas neurológicas, como Alzheimer, aumento significativo nos últimos anos. O consumo diário da curcumina e pimenta , utilizadas em pratos da culinária brasileira funcional. A funcionalidade delas nos pratos na visão de pesquisadores muda o foco. Estudos com pessoas com a Alzheimer, administrando curcumina comprovou atuação na via celular, interferindo positivamente, o retardo do processo degenerativo, observado que a

substância age diretamente sobre uma proteína que, quando está alterada, favorece a morte dos neurônios, em ação, ela diminuiu de 50% para 19% a proporção de células danificadas, tem a capacidade de quelar metais como ferro, cobre e zinco, importantes geradores de radicais livres, retardando o processo degenerativo. Os estudos demonstram a potencialidade da curcumina, e excelentes resultados,, atuam em diferentes vias celulares, usados no tratamento de varias doenças, porém baixa solubidade. No entanto carecem mais estudos com seres humanos, aumentando a confiabilidade nos dados informados para isso se aplicar mais na pratica clinica. Palavra chave: Curcumina, culinária, doenças neurológica.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS PARA O PSICÓLOGO NAS ORGANIZAÇÕES.

SANTOS, Alison Reis*; FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; LIMA, Rusiane Brito; VIANA, Otavio Wellington Rodrigues; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; LEITE, Zinole Helena Martins.

Curso: Psicologia

Email: alisonpsicologia@gmail.com

Inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho tem sido um desafio para o psicólogo organizacional, devido ao despreparo dos profissionais envolvidos neste processo, como também á pouca acessibilidade no contexto organizacional. Objetiva-se com este estudo bibliográfico e descritivo refletir sobre o papel do psicólogo na inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho, destacando-se os limites e possibilidades desta intervenção nos contextos organizacionais.: Procedeu-se à análise de 10 artigos científicos publicados a partir de 2000, disponíveis nas seguintes bases de dados: Scielo e scholar.google.pt ,através das palavras-chave “Deficiência auditiva”, “Linguagem não verbal” e “Mercado de trabalho”. Aspectos relativos à comunicação com pessoas com deficiência auditiva têm sido apontados como obstáculos para a sua inclusão no contexto laboral, ainda que assegurado por Lei. Salienta-se a necessidade da aprendizagem de LIBRAS e de elementos da comunicação não verbal para que ocorra de modo satisfatório o recrutamento e seleção desta categoria. Despreparo de profissionais, falta de estrutura, acessibilidade, barreiras atitudinais e na comunicação dificultam a contratação de pessoas com deficiência auditiva nas organizações, contribuindo assim para a exclusão social desta parcela da população. Persistem condutas organizacionais que mantêm esta categoria em condições de trabalho subalterna, o que sugere dificuldades no processo de recrutamento e seleção de pessoas surdas.

DEFICIÊNCIA E SEXUALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA

LACERDA, Sarah Sales*; SILVA, Jozielma Bastos; SANTOS, Querlenilda Ferreira; NUNES, Josiele Dias; SOUZA, Erica Louzeiros; SERRA, Melina.

Curso: Psicologia

Email: sarah_lacerda96@hotmail.com

Frequentemente a pessoa com deficiência é percebida como alguém infantil, geralmente porque relacionam-se à dependência aspectos como a imaturidade emocional e características infantis. Em qualquer tipo de população, seja com deficiência ou não, é impossível determinar se a vida sexual e afetiva será satisfatória ou insatisfatória. Além disto, vale ressaltar que em diferentes momentos da vida, dificuldades e facilidades em relação a vivência da sexualidade podem ocorrer em maior ou menor grau para todos. Entre pessoas com deficiências a realidade é a mesma. Generalizar, rotular e estigmatizar a pessoa com deficiência, sem considerar o contexto sociocultural, biológico e psicológico em que ela se desenvolve, é negligenciar o direito de viver a sexualidade de forma plena. Objetiva-se com este estudo descrever, a partir de uma revisão da literatura, a importância da atuação do psicólogo junto à pessoa com deficiência na superação de seus limites quanto a sua sexualidade e autonomia. Conclui-se que na Psicologia, a abordagem da sexualidade em pessoas com deficiências perpassa por aspectos éticos que permitem enxergar o ser humano como digno de manifestar e viver sua sexualidade. Na maioria dos casos, as funções e desejos sexuais estarão potencialmente preservados e não devem ser negados quando há algum tipo de limitação ou deficiência. Ao considerar a pessoa com deficiência como alguém não dotado de viver a sexualidade, negligenciam-se os cuidados contra situações de abuso e se omitem a essas pessoas o direito de acesso a educação sexual e vivência plena da sexualidade.

DESENVOLVENDO HABILIDADES COGNITIVAS E MOTORAS NA VELHICE,PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

MENDES, Priscilla Costa*; REIS, Liliam Oliveira; LISBOA, Elnira Verenna; FURTADO, Talita.

Curso: Psicologia

Email: pcm_vel@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de habilidades e do trabalho de fortalecimento de vínculos sócio afetivos, que contribuem para socialização ,bem-estar, físico e emocional do grupo de idosos do CRAS do bairro da Vila Palmeira. O Estatuto do idoso prevê ao cidadão na terceira idade o direito á liberdade, ao respeito e á dignidade, direitos estes comuns a todos os cidadãos e que devem ser mantidos nesta fase da vida, assim como o direito á educação ,cultura , lazer e esporte. O CRAS é , então, o órgão responsável por prestar tal assistência , diante disso e da constatação obtida por meio de informações sócio-

demográficas colhidas, foi diagnosticado a existência de uma demanda implícita de trabalhos e atividades, dessa forma foi proposto neste trabalho ,intervenções psicossociais direcionados aos idosos com o intuito de estimular as habilidades cognitivas e motoras do idoso visando a prevenção de doenças decorrentes da perda de memória , e de habilidades motoras ,visando a autonomia física e social, trabalhando com a prevenção de problemas gerados pelo atrofiamento muscular e neurológico inerentes ao envelhecimento. Com o decorrer do tempo e avanço de idade, o conjunto de papéis que as pessoas assumem ao longo da vida tendem a se modificar por diversos fatores e junto com essa atualização de papéis, é necessário que se mantenha o bem-estar vivenciado em fases anteriores da vida, e que se aproveite esta nova fase para vivenciá-la da melhor maneira e de forma bem sucedida

DEPRESSÃO UMA PATOLOGIA QUE LEVA ADOLESCENTES AO SUICÍDIO: ISTO É OU NÃO UMA QUESTÃO DO VAZIO EXISTENCIAL?

PINTO, Tatiana Nogueira *; FARIA, Simony Sousa

Curso: Psicologia

Email: tatikapinto@hotmail.com

A depressão acometida na adolescência vem aumentando muito e alguns casos chegam ao suicídio, e por esse motivo é importante se pensar sobre o vazio existencial que é algo vem trazer algumas reflexões em relação ao ser-no- mundo e isto Satre vem ressaltando muito bem sobre essa questão. Para Jean-Paul Satre o homem nasce, vive e se desenvolve, e determina o que deve acontecer, pois o homem é livre e nada o obriga a nada. Portanto, através desta perspectiva que o homem vai manifestar a sua presença no mundo, onde a liberdade de escolha faz com que surge a inquietação existencial, ou seja, o homem sempre vai sentir na pele a responsabilidade de ter que decidir algo em sua vida seja ela quais forem mesmo que isto o provoque angustia ou agonia, para que isto possa preencher o vazio que o invade. E dentro desta perspectiva o adolescente pode se ser encaixado por conta das transições psicossociais, que atravessa deste a infância até a fase adulta. E como essa é uma fase de transição, em que o adolescente perpassar por varias situações incertas como Satre ressalta tais como às emoções, de medo, insegurança, ansiedade, frustração, raiva e agressividade sintomas esses que acabam acarretando a “depressão” levando às vezes ao suicídio. Esse estudo foi utilizado revisões bibliográficas no período entre 2007 e 2014. Foram utilizados bancos de dados como o Scielo, Google Acadêmico e livros relacionados com o tema do estudo. PALAVRAS-CHAVE: Adolescente, Depressão, Suicídio e Vazio Existencial.

DESCONFORTOS OSTEOMUSCULARES EM SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MARANHÃO

DOS SANTOS, Ariane Cristina Ferreira*; DOS SANTOS, Rafael Duarte; BACELAR, Solange; GRISOTTO, Rosely Fontes; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima N; CARVALHO, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira; RODRIGUES, Patricia

Curso: Estética

Email: hildenirsilva@hotmail.com

A sintomatologia dolorosa, decorrente de inúmeras patologias no aparelho locomotor tem se tornado uma preocupação cada vez mais frequente nas repartições públicas, caracterizadas pelo trabalho rotineiro e com ampla repetição de movimentos. Assim, este estudo objetiva identificar os principais desconfortos osteomusculares referidos pelos servidores públicos do estado do Maranhão atendidos no Espaço Vivência do Servidor. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal e observacional, realizado com servidores públicos do governo do estado do Maranhão que são atendidos no Espaço de Vivência do Servidor. Participaram do estudo 50 servidores públicos. Os dados foram obtidos através do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (Parecer número 1.571.672). A maioria dos pesquisados era do gênero feminino 39 (78%), apresentando média de idade de 42,4 anos ($\pm 8,7$). 86% dos servidores estudados relataram apresentar algum tipo de sintomas osteomusculares, como dor, dormência, formigamento ou desconforto em uma ou mais regiões do corpo. Tanto nos últimos doze meses quanto nos últimos sete dias, estes sintomas eram localizados em ordem decrescentes na coluna cervical, dorsal e lombar. O grande número de servidores com sintomas osteomusculares sugere a necessidade de pesquisas aprofundadas sobre o acometimento de LER/DORT nestes profissionais, bem como análise ergonômica de seu ambiente de trabalho, visando enfatizar a importância da prevenção destes sintomas. Palavras-chave: Desordens musculoesqueléticas; Servidores públicos; Saúde Ocupacional.

DESVENDANDO O VITILIGO

COLASSO, Arthur Henrique Mendes*; SAMOLÃO, Rondineli Seba; UCHOA, Michelle Russo Bendelak

Curso: Farmácia

Email: arthurcolasso@hotmail.com

O Vitiligo é uma acromia adquirida, de causa desconhecida, idiopática, caracterizada por máculas branco-nacaradas de diferentes tamanhos e com formas com tendência a aumentar centrifugamente de tamanho. Vários fatores têm sido associados à etiopatogenia da doença, como por exemplo, a herança genética e a doença auto-imune. Dentre as teorias que têm sido propostas para tentar explicar o processo de despigmentação algumas incluem a presença de

auto-anticorpos; participação de células T citotóxicas, a “autodestruição” dos melanócitos por produtos intermediários da melanogênese. Diante desta gama de teorias e da falta de uma afirmativa para a origem do vitiligo ainda deparamos com a inexistência de uma terapia definitiva, porém alguns novos tipos de tratamento tem sido propostos, como o uso de imunomoduladores tópicos, aliados a tratamentos já consolidados, como os psoralenos e os corticosteróides. Além dos tratamentos com medicamentos, em muitos casos a população recorre a terapias alternativas com plantas medicinais. Apesar dos esforços da ciência, que envolve pesquisas experimentais in vivo e in vitro, os mecanismos de formação e o estabelecimento de tratamentos efetivos ainda constituem um desafio. Estudos recentes apontam que os fatores de vida estressantes, típicos da atualidade, são considerados elementos desencadeadores do vitiligo, justificando a crescente incidência da doença. Pouco ainda se conhece sobre a origem ou causa do vitiligo sendo feitas muitas suposições, no entanto devido ao surgimento de várias patentes relatando o uso de plantas medicinais no controle do vitiligo plantas estas presentes na flora brasileira acredita-se que a cura esteja bem próxima de ser encontrada.

DIAGNOSTICO DE CRANIOSSINOSTOSE POR SEQUENCIAMENTO SANGUER

NETO, Roberval Nascimento Moraes*; SANTOS, Anna Klenny Fontes; MARAMALDO, Carlos Eduardo Campos; DOURADO, Edyla Wilenna Alves; CALDAS, Maysa Yzabety da Silva; MARQUES, Felipe Albuquerque

Email: robervalmoraes11@gmail.com

Área / Especialidade: Biomedicina

A craniossinostose é uma malformação com prevalência de 1 em 2000 nascidos vivos. Ocorre devido ao fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas, podendo levar a um aumento da pressão intracraniana, alterando o fluxo sanguíneo cerebral resultando na ocorrência de distúrbios visuais, auditivos e outras disfunções neurológicas. Apresenta etiologia ambiental e genética, sendo a mutação P250R no gene FGFR3 uma das mais frequentes, que possui caráter autossômico dominante. (FERRARI, et. al, 2013). Resumo: Estudos revelam que o sequenciamento de Sanguer é eficiente para diagnóstico da craniossinostose, identificando até mesmo mutações do tipo SNV (single nucleotide variance), que poderiam ter impacto no organismo. (MARQUES, 2013) É sequenciada a região p16.3 no cromossomo 4, buscando mutações não sinônimas em regiões exônicas, as mutações candidatas são analisadas dando prioridade para mutações no gene FGFR3, pois a craniossinostose em geral está associada com mutações nesse gene. (THOMPSON, 2013). Conclusão: O sequenciamento de Sanguer mostra a origem da mutação no DNA, tornando eficaz o diagnóstico molecular da craniossinostose, além

de ser uma técnica muito sensível a qualquer alteração na sequência de nucleotídeos, é a técnica de sequenciamento de referência mostrando resultados mais precisos que as demais. Proporcionando uma rápida detecção melhorando a chance de tratamento cirúrgico da doença, aumentando a sobrevivência dos portadores.

DIAGNÓSTICO DA CRANIOSSINOSTOSE POR CMA

DA CUNHA, Vivian Beatriz Penha*; GONÇALVES, Jaciara Sá; FROES, Yuri Nascimento; SILVA, Elen Sousa de Abreu; DE ALMEIDA, Marcelina Moraes; MARQUES, Felipe Albuquerque

Email: v_baldez@outlook.com

Curso: Farmácia

Resumo: A craniossinostose é definida pela fusão prematura das suturas craniais. Secundariamente, pode causar o aumento da pressão intracraniana, distúrbios visuais, auditivos e outras disfunções neurológicas. Vários genes já foram associados a esta patologia, porém alguns casos genéticos ainda se encontram sem solução que ainda não foram totalmente elucidados. Identificar esta e outras mutações relevantes a doenças genéticas é o principal objetivo da análise cromossômica em microarranjo (CMA), 14% a 22% dos casos de craniossinostose sindrômicas estão associados a rearranjos cromossômicos. Desta forma, o uso da técnica CMA mais especificamente para craniossinostose sindrômica. Os testes de CMA de pacientes portadores de craniossinostose, filho de pais normais sem registro de consanguinidade mostrou uma duplicação de 2,1 Mb na região subtelomérica do braço longo do cromossomo 17, e uma deleção de 1,4 Mb no braço curto do cromossomo 20. Portanto, o fato de 22% das craniossinostoses sindrômicas estarem associadas à rearranjos cromossômicos, torna indispensável o uso do CMA para a sua investigação.

DISPLASIA CLEIDOCRANIANA E SUAS REPERCUSSÕES ODONTOLÓGICAS

COSTA, Matheus Leonel; SILVEIRA, Luíza Carneiro; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; SOUSA, Rafaela Luiza Kich de; REIS, Juliana de Albuquerque; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Curso: Odontologia

Email: matheusleonelc@gmail.com

Resumo : A Displasia Cleidocraniana, também conhecida como Síndrome de Marie-Sainton, é uma patologia rara que tem a prevalência de 1:1.000.000, podendo ser causada por mutação genética do gene CBFA1, que tem papel de regular a diferenciação osteoblástica e a formação óssea, ou por uma herança autossômica dominante. Ela afeta principalmente ossos do crânio e da clavícula, mas envolve praticamente todo o esqueleto. Pacientes da displasia apresentam

hipoplasia de maxila, retardo na erupção dentária, retenção de dentes decíduos e presença de múltiplos supranumerários. Apresenta ainda ausência ou hipoplasia das clavículas, retardo na ossificação das suturas cranianas e manutenção das fontanelas abertas por longos períodos de tempo. O diagnóstico deve ser feito pelo dentista em conjunto com o ortopedista, com base em exames clínicos e radiográficos, os quais devem examinar o esqueleto, face e cavidade oral. Sua terapêutica ainda é bastante discutida, sendo o tratamento cirúrgico, protético e ortodôntico os mais comuns.

DOR OROFACIAL

MOREIRA, Blenda Montelo*; ARAÚJO, Ana Paula Ferreira Jansen; DOURADO, Michelle Brena Carvalho; VIEIRA, Renata Rocha; REIS, Itemberg Oliveira Dos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Email: blendamontelom@gmail.com

Tema: Dor Orofacial Alunos: Ana Paula Ferreira Jansen de Araújo, Blenda Montelo Moreira, Itemberg Oliveira Dos Reis, Michelle Brena Carvalho Dourado. Curso: Odontologia Turma: 170403 Professor orientador: Profa. Andrezza de Almeida Bastos Maciel A dor orofacial esta relacionada às estruturas faciais, e suas principais causas são: neurológicas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas e odontológicas. As causas odontológicas são mais frequentes, e não ocorre somente em dentes e gengivas, mas também nos ossos maxilares, músculos da mastigação, nervos cranianos, língua e Articulação Temporomandibular, tornando o cirurgião dentista obrigatório no diagnóstico e tratamento de pacientes com essas queixas. As dores crônicas orofaciais têm como causa mais comum Disfunções Temporomandibular, que relaciona-se a irregularidades dos músculos de mastigação, causando disfunção na mandíbula. As reclamações mais frequentes da DTM são dores que podem ser de face, ouvido, fundo dos olhos, cabeça ou pescoço. Esta ligado a alguns fatores, são eles: bruxismo, morder objetos, roer unha, mascar chiclete, má postura, estresse emocional e dores crônicas em alguma parte do organismo. Afeta milhares de pessoas, independente de sexo, idade ou raça, embora observe-se maior prevalência em mulheres na idade adulta. Felizmente, a maioria das DTM são benignas, entretanto, uma minoria pode ser de origem de tumores malignos ou de doenças graves, o que requer maiores cuidados e uma investigação minuciosa.

EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE: CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES DE UM COLÉGIO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO HPV E AO CÂNCER DE COLO UTERINO

SANTOS, Francimar Núria da Silva*; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; NORONHA, francisca maria ferreira; CORTEZ, Denise Carneiro Machado Cortez; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira

Email: denisecortez812@gmail.com

Área / Especialidade: Enfermagem

O HPV é um fator etiológico bem estabelecido para o câncer de colo de útero. O presente estudo teve por objetivo identificar o conhecimento de adolescentes de um colégio público em relação ao HPV e ao Câncer de colo uterino. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 26 artigos nacionais que atenderam aos critérios de inclusão e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma português, publicados no período de 2000 a 2015. A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro e março de 2016. Dos artigos estudados quanto ao conhecimento, 80,0% das adolescentes afirmaram que HPV é um vírus, enquanto que 11% não sabiam ou não lembravam. No que tange a forma como ocorre à transmissão do HPV, 81% das adolescentes estudadas asseguraram que a transmissão ocorre por relação sexual, mais de 90% das pessoas conseguem eliminar o vírus do HPV do organismo naturalmente, sem ter manifestações clínicas. Assim, conclui-se que são necessários investimentos no desenvolvimento de práticas de promoção à saúde para modificar este quadro. Nesse sentido, é preciso que seja revista a educação sexual nas instituições de ensino para que essas ofereçam suporte educacional em saúde para estas jovens. Palavras-chave: Adolescentes. HPV. Câncer de colo uterino.

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PARA USUÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE PIRAPORA

CISTA, Dalila Moraes da*; RAMOS, Ildilene Silva; Elinaura dos Santos Pereira; Laís Fernanda Cruz Roza; Sara Carvalho Melo; Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira de Carvalho ; Renato Batista Silva Lima.

Email: dalilamoraes76@gmail.com

Curso: Fisioterapia

As propostas de Educação Popular em Saúde constituem um meio de disseminação de conhecimento científico, através de uma linguagem acessível ao público leigo, abordando temáticas relacionadas à saúde pública preconizadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde. Assim, este projeto de extensão objetivou oferecer aos usuários da Unidade Saúde da Família (USF) Pirapora ações de educação para a saúde sobre Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Hanseníase e quedas em idosos, e consolidar competências e habilidades dos discentes de Fisioterapia da Universidade CEUMA relacionadas à realização de ações de educação para a saúde junto à comunidade. Os participantes deste projeto foram usuários da USF Pirapora, de ambos os gêneros. Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico, capacitação dos discentes, elaboração de cartilha educativa e divulgação do projeto na comunidade. Posteriormente, foram realizados os encontros na USF, em que eram feitas ações

de Educação para a Saúde, através de oficinas, palestras e distribuição de cartilhas. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa através do parecer número 1.516.267 e foi financiado pela Fapema (Edital UTN). A participação ativa da comunidade neste projeto indica um público interessado em se ponderar de conhecimentos científicos sobre a saúde e a necessidade de se realizar mais ações de educação para a saúde. Este projeto colaborou para que os alunos se tornassem conscientes da importância de realizar ações de educação para a saúde na comunidade de forma ética e humanizada e quanto à importância de se realizar

Palavras-chave: Fisioterapia, Atenção Básica, Educação para a saúde.

ENDOCARDITE BACTERIANA

ARAÚJO, Leanderson Cutrim*; OLIVEIRA, Italo Afonso Siqueira; COELHO, Luciano André da Silva; LIMEIRA, Herick Cruz; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos Maciel
Email: leo.cutrim@icloud.com

Área / Especialidade: Odontologia

Endocardite bacteriana é uma inflamação que afeta as válvulas e o tecido que reveste o coração (endocárdio), devido à presença de bactérias ou fungos que chegam ao coração através da circulação sanguínea. Normalmente a doença acontece quando uma bactéria ou germes de outra parte do corpo, como os da boca, se espalham pelo sistema sanguíneo se ligando a áreas afetadas do coração. A endocardite é incomum em pessoas com coração saudável. Algumas causas da endocardite bacteriana podem ser o uso de drogas injetáveis, piercings na boca ou na língua ou a realização de tratamentos dentários de pacientes debilitados sistemicamente ou que possuem alguma doença sistêmica na qual estejam descompensados, sem uso de antibióticos antes, ou seja pode ser adquirida por uma iatrogenia do profissional A por negligência. No entanto, a causa mais comum consiste em possuir alguma má formação cardíaca ou uma lesão na válvula cardíaca. Se não reconhecida e tratada a tempo, a endocardite infecciosa destrói a válvula cardíaca acometida, levando o paciente a um quadro de insuficiência cardíaca aguda e grave. Este trabalho tem o intuito científico de informar acerca da doença, de como pode acontecer, quem pode acometer e como pode-se evitar e tratar a mesma.

EFEITOS DOS MEDICAMENTOS NA CAVIDADE BUCAL

OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos*; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; QUEIROZ, Amanda Franc; ARAÚJO, Evellyn Karyne Oliveira; LUNA, Monique Barcelos; GALVÃO, Lívia Câmara De Carvalho; CALVET, Clélea De Oliveira;

Curso: Odontologia.

E-mail: sidney-12@hotmail.com

Os Medicamento são produtos farmacêuticos elaborados com o objetivo de prevenir ou tratar determinada enfermidade. Entretanto, alguns podem gerar efeitos indesejáveis na cavidade bucal. A estomatite ou inflamação da mucosa bucal é uma das consequências mais comum resultante da administração de alguns medicamentos. A estomatite pode estar clinicamente caracterizada como eritema, acompanhado geralmente de dor. Essas reações podem resultar do uso de drogas anti-neoplásicas, da alergia a droga ou por contato direto na mucosa. Frente a isso o presente estudo tem como objetivo descrever através de uma revisão de literatura os principais medicamentos envolvidos no aparecimento de lesões bucais afim capacitar o cirurgião-dentista para um correto diagnóstico e uma adequada conduta clínica.

EFEITOS CAUSADOS NA SAÚDE DOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO PERÍODO NOTURNO

DE OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes*; FONSECA, Jéssica Silva; BRANDÃO JÚNIOR, Edimilson da Silva; DE MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes; ALMEIDA, Jéssica Sirlan Aragão; ALVES, Cândida Helena Lopes

Curso: Psicologia

Email: alessandra.oliveira06@hotmail.com

O sono é concebido como um estado fisiológico e periódico da atividade cerebral, caracterizado por mudanças da consciência, postura própria, atribuições motoras, diminuição dos estímulos do ambiente. Este estudo teve por objetivo explicar as alterações cognitivas e os efeitos sobre a qualidade de vida dos policiais, diante a perda do sono adequado. Trata-se de um estudo realizado através de uma revisão bibliográfica, por meio de consultas da base de dados SCIELO, pesquisa em livros e noutros artigos científicos, publicados entre 2010 e 2016. Através desse estudo foi constatado que o trabalho efetivado durante o período noturno tem gerado alterações no quadro biológico que consequentemente levam a implicações na saúde destes sujeitos, sendo alterações de ordem física, psicológica, cognitiva e na vida social. Dito isso, podem ocorrer problemas respiratórios, cardiovasculares, metabólicos, acidente vascular cerebral, diabetes, hipertensão e a falta de atenção. A carga elevada de estresse, juntamente com outros fatores colocam o exercício da profissão em risco, podendo levar ao sofrimento. Além disso, muito das vezes o tempo voltado para o trabalho, as horas extras, a escala de serviço, podem afetar as relações pessoais. Dessa forma, concluímos que o sono é imprescindível ao homem, as alterações tanto qualitativamente e quantitativamente, podem findar em prejuízos nas suas atividades laborais, rotineiras e no desempenho ocupacional dos

policiais. Contudo, ficou notória a carência de pesquisas que abordem as consequências das alterações do sono em policiais.

ENVELHECER COM BELEZA

RAMOS, Ayriane de Oliveira*; BACELAR, Solange de Almeida; BOAS, Michele Villas; GRIZOTO, Rosely; DE CARVALHO, Sarah Tarcisia Rebelo Ferreira; PENHA, Ludmilia Rodrigues Lima; LUSTOSA, Igor

Email: ayrianeoliveiraramos@hotmail.com

Curso: Estética

Resumo: O envelhecimento é um processo natural e inevitável do ciclo de vida que gera transformações biopsicossociais. No entanto, com o avanço de algumas técnicas e procedimentos estéticos, pôde-se prevenir algumas consequências do envelhecimento que prejudicam a autoestima e a qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, foi desenvolvido o Projeto de extensão Envelhecer com Beleza, realizado na clínica escola de estética da Universidade Ceuma, com discentes do Curso de Graduação em Estética desta Instituição. O projeto tem como objetivo realizar tratamentos estéticos para o rejuvenescimento de idosos, visando elevar a autoestima destas pessoas. Assim, os discentes envolvidos, sob a supervisão de professores competentes, realizam um programa de cuidados antiidade, incluindo massoterapia, eletroterapia, drenagem linfática manual, limpeza de pele e cosmiatria para pessoas que buscam atendimento na clínica escola. Com o projeto de extensão, visa-se desenvolver competências e habilidade nos alunos do Curso de estética, sendo um momento em que se pode promover contato direto com clientes e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Ao mesmo tempo, beneficia-se a comunidade através da fácil acessibilidade aos procedimentos e técnicas de estéticas de qualidade. Palavras- chave: Envelhecimento, Beleza, estética.

EROSÃO E SENSIBILIDADE DENTINÁRIA

CAMPOS, Lara Ferraz*; GOMES, Isabella Azevedo; CARNEIRO, Karina Gama Kato; BENINI, Marco Aurélio Paschoal; GONÇALVES, Letícia Machado; KUSSANO, Sandro Carvalho; FIALHO; Melissa Proença Nogueira

Curso: Odontologia

Email: laraFerraz96@hotmail.com

O desgaste dental é freqüentemente diagnosticado na prática clínica odontológica atual, podendo ocorrer de várias formas e atingir regiões dentais específicas. Quando a perda de estrutura dental envolve a ação química de substâncias ácidas é chamada de erosão ou

perimólise. A erosão dental é definida como perda progressiva e irreversível de estrutura dental provocada por processos químicos que não envolvam ação bacteriana. Essa condição tem sido associada a diversas desordens alimentares, como bulimia e anorexia, dentre outras alterações sistêmicas. A erosão dental começa com a desmineralização das camadas superficiais do esmalte, podendo evoluir para perda importante de estrutura dental. Os fatores extrínsecos incluem bebidas ácidas ou carbonatadas, alimentos ácidos, pastilhas cítricas, alguns medicamentos, substitutos salivares, exposição à água de piscina com cloro e trabalho em indústrias de agentes corrosivos, como vapor ácido de bateria e indústria de aerossóis. Os fatores intrínsecos da erosão dental incluem bulimia, anorexia, refluxo gástrico voluntário, regurgitação subclínica devido à gastrite crônica associada ao alcoolismo, vômito crônico durante a gestação, xerostomia e doença do refluxo gastroesofágico. A hipersensibilidade dentinária é uma condição clínica odontológica relativamente comum e dolorosa da dentição permanente, manifestando-se de maneira desconfortável para o paciente. A superfície dentinária começa a causar algum grau de hipersensibilidade somente quando exposta ao meio bucal após o desgaste das estruturas de proteção (esmalte, cimento), expondo, dessa forma, os túbulos dentinários. A dor apresenta-se de forma aguda e transitória, causada por estímulos mecânicos, térmicos, químicos e osmóticos. Pode ocorrer remissão espontânea, por remineralização pela saliva ou pela formação de dentina reacional. Uma alternativa de tratamento pode basear-se na diminuição ou bloqueio da movimentação de fluidos no interior dos túbulos dentinários.

ERUPÇÃO, REABSORÇÃO E RIZÓLISE

OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos*; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; ALMEIDA, Valéria da silva; DOS SANTOS, Weliton Lopes; BARROS, Lívia Carneiro; CALVET, Clélea de Oliveira; CASTRO, Ana Carolina

Email: sidney-12@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A erupção dentária é o fenômeno pelo qual o dente rompe o tecido gengival em direção à posição de oclusão na cavidade bucal. O ser humano possui uma dentição difiodonto, apresentando assim duas dentições onde a dentição decídua é substituída pela dentição permanente. Para que se realize essa substituição é necessário que ocorra a rizólise, fenômeno fisiológico de reabsorção radicular da dentição decídua causada geralmente por pressão da dentição permanente. Essa reabsorção é fisiológica e consiste em absorver substâncias da raiz do decíduo favorecendo a formação e erupção do dente permanente. Ressaltamos que os molares permanentes erupcionam sem antecessores decíduos.

ENVELHECIMENTO E METACOGNIÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DUTRA, Grazielle Caldas*; JUNIOR, Gilberto Assunção Costa; JUNIOR, Edmilson Da Silva Brandão; MELO, Eliane Ribeiro Magalhães De Souza Fortes De; MATOS, Mireya Alice Morais; ALVES, Cândida Helena Lopes

Email: grazi.dutra@hotmail.com

Curso: Psicologia

Tendo em vista a tendência mundial ao exponencial crescimento da população idosa, o presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que foi realizada dentro de uma abordagem qualitativa com base em análise de conteúdo sobre os achados nas produções científicas nacionais e internacionais relacionadas a Metacognição e a possibilidade de seu uso com o público idoso. De acordo com as pesquisas realizadas, os trabalhos encontrados nas bibliotecas virtuais Scielo, Lilacs e ScienceDirect com ano de publicação entre 2010 à 2015 somam um total de noventa e seis publicações sobre metacognição e apenas dois trabalhos que fazem ligação entre envelhecimento e metacognição. Com base nos resultados da pesquisa, dos dados e discussões sobre os fenômenos comuns que acompanham o uso da metacognição para o público idoso, entende-se que a metacognição vem possibilitando uma nova forma de olhar e entender toda e qualquer mudança que é esperada na velhice, fazendo do envelhecimento uma fase proveitosa, ativa e funcional. Palavras-chave: Metacognição. Envelhecimento. Saúde do idoso.

EXAME CLÍNICO PERIODONTAL

SILVA, Patricia Oliveira De Carvalho; MELO, Raquel Conceição Costa; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena De Araujo Castro

Curso: Odontologia

Email: OCS.PATY@hotmail.com

Resumo: As doenças periodontais são comumente encontradas no atendimento na clínica diária de um cirurgião-dentista. Como patologias silenciosas, que geralmente não apresentam sintomatologia dolorosa, nem impacto social em suas fases iniciais, é comum deparar-se com casos onde a doença encontra-se estabelecida e severa. Dentro de sua classificação, podem ser divididas em gengivite e periodontite. A gengivite, uma inflamação restrita aos tecidos de proteção, tem como características um aspecto edemaciado, avermelhado e liso nas gengivas, apresentando sangramento espontâneo à sondagem. Já a periodontite pode ser diferenciada da gengivite pelo envolvimento dos tecidos de inserção dos dentes, o cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar, desencadeado um processo de reabsorção tecidual podendo progredir para a perda do elemento dentário. O diagnóstico das doenças periodontais é

realizado para se definir o estado de saúde ou doença dos tecidos de proteção e inserção dos dentes, sendo a sondagem o padrão ouro em tal quesito. Os objetivos da sondagem são detectar o sangramento espontâneo e medir o nível gengival e a profundidade clínica de sondagem determinando a perda de inserção de um dente. Baseado em tais princípios, o cirurgião-dentista pode detectar doenças periodontais e seus índices de gravidade e extensão, para, enfim, elaborar um correto plano de tratamento, podendo então iniciar procedimentos com o objetivo de remover focos de infecção e inflamação para a completa reabilitação do paciente.

EXPRESSÃO HETERÓLOGA COMO FERRAMENTA PARA A PRODUÇÃO DE MOLÉCULAS COM ATIVIDADE FARMACOLÓGICA.

MOREIRA, Andréa Maria Ribeiro*; MARANHÃO, Shyrlucy Vieira; VIANA, Juliane Flávia Cançado.
Email: andreamaria1410@hotmail.com

Curso: Biomedicina

A expressão heteróloga surgiu a partir da tecnologia do DNA recombinante e é utilizada na expressão de um gene num organismo hospedeiro. Esta tecnologia vem sendo utilizada no desenvolvimento de culturas resistentes a patógenos, mas principalmente na produção de moléculas com potencial atividade farmacológica. Para tanto, existem variados sistemas de expressão, tais como, a expressão em células de leveduras, bactérias e plantas. REVISÃO: Um estudo recente mostrou que os principais hospedeiros utilizados para a produção de moléculas são bactérias e leveduras, o que representa 97,4% dos peptídeos antimicrobianos (PAMS). O peptídeo antimicrobiano CM4, isolado do *Bombyx mori* foi expresso em *Escherichia coli*, bactéria mais utilizada na produção de moléculas de interesse farmacológico devido à facilidade de manipulação genética, baixo custo, e uma vasta diversidade de vetores de expressão. Dentre as leveduras, as *Saccharomyces cerevisiae* e *Pichia pastoris* são as mais utilizadas, sendo esta última utilizada para a produção da quimera LTB/GnRH visando sua utilização como imun contraceptivo. Em outra abordagem, plantas geneticamente modificadas surgiram, também, como um hospedeiro promissor de expressão. Batatas transgênicas apresentaram resistência contra os fitopatógenos *Rhizoctonia solani* e *Fusarium solani* após a inserção de três genes (AP24-dermaseptina-lisozima) que, quando expressos, apresentavam atividade contra esses microrganismos. CONCLUSÃO: O avanço da tecnologia do DNA recombinante possibilitou produzir moléculas de interesse farmacêutico ou agropecuário facilitando a sua produção em grande escala. A produção dessas moléculas por técnicas biotecnológicas pode ampliar seu uso em diferentes setores, além dos conhecimentos acerca de seu modo de ação sobre os organismos patogênicos.

EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE PROTEÍNAS DO VÍRUS DA DENGUE E SEU EMPREGO EM TESTES DIAGNÓSTICOS

GONZAGA, Laoane Freitas; FERREIRA, Hevyla Judith Pinto; EVERTON, Karina Araujo; RIBEIRO, Alanna Rubia; VIANA, Juliane Flávia Cançado; ALBUQUERQUE, Felipe Marques

Curso: Farmácia

Email: laoane_freitas@hotmail.com

Resumo: Introdução: A dengue é uma doença que afeta o mundo. Revisão: Devido à demanda de muitas pessoas infectadas pelo vírus da dengue, procura-se um método que seja fácil, específico e de baixo custo para o diagnóstico em massa. O diagnóstico aplicado é o teste de ELISA para detecção de anticorpos IgG, IgM, ou NS1. Porém, problemas de reação cruzada no teste de ELISA podem ocorrer devido à natureza da produção dos antígenos em camundongos ou em culturas de células que necessitam de purificação para o uso diagnóstico. Objetivando diminuir a possibilidade de reações cruzadas e o tempo de espera para o resultado, Maldaner e colaboradores (2013) expressaram o antígeno tetra-epitopo (proteína E) dos 4 sorotipos do vírus da dengue em cloroplastos de alface. A proteína E foi isolada e cloroplastos do alface foram transformados para a expressão da molécula. Os resultados demonstraram a detecção sorológica de anticorpos IgG contra os 4 sorotipos da dengue a partir do emprego do extrato bruto proteico de cloroplastos sem purificação. Em outra abordagem, a proteína do envelope do vírus da dengue EDIII foi expressa em cloroplasto de tabaco para a produção de vacinas contra a dengue (Gottschamel et al 2016). Conclusão: Os resultados mostraram o potencial de identificação sorológica de anticorpos IgG a partir da produção de proteínas em plantas.

FADIGA MUSCULAR: ÁCIDO LÁTICO OU LACTATO?(REVISÃO LITERATURA)

ARAUJO, Rui Guilherme Barros; PINHEIRO, Gleyce Kelle Cardoso; COSTA, Alana Dias; GOME, Isabella Alice Rosa; MADEIRA, Ana Paula Pinheiro; DE SOUSA, Leila Cristina Almeida

Curso: Educação Física

Email: leila-sousa@uol.com.br

A fadiga muscular tem-se revelado como um dos tópicos centrais na investigação em fisiologia do exercício. No entanto, os mecanismos precisos associados à sua etiologia encontram-se ainda por determinar. O objetivo desse trabalho foi apresentar os principais eventos que envolvem o metabolismo do lactato muscular, de modo a favorecer a compreensão acerca da utilização das concentrações sanguíneas de lactato na estimativa do metabolismo anaeróbio láctico e a sua possível relação com a fadiga muscular aguda, baseadas numa revisão de literatura com dados de artigos Scielo, USP e PUBMED, que tinham em seu título as palavras-chave “fadiga muscular”, além de sites brasileiros especializados no assunto. Revisão: O início da atividade muscular

voluntária envolve muitos processos que começam com o controle cortical no cérebro e terminam com a formação das pontes cruzadas dentro da fibra muscular. A produção do lactato durante a atividade muscular foi considerada, por muito tempo, como um produto final da degradação parcial do glicogênio/glicose, em razão da baixa disponibilidade do oxigênio mitocondrial. A fadiga muscular pode ser compreendida como a incapacidade de gerar determinados níveis de força em função de seus mecanismos indutores de origem central ou periférica. O ácido láctico diferencia-se do lactato: Não se pode atribuir ao ácido láctico a culpabilidade da acidose produzida durante o exercício intenso, pois o mesmo não é produzido a ponto de conseguir causá-la, da mesma forma como o lactato não pode sê-lo, levando em consideração sua participação no sistema de tamponamento.

FAMÍLIA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA: DO LUTO DO FILHO IDEAL À INCLUSÃO SOCIAL

FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; LIMA, Rusiane Brito; SANTOS, Alison Reis; VIANA, Otavio Wellington Rodrigues; LEITE, Zinole Helena Martins.

Curso: Psicologia

Email: celia.ufma@gmail.com

Antes mesmo da gestação, uma série de expectativas, habitam o imaginário de uma família, quando do nascimento de um filho. Espera-se que este novo membro continue a história familiar e retrate seus ideais, inclusive em relação à perfeição e beleza. A chegada de um filho com deficiência afeta consideravelmente a dinâmica familiar. Objetiva-se com esta pesquisa bibliográfica descrever as mudanças na dinâmica familiar decorrentes do diagnóstico de um filho com deficiência. Analisou-se livros e 17 artigos científicos publicados a partir de 2011, disponíveis nas seguintes bases de dados: SCIELO (www.scielo.br) e Google Acadêmico (scholar.google.pt), através das palavras-chave: “sofrimento familiar”, “filho ideal” e “deficiência”. Revisão: Pais especiais expressam desejo de morte dos filhos com deficiência, após o diagnóstico. Casais com um filho normal provavelmente não engravidam após ter um filho deficiente, porém se este for o primogênito, há probabilidade de outra gravidez. Mães comumente buscam as causas das deficiências. A culpa pela perda do filho ideal é o sentimento mais frequente entre os pais. Conclusão: A dinâmica familiar altera-se com o nascimento de um filho com deficiência. Sentimentos de culpa, rejeição, negação, vergonha ou desespero estão na base dessas alterações. Pressões internas e externas serão vivenciadas pela família, uma vez que a sociedade tem dificuldade em conviver com as diferenças.

FATORES ASSOCIADOS À DOR ENTRE SESSÕES DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES DESPOLDADOS

DOS SANTOS, Rianna Marques*; COSTA, Camila Marão; QUEIROZ, Jefferson De Brito; MARTINS, Jéssica Belluomini Chagas Ramos; JUNIOR, Wlisses Furtado Muniz; MARQUES, Tárzia Virgínia Falcão; RIZZI, Cláudia De Castro

Email: rianna_ms@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Os avanços tecnológicos e científicos no tratamento endodôntico têm permitido um aumento dos índices de sucesso dessa terapia, entretanto, certas complicações como dor e/ou inchaço podem ocorrer entre as sessões. A dor pós-operatória é um problema contínuo e de indesejável ocorrência na prática endodôntica, que pode ser desenvolvida por fatores mecânicos, químicos ou injúria microbiana à polpa ou tecidos perirradiculares. A persistência dos microrganismos no canal radicular após o preparo químico-mecânico e/ou obturação é a principal causa do fracasso do tratamento endodôntico e de flare-ups. A ocorrência de flare-ups ou dor grave e inchaço é uma ocorrência bastante incomum, revelando os estudos que a incidência varia de 1,4% a 16%. Algumas bactérias anaeróbicas gram-negativas podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de inflamações perirradiculares e gerar, como consequência, a dor pós-operatória a partir do aumento da permeabilidade vascular, sendo a intensidade da resposta inflamatória perirradicular diretamente proporcional à intensidade da lesão nos tecidos. A presente revisão tem como objetivo expor os fatores associados com a ocorrência de dor entre as sessões do tratamento endodôntico, para que o profissional possa atuar de maneira eficaz na causa e resolução da sintomatologia e conduzir o tratamento endodôntico sem maiores intercorrências trans-operatórias.

FATORES DE VIRULÊNCIA EXPRESSOS POR CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE

FONTENELLE, Pedro Henrique Cunha*; COUTINHO, Gabrielle Guedes; DUTRA, Rodrigo Bênetton da Conceição; ALVES, Eldimara Santos; SOUZA, Nicolly Guerra Amorim; SABBADINI, Priscila Soares; FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo.

Curso: Biomedicina

Email: pedrohfontenelle@hotmail.com

Corynebacterium diphtheriae é o principal agente etiológico da difteria, doença que acomete primariamente o trato respiratório. O objetivo do trabalho foi explicar a respeito dos diversos fatores de virulência que o micro-organismo pode utilizar para lesar o hospedeiro humano e o mais bem estudado é a toxina diftérica, que é capaz de fazer clivagens internucleossomais de DNA, além de inibir a síntese proteica. Já foi descrita para o micro-organismo a produção de coagulase. Como fatores de dispersão dentro do organismo humano, destacam-se as enzimas DNase e hialuronidase, mas *C. diphtheriae* também expressa a trans-sialidase, que está

envolvida na aquisição de ácido siálico a partir de um substrato doador e favorece a proteção do micro-organismo contra o reconhecimento pelo sistema imune; e neuraminidases, que atuam na exposição de receptores das adesinas bacterianas. Pilis, lipoarabinomana (CDiLAM) e proteínas DIP1281 e DIP0733 participam do processo infeccioso como adesinas e/ou invasinas de células eucarióticas, sendo a última também caracterizada como hemaglutinina e indutora de apoptose. A capacidade de *C. diphtheriae* formar biofilme em superfícies abióticas e bióticas foi correlacionada com sua hidrofobicidade e favorece a resistência aos antimicrobianos, que já foi descrita para o micro-organismo. As investigações dos mecanismos de virulência expressos por *C. diphtheriae* foram intensificadas, entretanto, ainda são necessárias pesquisas, uma vez que surtos da doença continuam acometendo uma parte significativa da população, principalmente de países em desenvolvimento e que quadros atípicos relacionados a doença estão ganhando notoriedade.

FATORES QUE INFLUENCIAM O APARECIMENTO DE DIABETES GESTACIONAL

MARTINS, Debora Bastos*; ARAUJO, Eliane Sousa; ABREU, Elinis da Costa; RIBEIRO, Fabiane; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: debie.bastos@hotmail.com

O Diabetes gestacional também conhecido como diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como uma alteração no metabolismo dos carboidratos, que determina a hiperglicemia variável, diagnosticada na gestação, que pode ou não perpetuar-se após o parto. A gestação é um estado hiperinsulinêmico caracterizado por uma diminuição da sensibilidade à insulina, parcialmente explicada pela presença de hormônios diabetogênicos, tais como a progesterona, o cortisol, a prolactina e o hormônio lactogênico placentário. Na gestação os níveis glicêmicos de jejum tendem a ser mais baixos na gestante, contudo, os valores pós-prandiais são mais altos. Tratou-se de um estudo cuja pesquisa foi de forma integrativa da literatura, com finalidade de juntar e resumir o conhecimento científico já publicado sobre o tema investigado. A pesquisa foi realizada de forma ordenada, respectivamente, UfrGS, SciELO e Yimg; estas publicações foram selecionadas diante da temática estudada. Conclui-se que o diabetes gestacional é uma doença que pode acometer mulheres em várias condições, porém existem alguns fatores de riscos associados como, idade superior a 25 anos, história pessoal, antecedente familiar de diabetes, antecedente obstétrico (macrossomia, polidrâmio, morte fetal ou neonatal de causa desconhecida, malformações congênitas e restrição do crescimento fetal), exame obstétrico atual evidenciando: ganho de peso excessivo, altura uterina maior do que a esperada para idade gestacional, crescimento fetal excessivo e polidrâmio.

FIBROMIALGIA E SEU TRATAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO COM ANTIDEPRESSIVOS

SILVA, Maria Victória Souto; VIANA, Juliane Flávia Cançado

Curso: farmácia

Email: mariavictoriasouto@hotmail.com

Resumo: FIBROMIALGIA E SEU TRATAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO COM ANTIDEPRESSIVOS

SOUTO SILVA, Maria Victória; VIANA, Juliane Flávia Cançado
Introdução: A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, caracterizada principalmente pela dor no corpo, especificamente nos músculos e articulações. Revisão: Além da maior sensibilidade à dor, pacientes portadores de fibromialgia também apresentam sintomas como: fadiga, rigidez, sono não reparador, cefaleia, ansiedade, depressão, alterações na memória e no funcionamento do intestino. As causas da fibromialgia ainda não foram descobertas, mas podem estar relacionadas a estresse pós-traumático, trauma físico ou predisposição genética. Teorias atuais explicam que há uma alteração nos mecanismos de controle da dor no sistema nervoso central. Dentre os tratamentos farmacoterapêuticos, os antidepressivos consistem em uma das principais indicações para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Estes fármacos são eficazes no tratamento da fibromialgia porque aumentam a concentração do neurotransmissor serotonina na fenda sináptica, diminuindo a dor. As classes de antidepressivos mais utilizadas são antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, que agem bloqueando os transportadores de noradrenalina, dopamina e serotonina, melhorando os distúrbios do sono e as alterações de humor. Já fluoxetina, um inibidor seletivo de receptação da serotonina, é usada em associação com a amitriptilina potencializando o efeito do antidepressivo tricíclico, apresentando efeitos mais satisfatórios no alívio da dor, melhoria na qualidade do sono e diminuição dos sintomas recorrentes. Conclusão: Assim, o uso de antidepressivos deve ser monitorado e acompanhado por um médico e seu uso com doses cautelosas ou em curto prazo de tratamento. Além disso, os casos devem ser analisados separadamente, pois os efeitos colaterais podem ser diferentes em cada um dos pacientes.

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA: DA PRÁTICA CLÍNICA AO MARKETING PROFISSIONAL.

CASTRO, Igor Renault Marques Castro; FAUSTO, Brenda Pereira; TEIXEIR, Ariella de Sousa; SILVA, Jéssica Renata Santos Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, FRANCISCO JOSÉ LIMA

Curso: odontologia

Email: igorrenault@icloud.com

Resumo : Com o avanço da odontologia, a fotografia tornou-se um instrumento precioso nas mãos de cirurgiões-dentistas, podendo ser utilizadas para fins estéticos e documentais, em casos de cirurgias e tratamentos ortodônticos. Para possuir uma boa tomada fotográfica, requer técnica e prática. Sendo ela primorosa, o profissional poderá utilizá-la para o marketing do seu próprio negócio. A fotografia odontológica pode ser discernida de duas formas, uma para documentação, e outra para divulgação para o público leigo. Vale ressaltar que este tipo de procedimento, principalmente quando envolve a face, há uma necessidade de adquirir uma autorização por escrito do paciente, na qual ele permita que a sua imagem seja veiculada na mídia sem que possa causar futuros transtornos. Quando se envolve casos estéticos, é necessário realizar um planejamento digital do sorriso com sobreposição de linhas sobre fotografias intraorais e da face, conseqüentemente, possibilitando uma interpretação mais detalhada do caso. Uma outra estratégia que é bastante utilizada na fotografia, é o fundo preto, a técnica consiste no uso de algum objeto preferencialmente da cor preta, que proporciona melhores resultados, o plano de fundo tem a função de enfatizar os dentes e eliminar estruturas indesejáveis na fotografia. Estes fundos podem ser fabricados com papel, metal ou plástico. Atualmente, existem vários modelos de câmeras fotográficas, cabe ao cirurgião-dentista, classificá-las e escolher aquela que ele julga como necessária em suas atividades. É importante selecionar uma boa câmera para os procedimentos estéticos, uma boa imagem, torna o diagnóstico mais eficaz e garante um poder de convencimento maior.

FREQUÊNCIA DE CARTEIRAS DE VACINAS ATRASADAS EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS

SILVA, Pollyana Marreiros*; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; MONTEIRO, Pablo De Matos; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A vacinação infantil é essencial ao bom desenvolvimento da saúde da criança, pois previne que a mesma adquira doenças graves na infância, que podem causar sequelas e até óbitos. Embora seja constatada a importância da vacinação para a saúde da criança, ainda existe o não cumprimento do calendário vacinal por alguns pais ou responsáveis. Neste sentido, teve-se como objetivo deste estudo avaliar a frequência de carteiras de vacinas atrasadas em crianças de 0 a 4 anos em uma unidade básica de saúde de São Luís – MA. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Base de Dados em Enfermagem e Banco Virtual de Saúde. Foram selecionados 24 artigos nacionais e que atenderam aos critérios de inclusão e livros técnicos que abordaram a temática, em idioma

português, publicados no período de 2002 a 2015. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2015 a março de 2016. Concluiu-se que uma grande prevalência de carteiras de vacinação em atraso, entre as vacinas em atraso destacaram-se a vacina Pneumocócica 10, Meningocócica C, ambas aos 12 meses e a Penta aos 15 meses. O principal motivo do atraso vacinal foi o esquecimento. As pesquisas demonstram uma associação do bom nível escolar das mães/responsáveis pelas crianças e o atendimento ao calendário de vacinação infantil, favorecendo a prevenção em saúde, e posteriormente o bom desenvolvimento e crescimento infantil. Descritores: Vacinas. Atraso. Crianças.

FUTEBOL, PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

SIQUEIRA, Wallace Silva De*; PEDROSA, Letícia De Moraes; DUTRA, Grazielle Caldas; CUTRIM, Bárbara Esther Silva; FERREIRA, Willyane De Oliveira; LEITE, Zinole Helena Martins; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Email: profzinoleite@gmail.com

Curso: Psicologia

Introdução: O futebol enquanto prática esportiva é uma atividade coletiva e lúdica, e por ser promotora de satisfação aos seus praticantes tornou-se popular em todos os continentes e ainda mais no Brasil, sendo incorporado em diversos âmbitos da sociedade. O objetivo deste estudo bibliográfico, descritivo, exploratório e qualitativo é descrever o papel do futebol no desenvolvimento psicomotor na primeira infância. Procedeu-se à leitura e análise de livros e trinta e dois artigos sobre a temática, disponíveis nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde através das seguintes palavras chaves: Futebol. Infância. Psicomotricidade. Foram inclusos artigos compreendidos no período de 2006 a 2016. Revisão: Enquanto prática desportiva, o Futebol, uma Paixão Mundial, favorece à criança experiência os limites do seu próprio corpo, a socialização e o desenvolvimento de inúmeras habilidades psicomotoras funcionais e relacionais. A infância é um período de suma importância para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, o que pode ser favorecido pela prática desportiva. Através do esporte conteúdos relativos à vida social são internalizados, tais como valores, regras, tolerância à frustração, os quais contribuem para a formação integral do indivíduo. Os benefícios da prática desportiva estendem-se a toda a vida psíquica dos indivíduos. Conclusão: O desenvolvimento psicomotor permite também a estruturação da personalidade nos seus diferentes aspectos: afetivo-social, cognitivo, motor e moral, o que pode ser dá por meio do Futebol, uma prática desportiva demasiadamente popular no Brasil. Palavras-chaves: Futebol. Infância. Psicomotricidade.

GÊNERO E EDUCAÇÃO: IMPACTOS NO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS NO ÂMBITO ESCOLAR

SOUSA, Thalita de Fátima Aranha Barbosa*; SERRA, Melina; BECKMAN, Marcia Valeria Reis

Curso: Psicologia

Email: thalitafabs@hotmail.com

Sabe-se que as lutas e discussões pela igualdade de gênero e até mesmo pelo respeito a diversidade tem se tornado algo constante em todo o país. Ainda assim, percebe-se uma persistência de atitudes discriminatórias, realidade frequentemente encarada de forma natural. Mesmo as questões de gênero fazendo parte do currículo das escolas, estas e os próprios professores não estão preparados para lidar com algumas situações relacionadas a esta temática. Destaca-se ainda que, algumas situações continuam persistentes na escola, seja a abordagem diferenciada entre meninos e meninas, como os papéis sociais representados por eles. Por essas razões, este estudo objetiva, através de uma revisão de literatura, compreender como a questão de gênero se relaciona com a educação das crianças no âmbito escolar, impactando em seus comportamentos e papéis sociais. A partir da literatura consultada, conclui-se que, diante dos desafios expostos, das necessidades de transformações sociais e da limitação existente no âmbito escolar, a inserção da temática gênero das escolas, assim como as eventuais práticas de trabalhos realizados neste contexto, devem ser repensados de forma a contribuir, decisivamente, na desconstrução de antigos paradigmas e, ao mesmo tempo, na construção de novos paradigmas. Nesta perspectiva, este trabalho visa contribuir com a discussão, em especial no estado do Maranhão, reforçando a necessidade de pesquisas de campo que investiguem nossa realidade, com o intuito de levantar novas discussões e avanços acerca desta temática. Palavra-chave: Gênero. Educação. Escola.

HALITOSE: DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO

MELO, Gonçalo Filipe Araújo*; ARAGAO, Mariana Monica Costa; MOREIRA, Ana Regina Oliveira

Email: drgoncalomelo@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A halitose é uma alteração do hálito que afeta negativamente a vida psicossocial do indivíduo e apresenta alta prevalência. Assim, o objetivo do presente trabalho é revisar a literatura a respeito dos métodos de diagnóstico da halitose e adequado manejo terapêutico. A etiologia da halitose está relacionada à presença de substância odoríferas no ar exalado, especialmente compostos sulfurosos voláteis produzidos por bactérias. O diagnóstico pode ser realizado por diversos métodos, seja pela utilização de aparelhos e instrumentos específicos, seja pelo método organoléptico, realizado por meio da percepção olfativa do cirurgião-dentista. O manejo clínico inclui abordagens intraorais, principalmente relacionadas ao tratamento de

doença periodontal e instruções de higiene oral, incluindo a língua. Métodos químicos auxiliares para o controle da halitose também tem sido propostos. Evidenciou-se que o teste organoléptico é o padrão-ouro no diagnóstico da halitose e que abordagens de tratamento intraorais são bem sucedidas.

HANSENÍASE: O PRECONCEITO VIVENCIADO POR PORTADORES DA DOENÇA

FERREIRA, Fabianne Ribeiro*; ARAUJO, Eliane Sousa; ABREU, Elines da Costa; MARTINS, Debora Bastos; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: fabianne.r@hotmail.com

A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. E caracteriza-se por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se, principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, ao longo da história, foi descrita como uma doença que causava horror, em decorrência, das deformidades físicas relacionados ao doente não tratado, que ocasionou estigma e preconceito dos mais diversos. Na história da humanidade, provavelmente nenhuma doença gerou estigma social tão intenso quanto à Hanseníase, sempre associada a conceitos tais como: pecado, impureza e punição. Todo este contexto contribui para a relevância da doença como problema de saúde pública no Brasil e em alguns países do mundo. Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos das bases de dados Scielo e Lilacs, publicados no período de 2008 a 2014. O diagnóstico precoce e o correto manejo das reações hanseníase e neurites podem evitar a evolução da doença, a estigmatização e a discriminação dos doentes e suas famílias. Analisar as deformidades que acompanham os pacientes portadores de hanseníase. Diante dos artigos revisados podemos concluir que as deformidades da hanseníase só chegam nesse estágio por conta da falta do descobrimento e tratamento precoce. Levando muitos pacientes a não aceitar a doença e passar por preconceitos por conta da doença e as lesões deixadas por ela.

HEMOGRAMA E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIAGNOSTICO - SERIE BRANCA

MEDEIROS, Rodolfo Werbhet Martins de Brito*; FERREIRA, Leandro Augusto da Silva; DOS SANTOS, Évila Silva; LIMA, Lucas Lopes; RIBEIRO, Maria Arianna Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: rodolfo.werbhet@gmail.com

Os leucócitos, mensurados no leucograma são os responsáveis por compor a série branca na qual atuam sobre o controle de infecção e inflamação de um indivíduo. Nos exames clínicos suas

alterações em contagem (análise quantitativa) e morfologia (análise qualitativa) podem sofrer influência por variações fisiológicas como idade, sexo, raça, ansiedade, depressão, gravidez, período menstrual, dentre outros. Os leucócitos subdividem-se em diferentes grupos, como; Eosinófilos, Basófilos, Linfócitos, Monócitos e Neutrófilos. Suas variações em quantidade para mais, recebem um sufixo "OSE" ou "FILIA" e podem indicar diferentes doenças. Exemplo; Neutrófilia indica suspeitas sobre infecção, pancreatite, infarto no miocárdio, doenças inflamatórias agudas, neoplasias malignas; Eosinófilia, são causadas por doenças alérgicas, infecção parasitárias, linfoma e leucemia crônica; Basófilia, envolvidos a respostas alérgicas agudas, como também estado de hipersensibilidade; Linfocitose, indicando infecção virótica como HIV, sarampo, além de hepatite A e doenças Linfoproliferativa; E a Monocitose que são causadas por tuberculose, sarcoidose, linfoma e leucemia. Quando Sofre variações para menos, recebem o sufixo "PENIA" podendo indicar outros tipos de doenças como lupús (Linfocitopenia), pancitopenia e uso de corticoides (Monocitopenia), traumatismo, cirurgia (Eosinopenia) e radioterapia, infiltração medular (Neutropenia). Outro fator importante relacionado a patologias são a quantidade de células jovens provenientes dos neutrófilos presente no sangue, cuja a presença é justificada pela insuficiência da medula em enviar ao foco células maduras. Elas aparecem principalmente em inflamação infecciosa aguda geralmente indicando início do processo. A essa alteração dar-se o nome "desvio a esquerda" nomeado por Schilling quando listou as células imaturas do lado esquerdo do seu esquema.

HEMOGRAMA E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO - SÉRIE VERMELHA

MUNIZ, Alícia Maria Baima*; SANTOS, Weliton Lopes dos; NETO, Antonio Alves de Oliveira; SILVA, Geordinei Silva e; SILVA, Warley Sousa; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: oliveiraneto14@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

O hemograma permite avaliar variações nas células sanguíneas, sendo elas quantitativas e morfológicas, permitindo-nos identificar patologias que fazem alterações no sangue. A primeira parte do hemograma, onde são analisados a quantidade de hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito, o volume corpuscular médio (VCM), a hemoglobina corpuscular média (HCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) constituem a série vermelha do exame. Ele pode ser usado para identificar diversas doenças e o que eles podem causar no nosso organismo. Ao analisar o hemograma, se houver uma quantidade baixa de hemácias pode indicar anemia ou hemorragia persistente. Quando o volume corpuscular médio e a concentração de hemoglobina corpuscular média apresentam valores baixos, podem indicar

anemias microcíticas hipocrômicas, no entanto se os valores do VCM e CHCM forem altos, sugerem anemias macrocíticas. A hemoglobina, às vezes pode ser até normal no início da doença, mas devido como a anemia vai piorando, ela pode diminuir. Outras alterações que temos no hemograma da anemia seriam os índices hematimétricos. A anemia pode ser caracterizada pela diminuição da capacidade de transportar oxigênio, sendo assim a análise direta da quantidade de hemoglobina nas hemácias, que é responsável pelo transporte de oxigênio, nos fornece uma informação mais concentra para análise e conclusão do hemograma. Hemorragia é ocasionado por uma intensa perda de sangue por algum orifício, ou corte, para dentro ou para fora do corpo, logo com essa perda de sangue e conseqüentemente perda de hemácias, os níveis no hemograma diminuirão.

HEPATOTOXICIDADE RELACIONADA AO PARACETAMOL

COELHO, Aline Rocha*; SILVA, Gabriela Barbosa Bezerra da; GALDINO, Dhara Yanka Tiburtino; SILVA, Maressa Keila de Souza; DAMASCENO, Pâmela Mouryel Azevedo; GALVÃO, Livia Câmara de Carvalho; ZAGO, Patricia Maria Wiziack.

Email: alinerochacoelho1@gmail.com

Curso: Odontologia

O paracetamol é um fármaco que apresenta baixa atividade anti-inflamatória, porém é um potente antitérmico e analgésico, sendo bastante utilizado no controle da dor em Odontologia. Sabe-se que quando sua utilização segue as indicações e uma correta posologia pode ser considerada uma alternativa segura. Porém o risco está relacionado à utilização de doses elevadas, facilidade de acesso e à falta de conhecimento da população sobre o seu potencial hepatotóxico resultando em um aumento no número de intoxicações relacionadas a este fármaco. A oxidação do paracetamol leva à formação de um metabólito altamente tóxico, o NAPQI, que é capaz de alterar o fígado a nível dos hepatócitos. Apesar dessa via de metabolização do paracetamol não ser a principal, ela pode se tornar importante em situações de sobredose, ou quando o medicamento em questão é utilizado em pacientes usuários crônicos de álcool e de outros medicamentos indutores enzimáticos. Diante do exposto, é importante ressaltar que o paracetamol é considerado seguro quando utilizado em posologia e doses adequadas, mas apresenta um potencial hepatotóxico que não deve ser negligenciado a fim de evitar reações hepáticas agudas graves. Ressalta-se, assim, a importância do uso coerente e racional desta medicação.

HEPATITE B: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E FORMAS DE PREVENÇÃO.

DINIZ, Letícia Costa Ribeiro*; COSTA, Antonia Khaynam Silva; DE ARAÚJO JUNIOR. Antonio Alves; ROCHA, Francisca das Chagas Gaspar;

Curso: Enfermagem

Email: leticia.cdiniz16@gmail.com

HEPATITE B: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E FORMAS DE PREVENÇÃO A hepatite B representa uma patologia de grande importância para a saúde pública. Trata-se da mais reiterada forma de hepatite infecciosa, ocupando o nono lugar das causas de mortalidade mundial. Esse trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura sobre a epidemiologia nacional da hepatite B. O método escolhido foi uma revisão de literatura, com dados de três artigos da SCIELO e três protocolos do portal do ministério da saúde que foram publicados entre 2008 a 2015. No Brasil, em 2010, foram registrados 6,1 casos por 100 mil habitantes, sendo que 71,8% foram detectados em pessoas entre 20 e 49 anos. Um estudo do Rio de Janeiro, de Cantuária, publicado em 2012 avaliou a mortalidade por hepatite B no Brasil de 2000 a 2009, levando em consideração regiões, sexo e faixas etárias mais prevalentes e a relação desses óbitos com o hepatocarcinoma celular. Nele observou-se a ocorrência de 5.441 mortes por hepatite B nesse período e que a maior proporção de óbitos por hepatocarcinoma associado à hepatite B ocorreu em 2001. O sexo masculino e a região norte apresentaram maior número de mortes. Concluiu-se assim, que é de extrema importância aprofundar os estudos a cerca da hepatite B, analisando grupos comprovadamente suscetíveis, visando diminuir as taxas de prevalência e incidência dessa doença.

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - FATOR AGRAVANTE PARA PRESBIACUSIA

SOARES, Emerson Ribeiro; PEREIRA, Thassia Mayara de Abreu; CALDAS, Erica Alessandra

Curso: Fonoaudiologia

Email: mayara_abreu09@hotmail.com

Resumo : Introdução: A perda auditiva no idoso e sua consequente diminuição no processo de comunicação nos levam a pensar nas várias causas que as acarretam, entre elas temos a idade, problemas neurológicos, ototoxicidade, doença renal, exposição ao ruído e a hipertensão arterial. Objetivo: Descrever a Hipertensão Arterial Sistêmica como fator agravante à Presbiacusia. Metodologia: Estudo de revisão de literatura no qual foram incluídos artigos, selecionados a partir de pesquisas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), LILACS e Scielo, bem como livros relacionados à área da fonoaudiologia no período de 2000 a 2015. Conclusão: A hipertensão é um distúrbio vascular comum e pode resultar em alterações estruturais do coração e vasos sanguíneos. A pressão elevada no sistema vascular pode

desencadear hemorragias na orelha ou sistema nervoso central. De acordo com os estudos abordados pode-se entender que a hipertensão arterial age como fator de aceleração da degeneração do aparelho auditivo proveniente da idade. Porém novos estudos ainda se fazem necessários.

HISTOLOGIA DO PERIODONTO E PERIODONTITES

CANDEIRA, Bruna Lima*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; VERAS, Nicole Paiva; MACHADO, Daniel Augusto Pereira; CALVET, Clélea de Oliveira; CASTRO, Ana Carolina

Email: brunalimac@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O periodonto consiste nos tecidos de fixação do dente nos ossos maxilares e para entender sua formação é necessário conhecer sua histologia. O desenvolvimento dos tecidos periodontais ocorre durante o crescimento e formação do dente e esse processo ocorre no início da fase embrionária e posteriormente vai passar por uma série de processos até sua formação final. O periodonto é dividido em tecidos de proteção e de fixação. O de proteção é formado pela gengiva que é o tecido que recobre o processo alveolar e circunda a região cervical dos dentes, ela é dividida em gengiva inserida e gengiva livre. O epitélio que forma a gengiva é dividido em epitélio oral, epitélio oral do sulco e epitélio juncional. Enquanto o tecido de fixação é formado pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e celular, ele possui feixes de fibras colágenas. O cemento é um tecido conjuntivo mineralizado, localiza-se na porção radicular e o osso alveolar é definido como parte da maxila e mandíbula, ele se desenvolve associado a erupção do dente. Além disso é preciso conhecer a histologia das periodontites, assim, podendo conhecer as diferenças entre o periodonto normal e o patológico através da histologia.

HISTOLOGIA DO PERIODONTO DE INSERÇÃO E A ORTODONTIA

VERDAS, Nicole Paiva Veras; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; COUTINHO, Bruna Candeira; Matheus; MACHADO, Daniel Augusto Pereira; CALVET, Clélea de Oliveira; CASTRO, Ana Carolina

Curso: odontologia

Email: npaivaveras@gmail.com

Resumo: Este trabalho objetivou avaliar, através de uma revisão de literatura, a relação entre a histologia do periodonto de inserção e a ortodontia. Foi realizada uma breve pesquisa de literatura, usando base de dados como Pub Med, Bireme e Ebsco. O periodonto de inserção é composto pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar, tendo como função dar

sustentação e inserir o dente ao alvéolo. O tratamento ortodôntico realizado de forma inadequada tem sérias consequências no tecido periodontal de inserção, pois durante a movimentação dos dentes, o trauma oclusal e as forças ortodônticas podem destruir de maneira acelerada os tecidos periodontais. O processo de reabsorção na ortodontia pode ser de leve a extrema, sendo preciso algumas vezes mudar a conduta escolhida no início do tratamento a fim de minimizar este dano biológico irreversível para o paciente. Portanto, é importante antes de iniciar o tratamento ortodôntico identificar e eliminar qualquer inflamação no local, a fim de criar um periodonto sadio para um eficaz tratamento.

IDOSO COMO PACIENTE CIRURGICO: PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA

ALVES, Isaac Dos Santos; DE SOUZA, Camila Monteles; VALE, Geysla Mayara Araujo da Silva; DE ARAÚJO, Pricyla Santos; PENHA, Yuri Horrara Madeira; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: isaacalvess@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Com um crescente aumento da população idosa no mundo, o cuidado com a saúde e a busca em manter uma boa qualidade de vida tem sido o principal objetivo dessa classe, de modo que se tornou frequente o paciente idoso que procura o atendimento odontológico fazer uso constante de algum medicamento. Revisão de literatura: Na odontologia, a prescrição medicamentosa está associada intimamente ao sucesso de inúmeros tratamentos, onde o profissional prescreve ao paciente medicações como: analgésicos para o controle da dor, anti-inflamatórios, para controle de edemas, e antimicrobianos, para o combate de infecções, medicamentos esses que podem vir a interagir com outras medicações que estão sob o uso do idoso, podendo causar assim reações adversas graves, pondo em risco a vida do paciente. Analgésicos como a dipirona, que é muito prescrita para controle da dor, quando associada a um antipsicótico como a clorpromazina (usada no tratamento da esquizofrenia) traz ao paciente complicações como uma hipotermia grave, hipotensão, alterações na visão, boca seca e outros efeitos adversos, da mesma forma que anti-inflamatórios não esteroidais quando associados a anti-hipertensivos e anticoagulantes ocasionam efeitos contrários ao desejado, bem como o uso concomitante de antimicrobianos como a amoxicilina, com anticoagulantes, aumentam o nível de sangramento do paciente. Dessa forma a importância de uma boa anamnese e de um ótimo conhecimento do profissional em relação a terapêutica medicamentosa e as reações ocasionadas pelas interações de diferentes medicações são incontestáveis, prevenindo situações de risco e garantindo o sucesso do tratamento.

IDOSO COMO PACIENTE CIRÚRGICO: SOLUÇÕES ANESTÉSICAS

FERREIRA, Michel Wendlinger Cantanhede*; SILVA, Amanda Georgiana Arouche Santos; NETO, Paulo Ferreira dos Santos; MELO, Larissa Macieira Martins; FREITAS, Tatiene da Conceição Silva; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: michelwendlinger@hotmail.com

Introdução: O uso de soluções anestésicas é indispensável na maioria dos procedimentos na odontologia. Dentro da área cirúrgica essa importância se amplifica de forma considerável, e quando se fala em procedimentos cirúrgicos em pacientes idosos essa variante aumenta ainda mais. Revisão de Literatura: Especialmente no idoso, já é de conhecimento, que com o decorrer da idade se instalam alterações sistêmicas que alteram a funcionalidade do organismo e dificultam inúmeros procedimentos por conta da interação entre as substâncias administradas e a situação fisiológica do paciente. O idoso como paciente cirúrgico requer uma gama de conhecimentos que visem contornar dificuldades como alterações na pressão arterial, diminuição nos processos de distribuição, metabolização e eliminação de substâncias no organismo, e outros fatores, onde , quando associados a substâncias anestésicas como a lidocaína, o risco de sobredose é maior, uma vez que ela sofre metabolização no fígado e eliminação pelos rins o que pode desencadear uma série de complicações ao indivíduo que possui suas atividades renais e hepáticas reduzidas, além do que, o mesmo anestésico associado à vasoconstrictores como a fenilefrina e a noradrenalina, por conta de uma maior sensibilidade do idoso á vasoconstrictores, tendem a aumentar a pressão arterial durante o procedimento, aumentando assim o risco de parada cardíaca. Conclusão: Frente a isso, o emprego de substancias anestésicas em idosos deve estar associado à um bom conhecimento da situação fisiológica do indivíduo e a uma competência do profissional em conhecer e administrar doses adequadas, visando o sucesso do procedimento e o restabelecimento da saúde.

IMPACTO DA AMPUTAÇÃO NA VIDA DE INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

DOS SANTOS, Monique Danielle Barbosa*; LOPES, Marlio Rodrigues; GARCEZ, Marina Vanessa Maciel; DE OLIVEIRA, Natália Nascimento; CARVALHO, Tatiana De Sousa Sobral; FONTENELE, Rafael Mondego

Email: moniquetenda@gmail.com

Área / Especialidade: Enfermagem

Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica relacionado ao impacto da amputação na vida de indivíduos com diabetes mellitus. Trata-se de uma revisão integrativa da

literatura realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BDENF e MEDLINE), no período de 2010 a 2015 sobre um assunto específico com o intuito de construir uma síntese de estudos realizados separadamente, mas que investigam problemas idênticos ou similares. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 5 artigos cuja seleção dos mesmos foi realizada em Abril no ano de 2016, em pares, selecionando-se os artigos pertinentes conforme critérios estabelecidos no protocolo de pesquisa. Predominaram os artigos descritivos de abordagem qualitativa 4, (80%) e com nível de evidência V (80%). Os estudos abordaram os sentimentos vivenciados após a amputação e as dificuldades encontradas na readaptação cotidiana. Compreender essas pessoas e suas vivências tão sofridas e tão doloridas é uma necessidade urgente dos profissionais da saúde, principalmente da Enfermagem, cujo destaca-se a importância deste profissional como integrante da equipe interdisciplinar na educação para a prevenção, manutenção e reinserção do indivíduo na sociedade apesar das limitações ocasionadas pela amputação.

IMPACTO DO JEJUM INTERMITENTE NO METABOLISMO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Maria de Lourdes Piedade*; NUNES, Maria José; MATOS, Milena; SOUZA, Angela Tâmara Lemos

Email: lourdes_piedade@hotmail.com

Curso: Nutrição

Resumo: O Jejum Intermitente (JI) ou intermittent fasting é um dos temas mais populares no mundo quando se trata de emagrecimento. O jejum caracteriza-se como um estado em que o organismo, após ficar determinado tempo sem alimentação, utiliza substratos energéticos próprios do que aqueles provenientes da dieta. Diante desse quadro o organismo humano passa por vários processos metabólicos, utiliza a gordura estocada no tecido adiposo ao invés da gordura ingerida da dieta, usa como energia a glicose produzida no fígado, de forma mais intensa utiliza o glicogênio muscular e hepático, em detrimento dos carboidratos provenientes da alimentação, ocasionando direcionamento de aminoácidos, para a produção de energia. A utilização dessas fontes próprias, principalmente gordura e glicose/glicogênio, ocorre pelo fato da dieta, no momento do jejum, não prover nutrientes para a produção de energia. Pode ser prescrito em dias alternados, dia sim/dia não, a cada 3 dias, 1 vez por semana. Sua duração pode ser de 12 horas, 16 horas, 24 horas etc. Em relação à frequência, os protocolos mais comuns envolvem o jejum intermitente diário ou a cada 2 dias. **CONCLUSÃO:** Estudos demonstraram que o Jejum Intermitente leva a alterações metabólicas importantes relacionadas ao metabolismo energético e emagrecimento e que não possuem efeitos negativos quando associados a prática

de exercícios de baixa intensidade. PALAVRAS CHAVES: Jejum Intermitente. Emagrecimento. Alterações Metabólicas

IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS DA VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS E O PAPEL DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA

LIMA, Rusiane Brito*; FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; DA SILVA, Rebeca Do Socorro Nepomuceno Brito; ARAUJO, Patrícia Maria Sombreira; DOS DANTOS, Alison Reis; LEITE, Zinole Helena Martins

Email: rusianebrito@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: A violência sexual em crianças, um fenômeno social complexo, tem aumentado consideravelmente, sendo praticado na sua grande maioria por pessoas próximas a crianças). Esta pesquisa bibliográfica e documental busca refletir sobre as implicações psicossociais da violência sexual em crianças, destacando o papel do psicólogo nestas situações. Para a realização sua realização, analisou-se documentos do Conselho Federal de Psicologia, que norteiam as intervenções dos psicólogos nos casos de violência sexual, como também 15 artigos sobre a temática disponíveis na base de dados Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde a partir de 2005 utilizando-se os descritores: “Violência infanto-juvenil”, “Estatuto da Criança e do Adolescente” e “Atuação do Psicólogo”. Revisão: A violência sexual contra crianças avilta a integridade física e psicossocial das vítimas. Condições de abandono e vulnerabilidade social estão intimamente relacionados a este fenômeno. As consequências do abuso sexual para a criança envolvem aspectos físicos, psicológicos, sexuais e sociais, e a intensidade desses efeitos variam de acordo com os seguintes fatores: idade, grau de violência, importância da relação entre abusador e vítima, ausência de figuras parentais protetoras e grau de segredo e de ameaças contra a criança. Conclusão: A atuação do psicólogo nas situações de abuso sexual infantil envolve o enfrentamento dos agravos psicossociais desta situação de violação de direitos humano e resgate da dignidade. Palavras Chaves: “Violência infantojuvenil”, “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” e “Atuação do Psicólogo”.

INCIDÊNCIA DE FISSURA LÁBIO PALATINA NO BRASIL POR REGIÃO

BRASIL, Natália Silva Brasil; CORREA, Silvan; MADEIRA, Petrus Levid

Curso: Odontologia

Email: nataliabrasil.s@outlook.com

Resumo: Fissura lábio palatino (FLP), é uma má formação congênita em que ocorre uma falta de fusão entre os segmentos intermaxilares. Essa anomalia é uma deformidade de grande

complicação, abrangendo várias estruturas, como: palato duro, mole, lábio e nariz. A causa exata dessa deformidade crânio facial, ainda é desconhecida e o tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar e com cirurgia bucomaxilofacial. Essa anormalidade ocorre em média um caso a cada 500 a 700 nascimentos no mundo. A incidência de fissura lábio palatina no Brasil é estimada em torno de 13,9/10.000 nascimentos. Sabe-se também que esses dados variam de acordo com cada região. Diante disso, objetiva-se avaliar a incidência da FLP no Brasil por região, através de uma revisão de literatura, com periódicos nacionais e internacionais dos últimos dez anos, além disso, pretende abordar a etiologia dessa mal formação facial, prevenção e formas de tratamentos. Palavras-Chave: Cirurgia Bucomaxilofacial, Fissura Lábio Palatino, Incidência

INCLUSÃO E EXCLUSÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE A AFETIVIDADE PARA A TRANSFORMAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

DOS SANTOS, Norma Lelia Vieira; FARIA, Simony De Sousa

Curso: Psicologia

Email: lyvsan@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a afetividade no cenário das desigualdades, considerando os conceitos de exclusão e inclusão social, e sua aplicabilidade na psicologia social. A exclusão e inclusão social possuem raízes históricas desde a antiguidade, nesse permeio surge a psicologia social e a afetividade. Diante dessa realidade, percebe-se que a exclusão e inclusão são processos intimamente ligados, desse modo, temos o cenário das desigualdades sociais, motivados pelos fatores que contribuem para a ocorrência desse processo. Para a realização da pesquisa foram consideradas diversas publicações como livros, monografias, teses e artigos disponíveis nas bases de dados virtuais como o SciELO, Google Acadêmico, Bireme, Pepsí, revistas online e livros relacionados com o tema do estudo, através das palavras chave: Exclusão; Inclusão; Psicologia Social, Desigualdade Social. Salienta-se a importância da afetividade contribuindo para transformação das desigualdades sociais. Evidenciou-se a necessidade de estudos e pesquisas acerca da temática, colocando em questão o ser humano, sua singularidade e suas relações e ações dentro da sociedade em que está inserido. Desse modo, destaca-se a afetividade como sendo uma tentativa de contribuir para amenizar e proporcionar a transformação das desigualdades sociais. Contudo, visualizou-se que na relação que envolve subjetividade por meio da afetividade e desigualdade, entende-se que há sofrimento, há humilhação, porém prevalece o desejo de ser feliz e superar as desigualdades, recomeçando com esperanças renovadas.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: SEUS AVANÇOS E QUAL A IMPORTÂNCIA DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS?

COSTA, Antonilda Moraes*; OLIVEIRA, Thacylla Wanessa dos Santos; SILVA, Elaine Cristina Oliveira; LOBÃO, Rosa de Saron Anchieta Soares; VIANA, Juliane Flávia Cançado;

Email: tonny-mc@hotmail.com

Introdução: Os genéricos foram estabelecidos pela Lei 9787/99 e são definidos como um medicamento similar a um produto de referência ou inovador desde que sejam comprovadas sua eficácia, segurança e qualidade. Para serem intercambiados com os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos devem atender os critérios de equivalência terapêutica mediante testes de bioequivalência. **Revisão:** A indústria de medicamentos é um setor que sempre terá um garantido espaço no mercado nacional e internacional, sendo considerada uma das áreas onde há mais investimentos e avanços tecnológicos no mundo. A indústria brasileira, ao começar a produzir em larga escala os medicamentos genéricos, busca uma valorização do produto nacional além de possibilitar o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos para o atendimento dessa nova demanda. Outro fator que contribui para o crescimento industrial é a verticalização da indústria farmacêutica possibilitando que a empresa produza e utilize a sua própria matéria-prima, diminuindo os custos de produção. Entretanto, no Brasil, grande parte das matérias-primas empregadas na indústria farmacêutica são adquiridas no exterior levando a um desequilíbrio da balança comercial. Desde 2009, o governo brasileiro incentiva o crescimento tecnológico da indústria farmacêutica por meio de programas específicos. Assim, investimentos para novas pesquisas no desenvolvimento de fármacos e produção de medicamentos elevando o padrão do produto nacional brasileiro. **Conclusão:** O incentivo do governo à produção de medicamentos genéricos não torna a indústria farmacêutica brasileira uma mera copiadora, mas sim uma indústria que começa a entender a importância de incentivar, investir e promover o produto nacional, tornando-se mais competitiva.

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM PACIENTES SUBMETIDOS À NEFRECTOMIA PARA TRANSPLANTE RENAL

ARAUJO, Eliane Sousa; BONIFÁCIO, Izabela Crizelda Lima; BOGEA, Gislaíne Pinto; SANTOS, Ivanelde Pereira; CALDAS, Paulo Henrique Figueiredo; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho

Curso: Enfermagem

Email: eliane.araujo88@hotmail.com

A infecção é a complicação mais banal e a principal causa de óbito após transplante de órgão sólido. O objetivo geral do estudo é avaliar através de revisão integrativa a infecção de sítio

cirúrgico em pacientes submetidos à nefrectomia para transplante renal. Tratou-se de uma pesquisa integrativa, feita através de planejamento da pesquisa, seguindo da execução, com avaliações sobre a temática e por fim a comunicação dos resultados, através de comparativos de artigos científicos e teses, de modo que cada investigação seguisse seu próprio caminho. A seleção das produções científicas ocorreu no período março e abril de 2016. Com abordagem qualitativa dos dados no qual a obtenção dos materiais foi feita majoritariamente por meio de consulta online às seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Medline e Scielo. O eixo norteador para a seleção dos artigos foi à questão de pesquisa e os critérios de seleção previamente estabelecidos. Os descritores foram utilizados isoladamente e combinados, sendo escolhido o método que apontou para o maior número de produções, e que permitiu encontrar 10 estudos com foco no tema da pesquisa. Este estudo retrospectivo de trabalhos científicos publicados mostra a incidência de infecção hospitalar em transplantados de rins ocorre geralmente no primeiro mês após o transplante.

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DOS ATLETAS DE NATAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO 2016

SEDANO, Nelson Carneiro Alamino*; SOARES, Gleice Kerli Barros; BARBOZA, Nayana Maria Lopes dos Reis; BOTELHO, Dominique Mota; FONTOURA, Gustavo Monteiro; NUNES, Luiz Alexandre de Menezes; JUNIOR, Fernando César Pestana Trovão.

Curso: Educação Física

Email: l.alexnunes@hotmail.com

A construção de índices sobre a relação entre peso corporal e estatura é uma proposta simples de análise da composição corporal através da identificação de medidas antropométricas. Este estudo teve como objetivo descrever o índice de massa corporal (IMC) dos atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 na modalidade natação. A amostra foi composta por 160 atletas de ambos os sexos (80 mulheres e 80 homens) das quatro técnicas de nado. A pesquisa é caracterizada como descritiva, do tipo revisão de literatura. Os dados foram coletados na página oficial dos Jogos Olímpicos na internet. A estatística descritiva foi realizada através do programa BioEstat 5.3 e do Microsoft Excel. Os resultados mostraram que, tanto as nadadoras (20.83Kg/m^2), quanto os nadadores (23.13Kg/m^2), possuem valores de IMC dentro da normalidade, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Um ponto que mereceu destaque foi para os atletas das provas de 50 metros nado livre em ambos os sexos, devido os maiores valores de IMC observados (21.20 e 23.86, mulheres e homens respectivamente), o que pode estar relacionado ao fato de que estas provas necessitam que os atletas tenham maiores potências musculares.

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS

PEREIRA, Iana Raissa Neves*; ALENCAR, Thalyane Maciel; SOARES, Juliana Fonseca Soares; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes

Email: ianaraissa@hotmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é definida como aquela que acomete tecidos, órgãos incisados e cavidade manipulada durante um procedimento cirúrgico e pode ocorrer em decorrência de um ato operatório. No Brasil, a infecção de sítio cirúrgico compreende entre 14% a 16% das infecções diagnosticadas em pacientes hospitalizados, sendo que 93% dessas são sérias, chegando a invadir órgãos ou espaços acessados durante o procedimento cirúrgico. Geralmente as infecções de sítio cirúrgico relacionadas aos procedimentos ortopédicos são consideradas graves; pois nessas cirurgias são utilizadas próteses, o que aumenta o risco de um quadro infeccioso e complicações que podem levar a perda do membro operado. Avaliar os possíveis fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar no surgimento de infecções pós procedimentos cirúrgicos ortopédicos é de fundamental importância. O alto risco de infecção de sítio cirúrgico é uma das principais preocupações em qualquer procedimento cirúrgico ortopédico.

INFECÇÃO POR HPV EM MULHERES ATENDIDAS EM UM CENTRO ESPECIALIDADE MÉDICA DE SÃO LUÍS-MA NO ANO DE 2014.

MOREIRA, Rosângela Da Silva*; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar.

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é a doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo e apresenta um amplo espectro de manifestações, desde a infecção assintomática até o carcinoma invasivo. Estima-se que pelo menos 50% das pessoas sexualmente ativas venham a adquirir esta infecção em algum momento de suas vidas. Objetivou identificar a infecção por HPV em mulheres atendidas em um Centro de Especialidade Médica de São Luís-MA no ano de 2014. Tratou-se de um estudo descritivo, retrospectivo, documental, com abordagem quantitativa, realizada entre os meses de Setembro 2014 à Julho 2015, onde a amostra foi constituída por 44 prontuários de pacientes que foram atendidas no local estudado, sendo que os prontuários foram analisados de acordo com a pesquisa. Concluiu-se que 50% das mulheres estavam na faixa etária entre 21 a 30 anos; 59% eram solteiras; 57% eram do lar, 66% recebiam menos de um salário mínimo e que tinham como grau de instrução

o ensino médio incompleto como 48%; 55% tinham como tempo de início da atividade sexual 1 ano; 41% faziam uso de preservativo masculino ou feminino; 73% não tinham antecedentes familiares com HPV; 50% não tiveram DST e 52% não fumavam; 35% dessas mulheres utilizar como tratamento a crioterapia. Dessa forma, concluí-se que há uma elevada incidência de infecção por HPV em mulheres atendidas, sendo de fundamental importância a realização também do exame papanicolau anual para que se possa prevenir e tratar intercorrências. Descritores: HPV, infecção, mulheres, incidência.

INFLUÊNCIA DO USO DE AGROQUÍMICOS EM FONSECAEA PEDROSOI

FERREIRA, Rayana Larissa Pinheiro Soares*; DOS SANTOS, Julliana Ribeiro Alves;

Curso: Biomedicina

Email: rayanaperfil02@icloud.com

A massificação do uso dos agroquímicos no Brasil foi estimulada sem a preocupação e sem o acompanhamento prévio dos riscos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Uma das principais finalidades do uso destas substâncias é inibir o crescimento de fungos que são patógenos frequentes na agricultura. No entanto, os principais fungos patogênicos do homem estão presentes no solo e em materiais em decomposição. Um exemplo é *Fonsecaea pedrosoi* que é saprófita. Este fungo possui melanina em sua parede celular e é o agente da cromoblastomicose no homem. Esta micose distribui-se principalmente em regiões com climas tropicais e subtropicais. Tornando-se frequente em lavradores, pois estes possuem maior contato direto com isolados do solo, do ar e dos vegetais. No Brasil, a região amazônica é considerada a principal área endêmica da doença. No Estado do Maranhão, os principais indivíduos acometidos são lavadores e carpinteiros, procedentes de microrregiões da baixada Maranhense. O tratamento da cromoblastomicose é feito através do uso de antifúngicos como o Itraconazol. Contudo, acredita-se que a resistência ao tratamento esteja vinculada ao fato de os agroquímicos utilizados nas plantações promoverem uma pressão seletiva e desencadearem a resistência do fungo devido ao contato direto com agrotóxicos que contenham as mesmas substâncias químicas ou similaridade estrutural com a droga utilizada para tratamento da doença. Portanto, é necessária a conscientização acerca do uso destes defensivos com o intuito de reduzir as taxas de resistência na clínica e a criação de novos antifúngicos que possibilitem um tratamento eficaz para a Cromoblastomicose.

INTOXICAÇÕES POR CLOSTRIDIUM BOTULINIUM, VÍBRIO CHOLERAEE E SALMONELLA TYPHI NO BRASIL, ENTRE 2001 E 2014

DE MACEDO, Alessandra Teixeira*; COELHO, Raissa Ramos; SANTOS, Joice Castelo Branco; NUNES, Marcio Anderson Sousa; SABBADINI, Priscila Soares.

Email: Alessandra.macedo@hotmail.com

Área/Especialidade: Biomedicina

Microrganismos patogênicos adquiridos pela ingestão de alimentos contaminados ocasionam doenças, tais como, o Botulismo, a Cólera e a Febre Tifoide. Sendo, a primeira provocada pelo *Clostridium botulinum*, A segunda pela *Salmonella enterica* sorotipo typhi, e o terceiro, pelo agente etiológico *Vibrio cholerae*. O objetivo deste trabalho foi sistematizar e analisar as características sociodemográficas. Além de, averiguar suas implicações toxicológicas e expor uma visão geral de cada doença. Trata-se de um estudo descritivo e explicativo com abordagem quantitativa, cujo dados foram obtidos através dos boletins epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil, a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), analisamos os parâmetros em relação as variáveis: casos confirmados, região geográfica e tipos de evolução. Obtivemos um levantamento de 74 casos de Botulismo, 36 de Cólera e 5492 de Febre Tifoide, registrados no Brasil. Sendo, as regiões Norte e Nordeste com o maior percentual de casos confirmados, 2741 e 2489 respectivamente. No entanto, tivemos 4985 casos de cura e 60 casos de óbito pelo agravo notificado. Diante disso, observamos que o processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimentos prontos para o consumo, contribuiu para o aumento da incidência de doenças como o Botulismo e a Febre Tifoide. Entretanto, com a melhoria do sistema sanitário brasileiro observamos que os casos de Cólera reduziram significativamente desde a década 90.

INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA: SUGESTÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO PARA USO DA PROTAPER NEXT

ROSENDO, Joyce Karolyne dos Santos*; JUNIOR, Wlisses Furtado Muniz; ALVES, Genne Rose de Sousa; CARVALHO, Ceci Nunes; SOUSA, Patricia Oliveira.

Curso: Odontologia

Email: Joyce.karolyne15@hotmail.com

A endodontia tem mostrado inúmeras inovações, principalmente na fase de preparo biomecânico, no entanto, todas as técnicas de preparo estão associadas à extrusão apical de debris. A maioria dos instrumentos de NiTi acionados por rotação contínua expulsam menos debris quando comparados aos instrumentos de aço inoxidável utilizados manualmente e apresentam um potencial de reduzir o desconforto pós-operatório. Com intuito de diminuir o tempo de trabalho, aumentar a flexibilidade e a resistência à fratura dos instrumentos de NiTi, sistemas com inovações de design, com técnicas de preparo mais rápidas que preservam a forma

original do canal radicular foram desenvolvidos. O sistema Protaper Next (DentsplyMaillefer, Ballaigues, Suíça), é um dos sistemas mais recentes que possuem secção transversal retangular, gira de maneira excêntrica, isto é, fora do centro de massa do instrumento. Isso faz com que apenas duas arestas de corte do instrumento tenham atrito com as paredes do canal radicular, enquanto que as outras duas giram livremente, garantindo assim remoção de raspas de dentina ápico-cervical e reduzindo, dessa forma, a torção das espiras e conseqüentemente a fratura das limas. É fabricado em liga de NiTiM-Wire aumentando a resistência à fadiga cíclica. É composto de 4 limas, X1 (017/04), X2 (025/06) X3 (30/07) e X4 (40/06), sendo as limas X3 e X4 restritas a canais mais amplos. Deve ser acionado em motor rotatório à uma velocidade de 300 rpm, 2 Ncm de torque. O uso desse sistema é rápido, eficaz e é uma excelente alternativa para uso no preparo dos canais radiculares.

INVESTIGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS GENES SHOX E GHR EM PESSOAS COM BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA

SOUSA, Roniere Viana*; CARVALHO, Gesanaje da Paz; FIGUEIREDO, Isabella Fernandes da Silva; DE ALMEIDA, Marcelina Moraes; CALDAS, Maysa Yzabety da Silva; MARQUES, Felipe Albuquerque;

Email: ronieresousa@hotmail.com

Área/Especialidade: Farmácia

A Baixa Estatura Idiopática (BEI) é definida como estatura inferior a dois desvios-padrões da altura média correspondente a uma determinada idade, sexo e grupo populacional sem nenhuma outra anomalia esquelética ou sistêmica, distúrbios endócrinos, nutricionais ou cromossômicos. Investigações de mutações de ponto e de copy number variations (CNVs) em genes-chave, como Short Stature Homeobox Gene (SHOX) e Growth Hormone Receptor (GHR), bem como a investigação do polimorfismo GHR d3 são imprescindíveis ao diagnóstico de BEI. Nessa rota investigativa, uma ordem de três técnicas de diagnóstico molecular em pacientes com BEI foi proposta na pesquisa de Marques (2012): investigação de alterações de CNV no gene SHOX por Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) em regiões regulatórias upstream e downstream do gene; sequenciamento dos genes SHOX e GHR para a determinação da frequência de mutações de ponto e inserções/deleções que afetam suas funções; genotipagem do GHR, que poderá ser importante no futuro para prever a dosagem terapêutica de GH (hormônio do crescimento) no qual consiste a maioria dos tratamentos para BEI. Essa

pesquisa proporcionou resultados positivos para essas mutações que demonstraram a eficácia dessa ordem de diagnóstico molecular. Corroborando com essa proposta, outras pesquisas já evidenciaram o sucesso dessas técnicas em pacientes com BEI. A partir desse tipo de investigação é possível planejar o uso racional do medicamento baseado no DNA do paciente e direcionar melhor a terapia, o que pode diminuir o custo de tratamento, pois somente será tratado efetivamente quem responder a ele.

ISQUEMIA E DOR CRÔNICA: MANIFESTAÇÕES SECUNDÁRIAS DA ANEMIA FALCIFORME

NUNES, Letícia Corrêa*; SAMPAIO Hellen Lobato; MOREIRA, Hyngrid Carolinne Soares Ferreira; RODRIGUES, Washington Kleber; LIMA, Cláudia Zeneida Gomes

Curso: Farmácia

Email: leticiaorreanunes@hotmail.com

A anemia falciforme, também conhecida como anemia drepanocítica, é uma doença genética com herança autossômica recessiva caracterizada por uma modificação nas hemácias, o que causa a perda de sua forma arredondada transformando-a para um aspecto de foice. Esta ocorre devido uma alteração no cromossomo 11, localizado no gene da globina beta S na sexta posição da cadeia, levando à substituição da base nitrogenada timina por adenina, conseqüentemente o ácido glutâmico é substituído pela valina. A hemoglobina - pigmento que dá a cor vermelha ao sangue - e o ferro são responsáveis por transportar oxigênio do pulmão para todo o corpo, mantendo a homeostasia. Indivíduos com anemia falciforme apresentam hemácias com estrutura rígida e formato de foice, assim gerando uma hemoglobina defeituosa e portanto não desencadeando a função de oxigenar o corpo de forma satisfatória. As mesmas apresentam dificuldade de passar pelas veias, ocasionando seu entupimento e muitas dores, geralmente nos ossos e nas articulações. A dor é o mais dramático quadro da doença, pois as crises dolorosas acontecem inesperadamente, resultante de uma lesão por isquemia tecidual originado pela obstrução da microcirculação. Nesse caso, a dor óssea por vasoclusão é classificada como somática. Essa doença, mediada por crises dolorosas, ainda não possui cura e afeta principalmente a população negra. É necessário um tratamento eficaz em conjunto com diagnósticos e cuidados médicos e farmacêuticos para que se possa reduzir sintomas físicos e emocionais, para que dessa forma seja possível contribuir na melhoria da qualidade de vida dos doentes.

INTELIGÊNCIA

SAUAIA, Adalgisa Lopes Pereira*; SERRA, Adilson; VELOSO, Julianne Fontenelle; GOMES, Leonardo Sousa; FIDELES, Renato Moreira; ALVES, Cândida Helena Lopes;

Email: adalgalpsauaia@bol.com.br

Curso: Psicologia

Resumo: A inteligência tem uma evolução conceitual muito ampla, apesar de haver muitas definições diferentes. Para conhecer os conceitos de inteligência e os papéis práticos e científicos dos testes e outros instrumentos de avaliação, no reconhecimento dos diferentes níveis intelectuais foi realizada a presente revisão bibliográfica. Binet (1905) introduziu o conceito de idade mental, que traduz o nível intelectual médio correspondente a uma determinada idade. Posteriormente, Gardner (1985) propôs uma alternativa para a concepção de inteligência como uma capacidade inata, geral e única o que reforça a teoria das inteligências múltiplas. Goleman (1995) apresentou uma nova perspectiva sobre o conceito de inteligência – a inteligência emocional. O psicólogo Sternberg propôs o conceito de inteligência prática que incide sobre os conhecimentos que o indivíduo apreendeu através da experiência e integrou no seu banco de saberes. A inteligência é reconhecida por alguns teóricos como o que os testes de inteligência medem, enquanto outros a veem como um conjunto de habilidades gerais, incluindo a habilidade de aprender a partir da experiência, pensar em termos abstratos e lidar efetivamente com o ambiente. Os testes de inteligência e outros instrumentos desempenham papéis práticos e científicos, sendo essencial que meçam precisamente o que pretendem medir, com fidedignidade e validade garantidos pela padronização e sua uniformidade. Conclui-se que o conhecimento dos instrumentos de avaliação tem uma elevada importância no reconhecimento dos diferentes níveis e tipos de inteligência.

LASER DE ALTA POTÊNCIA EM ODONTOLOGIA

MARTINS, Lucyana Gonçalves*; DE ARAUJO, Cássio Felipe Silveira; MACIEL, Andrezza Bastos;

Curso: Odontologia

Email: lucyanagm@hotmail.com

Os lasers são classificados de duas formas: cirúrgicos (usados para terapia de alta potência–HILT: High-Intensity Laser Therapy); não cirúrgicos (usados para terapia de baixa potência–LILT: Low-Intensity laser Therapy); e eles ainda podem ser usados para diagnóstico fluorescência tecidual e fotodinâmica. A radiação eletromagnética ou luz de um laser é caracterizada por ser um fluxo luminoso altamente paralelo e concentrado e de alta intensidade de energia. Os lasers são denominados de acordo com o meio de estimulação que sofrem. Nos dias atuais diferentes meios estão disponíveis sendo sólidos, gasosos ou líquidos, ou seja, os lasers apresentam comprimentos de onda diferentes que possuem características próprias que podem sofrer quatro diferentes fenômenos: penetração, difusão, absorção e transmissão. Os principais lasers de alta potência indicados para odontologia são o CO₂ (λ=9.300 nm, 9.600 nm, 10.300 nm e

10.600 nm) e Nd:YAG (l=1.064 nm) para tecidos moles; e o Er:YAG (l=2.940 nm), o CO₂, e o Er,Cr:YSGG (l=2.780 nm) para tecidos duros. Os lasers para tecidos moles são usados para incisões e hemostasia, por possuírem boa absorção por pigmentos e sangue e atuam por vaporização. Os lasers para tecido duro atuam por ablação, que é um mecanismo no qual as energias do laser absorvidas pela água e pela hidroxila na hidroxiapatita causam um rápido aumento de volume e aquecimento, resultando em altas pressões internas que levam à remoção do substrato na forma de microexplosões.

LAVAGEM DAS MÃOS: ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

FERREIRA, Fabianne Ribeiro*; ARAUJO, Eliane Sousa; ABREU, Elines da Costa; MARTINS, Debora Bastos; E CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho; NORONHA, ; Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: fabianne.r@hotmail.com

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) constitui-se em um ambiente terapêutico apropriado para o tratamento de neonatos em estado grave, sendo considerada uma unidade de alta complexidade. Desta forma o cuidado com a higienização das mãos na área da saúde é uma das principais preocupações, embora a técnica de higienização das mãos seja universal, é sem dúvida, a rotina mais simples, eficaz e de maior importância na prevenção e controle da disseminação de infecções, devendo ser praticada por toda equipe, sempre ao início e término de uma tarefa. Objetivou avaliar a adesão da lavagem das mãos em uma unidade de terapia intensiva neonatal, tratando-se de uma pesquisa tipo revisão integrativa, onde realizou-se levantamento bibliográfico em banco de dados científicos sobre o tema proposto. A amostra resultou em 15 artigos, nos quais de 30% dos casos de infecções relacionadas à assistência à saúde são considerados preveníveis por medidas simples, sendo a lavagem correta das mãos pelos profissionais de saúde a mais efetiva delas. Através destes dados, nos faz refletir sobre a importância da higienização das mãos nas UTIN, cuja técnica requer uma maior abordagem da equipe de saúde dentro das unidades. Mesmo havendo uma correlação entre a lavagem das mãos e as infecções hospitalares e sendo um dos meios mais simples, foi comprovada a baixa adesão dos profissionais de saúde relacionada a essa prática, que foram explicados não só pela falta da estrutura e materiais, como também a displicência de alguns profissionais na realização da técnica da higienização das mãos.

LENTE DE CONTATO DENTAIS

COUTINHO, Matheus Felipe Veloso*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; CHAVES, Franceilton Moura; PENHA, Ana Thereza Santos; LARANJEIRA, Victor Alencar de Souto; GOMES, Isabella Azevedo

Email: matheuscoutinho60@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Atualmente, a busca pela beleza está sendo cada vez mais requisitada pelos pacientes para a realização de tratamentos odontológicos estéticos, principalmente, quando os dentes anteriores apresentam problemas de tamanho e proporção, diastemas, mau posicionamento, pigmentações e etc. Uma opção reabilitadora tem sido muito destacada na mídia, as chamadas Lentes de Contato Dentais - Facetas Cerâmicas - que se baseiam na ideia de recobrimento do esmalte dentário por uma fina lâmina cerâmica de espessura entre 0,2 a 0,5 mm adaptada e aderida à face vestibular dos dentes, exigindo nenhum ou mínimo desgaste. Com o aprimoramento de técnicas e materiais na Odontologia, foi possibilitado o desenvolvimento de Lentes de Contato Dentais com maior excelência em propriedades ópticas, físicas, biocompatibilidade, resistência, além de maior longevidade. O planejamento deve ser feito criteriosamente levando em consideração a anatomia do dente e proporções dentárias e faciais para que não apenas a estética, mas a função e resistência dental possam ser restabelecidas.

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA, CUIDADOR INFORMAL, PSICOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS DO CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER

SILVA, Nàgila Pereira*; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SILVA, Yanlessa de Jesus David; SANTOS, Alison Reis; SAMPAIO, Karen Silva; LEITE, Zinole Helena Martins; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

A Leucemia Linfóide Aguda é um dos cânceres mais comum em crianças. As implicações deste adoecimento estendem-se à família e também a equipe de saúde.. Este estudo bibliográfico e descritivo objetiva descrever os aspectos psicossociais relativos ao cuidador informal de crianças com Leucemia Linfóide Aguda. Utilizaram-se obras diversas sobre o tema bem como analisou-se 50 artigos em português, disponíveis nas bases de dados SCIELO, Google Acadêmico, PePSIC, LILACS, BIREME através das palavras: crianças com câncer, leucemia, cuidador de crianças com câncer, leucemia linfóide aguda. Foram selecionados os artigos completos que contemplavam uma visão integral da temática, ou seja, discutiam a leucemia linfóide aguda do ponto de vista psicossocial, clínico e do cuidador. Foram excluídos artigos incompletos, sem resumo e de língua estrangeira. Revisão: O cuidar de crianças com Leucemia Linfóide Aguda implica em uma série

de alterações estruturais, psicológicas e financeiras que repercutem sobremaneira na vida do cuidador informal . As situações frequentes de stress em que se encontram submetidos os cuidadores informais frequentemente podem gerar doenças tanto físicas quanto psíquicas . Observou-se que são frequentes entre os cuidadores informais de crianças com Leucemia Linfóide Aguda sentimentos de ansiedade e angústia, bem como constante ambivalência afetiva-emocional Conclusão: Salienta-se a necessidade de intervenção interdisciplinar junto a cuidadores de crianças com Leucemia Linfóide Aguda, restituindo-lhes a qualidade de vida.

MAL DE ALZHEIMER E CUIDADORES: UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES BIOPSISSOCIAIS DO CUIDAR

VINHAIS, Julianne Vasques Mendes*; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; SILVA, Yanlessa de Jesus David; SAMPAIO, Karen Silva; LIMA, Rusiane Brito; Zinole Helena Martins; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

O envelhecimento é um fenômeno biopsicossocial. Apesar de natural, pode vir acompanhado de uma série de patologias, como o Mal de Alzheimer que acarreta uma série de deteriorizações físicas e psíquicas. Esta pesquisa bibliográfica objetiva descrever as implicações biopsicossociais relativas ao cuidar de idosos com Mal de Alzheimer. Realizou-se por meio de leituras e análise de obras referentes ao assunto bem como, de 30 artigos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no período de 2000 a 2014 através das seguintes palavras chaves: “Mal de Alzheimer”, “Cuidador”, Alzheimer, “Alzheimer e família. Revisão: O Mal de Alzheimer é uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos, cuja incidência pode ser tardia , 60 anos de idade ou precoce , 40 anos de idade . É o quadro demencial mais frequente entre os idosos, cujas alterações patológicas provocam uma total dependência do idoso em relação ao seu cuidador, Conclusão : Cuidadores informais são os que mais se dedicam a idosos acometidos pela doença de Alzheimer. Ordem de parentesco e gênero são fatores que influenciam nos aspectos biopsicossociais envolvidos no cuidar de pessoas com Mal de Alzheimer. Cuidadores informais são acometidos de transtornos de ordem física e psíquica, que comprometem aspectos do seu cotidiano. Há necessidade de atenção integral ao cuidador para preservar sua saúde mental.

MANEJO DO PACIENTE ESPECIAL EM ODONTOLOGIA

SILVA, Mariana Siqueira*; AMARAL, Ganesa Raulino; LIMEIRA, Herick Cruz; COSTA, Fernanda Drielly Amorim; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: ganesa.amaral@hotmail.com

O desafio do tratamento de pacientes com necessidades especiais é o manejo, em que, há com frequência as reclamações e resistências dos pacientes no ato de atendimento. Assim, são consideradas as limitações do paciente e suas expectativas, valores, crenças, atitudes e sentimentos. Nesses casos, a motivação do paciente é maior quando se utiliza de outros métodos para os ensinamentos e tratamentos alternativos que incentivem o paciente e compreenda toda sua capacidade. Há uma ponderação de cada manejo nas suas especificidades levando em consideração as indicações de fármacos e interação medicamentosas, tais como gestantes, dependentes químicos, pacientes com transtornos psíquicos e entre outros. Já o uso e posicionamento da cadeira são necessários nas particularidades das gestantes e deficientes físicos; saber a posição e inclinação certo da cadeira, além de um manejo meticuloso evitando movimentos bruscos; e em situações de movimentos involuntários utiliza-se de contenção física, no qual, há um planejamento de consultas rápidas evitando fadiga muscular e estresse. Algumas técnicas que facilitam o estreitamento da relação paciente e dentista, como a de “dizer, mostrar e fazer” ajuda na cooperação mútua e acalma o paciente. Exemplos como esses e vários outros tipos de pacientes especiais, tais como diabéticos, pessoas com outras deficiências mentais e físicas e até a própria odontopediatria exigem tratamentos também especiais. O enfoque deste trabalho será uma revisão de literatura de manejo e formas de contenção do paciente especial em odontologia.

MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS BACTERIANAS

OLIVEIRA, Letícia Soares Lula*; CARVALHAL, Lícia Iracy Nunes; FONTENELLE, Anna Thereza Santos Penha; LIMA, Antônia Makasayane Araújo; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Curso: Odontologia

Email: leticiaslo@yahoo.com

Visto que muitas doenças sistêmicas causadas por bactérias podem afetar a região estomatognática na forma de lesões granulomatosas, o presente trabalho expôs essas diversas formas de manifestação oral direta e indireta de doenças bacterianas infecto contagiosas como hanseníase cujo sintomas são dor nas articulações, aparecimento de bolhas e eritema na pele; já a sintomatologia da sífilis inclui dor muscular, febre e mal-estar; no caso da pneumonia ocorre algia aguda no peito; em relação a tuberculose é frequente tosse com sangue; e na gonorreia

evidencia-se dor circunstancial durante a micção, dor de garganta e febre. Ainda é pouco explorado o manejo e a conduta clínica quando há sinais bucais dessas patologias, portanto, o comportamento da mucosa oral de pacientes com essas respectivas enfermidades em desenvolvimento foi estudado, e observou-se como as mesmas interferem nos tratamentos odontológicos a serem feitos posteriormente. De modo geral, a saúde bucal desses pacientes precisaria de maior atenção. Quando se trata de saúde e bem estar é de suma importância que seja feito um trabalho multidisciplinar para diagnosticar uma patologia, atingindo, dessa forma, diagnósticos diferenciais para lesões estomatológicas, sendo assim, é fundamental o papel do cirurgião-dentista. O resultado desse estudo sugeriu que o exame clínico sistemático da boca constitui foco importante para o reconhecimento de manifestações bucais de inúmeros quadros patológicos gerais. E pela especificidade de sua formação acadêmica, os cirurgiões-dentistas constituem um grupo de importância nas equipes multiprofissionais que se dedicam a esse tipo de diagnóstico.

MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS BACTERIANAS

DE OLIVEIRA, Letícia Soares Lula*; CARVALHAL, Lícia Iracy Nunes; FONTENELLE, Anna Thereza Santos Penha; LIMA, Antônia Makasayane Araújo; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: leticiaslo@yahoo.com

Visto que muitas doenças sistêmicas causadas por bactérias podem afetar a região estomatognática na forma de lesões granulomatosas, o presente trabalho expôs essas diversas formas de manifestação oral direta e indireta de doenças bacterianas infecto contagiosas como hanseníase cujo sintomas são dor nas articulações, aparecimento de bolhas e eritema na pele; já a sintomatologia da sífilis inclui dor muscular, febre e mal-estar; no caso da pneumonia ocorre algia aguda no peito; em relação a tuberculose é frequente tosse com sangue; e na gonorreia evidencia-se dor circunstancial durante a micção, dor de garganta e febre. Ainda é pouco explorado o manejo e a conduta clínica quando há sinais bucais dessas patologias, portanto, o comportamento da mucosa oral de pacientes com essas respectivas enfermidades em desenvolvimento foi estudado, e observou-se como as mesmas interferem nos tratamentos odontológicos a serem feitos posteriormente. De modo geral, a saúde bucal desses pacientes precisaria de maior atenção. Quando se trata de saúde e bem estar é de suma importância que seja feito um trabalho multidisciplinar para diagnosticar uma patologia, atingindo, dessa forma,

diagnósticos diferenciais para lesões estomatológicas, sendo assim, é fundamental o papel do cirurgião-dentista. O resultado desse estudo sugeriu que o exame clínico sistemático da boca constitui foco importante para o reconhecimento de manifestações bucais de inúmeros quadros patológicos gerais. E pela especificidade de sua formação acadêmica, os cirurgiões-dentistas constituem um grupo de importância nas equipes multiprofissionais que se dedicam a esse tipo de diagnóstico.

MANIFESTAÇÕES BUCAIS DA DOENÇA ENXERTO-VERSUS-HOSPEDEIRO

SILVA, Maressa Keila de Souza; SILVEIRA, Luiza Carneiro; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos;

Email: mgmaressakeila@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A doença enxerto-versus-hospedeiro é uma síndrome que acomete pacientes pós-transplante de medula óssea, cerca de 30 à 70%, consiste em uma reação imunológica e corresponde a maior causa de mortalidade em pacientes submetidos a este tratamento. Suas manifestações clínicas afetam mais frequentemente a pele, trato gastrointestinal, fígado, sistema linfóide e mucosa oral, podem ocorrer em um único órgão ou estarem disseminadas. A mucosa oral pode corresponder ao primeiro sítio de manifestação da doença, apresentando leucoedema, estrias brancas, ulcerações dolorosas, ardência bucal, xerostomia, mucocele e atrofia da mucosa bucal. O cirurgião dentista tem papel importante, auxiliando no reconhecimento precoce, complicações e no manejo da doença oral para aliviar os sinais e sintomas, manter as funções e restaurar a integridade da mucosa.

MARSUPIALIZAÇÃO EM CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS

FARIAS, Marcos Felipe Castro*; ROSETTI, Maryelle Milen; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: lip.castro@hotmail.com

A marsupialização é uma forma de tratamento para alguns cistos e tumores odontogênicos que foi descrita pela primeira vez por Carl Partsch, em 1892. Também referida como descompressão ou operação de Partsch, a técnica consiste na criação de uma janela cirúrgica na parede do cisto, esvaziando o seu conteúdo e mantendo a continuidade entre a lesão e a cavidade oral, seio maxilar ou a cavidade nasal. A única parte do cisto a ser removida é o pedaço retirado para fazer a janela. O revestimento cístico remanescente deve ser deixado in situ (no local). Este processo diminui a pressão intracística e promove a regressão da lesão e neoformação óssea. A principal

vantagem desta técnica é a de ser um procedimento simples de realizar, além de poupar estruturas vitais de danos que possivelmente seriam provocados por uma enucleação imediata. Como desvantagem seria a de deixar tecido patológico no local e diversas inconveniências para o paciente. A marsupialização pode ser utilizada como o único método (raramente) de tratamento para os cistos, assim também como uma etapa preliminar no tratamento, com a enucleação adiada para um segundo momento. Está indicada em situações em que há riscos de injúria às estruturas vitais e aos dentes vizinhos, bem como quando há possibilidade de fragilização da estrutura óssea. As características da lesão, assim como também a idade do paciente devem ser levadas em consideração antes da escolha pelo procedimento

MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS, HISTÓRIA QUE ACOMPANHA A HUMANIDADE.

SOUSA, Erica Louzeiro*; SILVA, Jozielma Bastos; CANTO, Julia Araújo Silva; CHAVES, Jéssica Bastos; SANTOS, Querlenilde Ferreira; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: erica_souusa@outlook.com

A partir das últimas décadas maus-tratos contra criança foi admitida como problema de saúde pública devido à ampla gama de conseqüências que pode gerar, nas diversas áreas do desenvolvimento humano. Objetivou-se identificar os danos deixados pelo histórico de agressão e abuso na vida das crianças vítimas de maus-tratos e os mecanismos de intervenção dos profissionais da Psicologia no campo da saúde e políticas públicas. Trabalho de revisão bibliográfica, bem como o mapa da violência e o balanço anual do disque 100. maus-tratos contra criança refere -se a qualquer tipo de ação, comportamento e atitude que prejudique a integridade física ou mental, através de punições físicas, trabalho forçado, negligência, ausência de cuidados, entre outros, é um ato de crueldade, desumanidade. Com a nova portaria 1968/2001 do Ministério da Saúde os profissionais devem comunicar às autoridades competentes casos de suspeitas de violência. No contexto atual das políticas, o profissional de Psicologia tem sido convocado a ocupar espaços cada vez mais diferenciado como no Serviço de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e suas Famílias. A violência deve ser compreendida como produto de um sistema complexo, de relações historicamente construídas e multideterminadas, que envolve diferentes realidades de uma sociedade, assentadas em uma cultura, permeadas por valores e representações.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONSTRUINDO REFLEXÕES ACERCA DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATENDO A ESTIGMATIZAÇÃO

DA LUZ, Jéssica Barbosa*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; ARAÚJO, Ana Paula Maranhão; NUNES, Josiele Dias; BUZAR, Jorgeana Parga; DA SILVA, Nelma Pereira;

Email: josielle@hotmail.com

Área / Especialidade: Psicologia

A psicologia integrada com outras áreas do saber e vem desempenhando um papel fundamental, no que diz respeito à aplicação de medidas socioeducativas no contexto de jovens infratores. Objetiva-se com este estudo identificar os fatores que influenciam a população infanto-juvenil cometerem atos infracionais promovendo uma reflexão acerca da exclusão e discriminação social que vivem esses jovens. Esse trabalho trata-se de uma revisão da literatura a partir de busca de descritores, “exclusão social, medidas socioeducativas, Psicologia Social”. Utilizou-se como instrumentos a base de dados: Google acadêmico, capes, bireme. Verificou-se na literatura consultada que um percentual significativo destes jovens possui um histórico de fracasso escolar, dificuldades em manter uma relação social saudável, problemas em resolver conflitos, em relação a si mesmo e a sua condição econômica, apresentando uma desordem em relação a esses sentimentos. Observou-se que o adolescente infrator pode ser influenciados por atividades informais, como o tráfico, roubo etc., fazendo uso dessas atividades infracionais, como forma de conquistar sua independência financeira, esses levantamentos apontam aspectos necessários a serem refutados, porém não suficientes ou mesmo exclusivo ao se tratar da subjetividade em processo de desenvolvimento. Conclui-se que a Psicologia através da abordagem social poderá realizar uma intervenção psicossocial através de uma perspectiva que leva em consideração aspectos psicológicos, físicos, sociais e emocionais desses jovens, trabalhando o fortalecimento de vínculos. Palavra - chave: Exclusão social, Medidas socioeducativas, Psicologia Social.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ODONTOLOGIA POR IMAGEM

LEHMKUHL, Nery Nunes*; DO NASCIMENTO, Marcos Vinicius Monteiro; ROCHA, Thays De Sousa Medeiros; BRAGA, Vinicius Guilherme Leitão Dos Santos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Email: thaysmedeirosrocha@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

A imaginologia é uma das maiores ferramentas do cirurgião dentista, ao revisar parte da literatura disponível, percebe-se como os avanços tecnológicos nesta área possibilitam diagnósticos cada vez mais precisos e precoces, além de mais seguros e menos invasivos. Nota-se que, apesar de continuar como a mais utilizada, a técnica de radiografia utilizando filme convencional está sendo gradualmente substituída por técnicas mais avançadas, onde os filmes

são substituídos por sensores que permitem a imediata digitalização e manipulação da imagem. Um dos maiores avanços está relacionado a tecnologias como a tomografia Computadorizada, principalmente a TC de feixe cônico (cone beam), que permite produzir imagens 3D, se comparado a técnica radiológica convencional que tenta representar estruturas tridimensionais em 2D, o que resulta em perda de fidelidade na representação de ditas estruturas. Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas pelos raios-x, a TC evidencia as relações estruturais em profundidade, mostrando imagens em “fatias” do corpo humano. A TC permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com uma definição admirável, permitindo a delimitação de irregularidades tridimensionalmente. A Ressonância Magnética é outra técnica muito interessante, considerada padrão ouro na avaliação de tecidos moles, como o disco da ATM, além de evitar a utilização de radiação ionizante. Além destes, vale mencionar também a ultrassonografia, muito utilizada na avaliação de tecidos musculares, por exemplo. Todos esses avanços são de grande ajuda para que o cirurgião dentista possa cuidar de seus pacientes da melhor maneira possível.

MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HALITOSE

LAGO, Eulla Pâmela Nascimento*; ARAUJO, Ione Haladiah Gomes; SANTOS, Aline Silva; OLIVEIRA, Thaís Bezerra da Maceno; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro

Email: eullapamela@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Halitose é um termo técnico para mau hálito e tem origem do latim halitus, que significa hálito, e do grego osis, que significa anormal ou doente. Para se chegar ao diagnóstico, antes da primeira consulta, o paciente recebe um questionário médico geral e um questionário específico para a halitose. As técnicas e estratégias para diagnóstico são realizadas com as Medidas Organolépticas, com um Monitor de Sulfeto (Halimeter), e com a Cromatografia Gasosa. A halitose pode ser classificada como: genuína fisiológica e patológica, pseudo-halitose e halitofobia. Como medidas para o tratamento da halitose, o paciente é encaminhado para psicólogo, em caso de pseudo-halitose e halitofobia, deve-se dar atenção ao periodonto, xerostomia, ciclos menstruais e estresse, que são fatores predisponentes para o aumento de VSC em odor bucal. Deve-se prescrever o uso de raspadores de língua, uso de dentifrícios com triclosan, fermento soda, óleos essenciais ou fluoreto estanhoso, e um enxaguatório. É importante que o paciente com halitose realize uma visita de retorno, onde o examinador pergunta se a terapia recomendada funcionou. O teste organoléptico, a medida com monitor

de sulfeto e a cromatografia gasosa são utilizadas novamente. Por isso, devido a halitose apresentar uma etiologia multifatorial, é necessário um diagnóstico preciso e elaboração do plano de tratamento adequado. O trabalho tem como objetivo, através da revisão de literatura, mostrar os métodos de diagnóstico e formas de tratamento que o cirurgião dentista deve adotar para promover uma vida saudável ao paciente.

MICROBIOTA INTESTINAL E A RELAÇÃO COM A OBESIDADE

COSTA, Gabrielle Damasceno Evangelista*; PINHEIRO, Déborah Belo Paz; SOUSA, Mycaele Aline Santana; SOUZA, Ângela Tamara Lemos.

Curso: Nutrição

Email: gabrielle-damasceno09@hotmail.com

A obesidade é um problema de saúde pública, sua prevalência segundo a ABESO é cerca de 49,24% da população brasileira. A relação da microbiota intestinal com a obesidade é assunto da atualidade, pois estudos apontam que ela pode alterar o equilíbrio da flora intestinal.

RESUMO: O estudo objetiva analisar a relação da obesidade e as alterações na composição da microbiota intestinal e a prevalência de outras morbidades. O estudo compreendeu uma extensa revisão de literatura, como base se dados SCIELO, PUBMED, LILACS, GOOGLE ACADÊMICO entre os anos de 2010 – 2015, os descritores utilizados foram: obesidade, microbiota intestinal, metabolismo energético. Os estudos ressaltam que a composição da microbiota intestinal influencia na regulação do peso corporal e no desenvolvimento de doenças relacionadas à obesidade, evidenciando que a flora de obesos se difere dos indivíduos magros. Destacou-se o aumento da presença de Firmicutes na microbiota de indivíduos que tinham uma dieta hipercalórica e a diminuição das bacteroidetes. Tais bactérias interferem no surgimento de fisiopatologias, como a resistência a insulina, causada pelo estado de inflamação e outras doenças crônicas, além de ter grande impacto no sistema imunológico. O uso de probióticos, prebióticos, suplementação de frutooligossacarídeo, tipo de dieta e transplante de fezes são algumas alternativas utilizadas como forma de tratamento apontado pelos estudos.

CONCLUSÃO: É necessário reafirmar e ampliar as evidências científicas em relação aos microrganismos intestinais, sua influência na participação direta no desenvolvimento da obesidade e identificar bactérias benéficas que auxiliam no controle de tal morbidade e em desordens metabólicas.

MORTALIDADE NO MARANHÃO POR DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

LEITE, Denes Sousa Leite; FERREIRA, Romulo Maia; VIANA, Pâmela Ruth Santos; SOUSA, Felipe Alberth Ferreira de; ALMEIDA, Magno da Silva Santos; SUAIA, Bismarck Ascar

Curso: biomedicina

Email: denessousa27@gmail.com

Resumo: A morte no Brasil, em particular no Maranhão, por doenças negligenciadas como a Malária decorre de precárias políticas públicas de saúde sem um aporte de recursos humanos e econômicos. Objetivando descrever a ocorrência de óbitos por malária no estado, foram levantados dados descritivos dos números de casos de mortalidade no ano de 2014, sua epidemiologia em boletim informativo do DATASUS, com acesso direto à rede de informação. Como resultado foi obtido um maior percentual de homens (n = 19.101; 60,92%), pardos (n=20.146; 64,25%), com idade superior a 20 anos (n = 27,988; 89,26%). Concluiu-se que existe endemicidade por doença de alta prevalência com critérios de negligenciamento por parte do poder público nas três esferas da administração, a Malária representa uma doença de grande difusão e mortalidade no estado.

MORTALIDADE POR DOENÇA ISQUÊMICA DO CORAÇÃO NAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS: ENFOQUE SOCIOECONÔMICO.

GARCEZ, Marina Vanessa Maciel*; DE OLIVEIRA, Natalia Nascimento; LOPES, Marlio Rodrigues; LOBATO, Merismar Sousa Dos Santos; NASCIMENTO, Maria Do Carmo Mourão; CARVALHO, Tatiana De Sousa Sobral; FONTENELE, Rafael Mondego

Email: marina_garcez@hotmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

O presente estudo teve como objetivo investigar a associação entre alguns indicadores de nível socioeconômico e mortalidade de adultos por doenças isquêmicas do coração no Brasil. Foram analisados os óbitos por doenças cardiovasculares ocorridos no período de 2003 a 2013, em adultos de 20 a 80 anos ou mais, disponibilizados pelo Sistema de Informação de Mortalidade. Foram selecionadas para análise as cinco macrorregiões do país. Para o cálculo das taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares do período, considerou-se como numerador o número de óbitos do período e como denominador, o resultado da soma da população do Censo 2010. As taxas foram ajustadas por idade pelo método direto, considerando como a população recenseada do Brasil em 2010 como padrão. Os indicadores socioeconômicos mostraram uma grande variação. Em relação às Doenças isquêmicas do coração, a maior taxa de mortalidade foi de 15.62 por 100.000 habitantes, cinco vezes maior do que a da macrorregião norte que apresentou a menor taxa (2.95 por 100.000 habitantes). Os resultados encontrados indicam que a mortalidade por doenças isquêmicas do coração acomete principalmente regiões onde a renda

fica concentrada nas mãos da minoria e de populações com precárias condições de moradias.
DESCRITORES: Doenças isquêmicas. Mortalidade. Fatores socioeconômicos.

MULHERES SORO POSITIVO: um estudo em um Centro de Testagem e acolhimento (CTA) de São Luis-MA

DE OLIVEIRA, Ariane Muniz*; MONTEIRO, Pablo De Matos; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; NORONHA, Francisca Maria Ferreira Noronha

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

A epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida- AIDS no mundo tornou-se um ícone de grandes questões que afligem a todos, como direitos humanos, qualidade de vida, políticas de medicamentos e propriedade industrial. Por seu caráter pandêmico e sua gravidade, a AIDS representa um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. O presente estudo teve como objetivo conhecer a frequência de mulheres soro positivo em um Centro de Testagem e Aconselhamento de São Luís – MA. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo e documental de caráter descritivo exploratório de natureza quantitativa. A amostra da pesquisa foi constituída por 30 mulheres que realizaram o teste HIV no período do estudo. O instrumento de coleta de dados foi um relatório documental contendo todas as informações relacionadas com o tema e objeto do estudo apresentando a resposta dos questionamentos com a finalidade de encontrar o resultado esperado com os objetivos da pesquisa. Conforme a análise dos dados encontrados, observou-se 73,4% das mulheres tinham entre 22 a 41 anos, 43,3% possuíam união estável, 33,3% possuíam primeiro grau incompleto, 69,9% se autodenominaram de cor parda, em relação à ocupação das 40% afirmaram ser do lar, 93,3% não apresentaram diabetes. Com relação à via de transmissão das mulheres, houve predominância 60% por via heterossexual, 23,30% das mulheres pesquisadas faziam uso de tabagismo e 33,30% utilizavam álcool, 93,4% não apresentaram infecções oportunistas, e 93,4% das mulheres responderam que fazem uso no tratamento de antiviral. Palavras-chave: Aconselhamento. Mulheres. Soro Positivo.

MULHERES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO SENSORIAL, CORPO E DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

VIDIGAL, Laisa Ortegá*; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; FRANÇA, Regina Célia Cantanhede; LIMA, Rusiane Brito; ARAUJO, Patrícia Maria Sombreira; LEITE, Zinole Helena Martins.

Curso: Psicologia

Email: becanepomuceno@gmail.com

Quando se pensa na sexualidade de pessoas com deficiência não sensorial, inúmeros mitos associam-se a este comportamento, os quais geram preconceitos, estereótipos e estigmas que impedem o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Mulheres com deficiência são duplamente vulneráveis, o que obstaculiza ainda mais o exercício destes direitos. O objetivo deste estudo bibliográfico e descritivo é analisar os obstáculos enfrentados por mulheres com deficiência física não-sensorial no exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Procedeu-se à leitura e análise de vinte artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO e Biblioteca Virtual de Saúde, através das palavras-chave: Gênero e Deficiência Física, Sexualidade e Deficiência e Direitos sexuais e reprodutivos. Revisão: Há inúmeros mitos relativos à sexualidade das pessoas com deficiência física não-sensorial que obstaculizam o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. A sociedade tem uma baixa expectativa em relação à mulher com deficiência considerando-a incapaz de se cuidar, de ser mãe e de cuidar do lar. Conclusão: Dessa forma, mulheres com deficiência física não sensorial sofrem duplo preconceito e encontram-se duplamente vulneráveis. Estas condições ocasionam nelas sentimentos de desvalorização que se dirigem para vários aspectos de suas vidas pessoais, sociais e profissionais, impedindo-as também de exercer plenamente papéis sociais relativos à sexualidade, maternidade, vida conjugal.

MENINGITE BACTERIANA E PERDA AUDITIVA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

TORRES, Nairanne Carvalho*; CALDAS, Érica Alessandra.

Email: nayrane.carvalho.gth@gmail.com

Curso: Fonoaudiologia

A meningite bacteriana é uma doença grave que causa inflamação nas meninges, ocasionando diversos danos no organismo do portador da doença, entre esses prejuízos encontra-se a perda auditiva. O presente artigo tem como objetivo correlacionar à doença meningite bacteriana como uma das causas de perda auditiva e suas características. O artigo se trata de uma revisão de literatura em que buscou-se instrumentos para sua elaboração referente aos anos de 2000 a 2012. Conclui-se então que pacientes portadores da doença meningite bacteriana geralmente apresentam perda auditiva, sendo esta do tipo neurosensorial, grau profundo, descendente, bilateral, causadas por esta doença, cujo os agentes etiológicos são: *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* e *Streptococcus pneumoniae*.

MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HALITOSE

LAGO, Eulla Pâmela Nascimento do*; ARAÚJO, Ione Haladiah Gomes; Santos, Aline Silva dos; Oliveira, Thaís Bezerra da Maceno; JÚNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro.

Email: eullapamela@hotmail.com

Curso: Odontologia

Halitose é um termo técnico para mau hálito e tem origem do latim halitus, que significa hálito, e do grego osis, que significa anormal ou doente. Para se chegar ao diagnóstico, antes da primeira consulta, o paciente recebe um questionário médico geral e um questionário específico para a halitose. As técnicas e estratégias para diagnóstico são realizadas com as Medidas Organolépticas, com um Monitor de Sulfeto (Halimeter), e com a Cromatografia Gasosa. A halitose pode ser classificada como: genuína fisiológica e patológica, pseudo-halitose e halitofobia. Como medidas para o tratamento da halitose, o paciente é encaminhado para psicólogo, em caso de pseudo-halitose e halitofobia, deve-se dar atenção ao periodonto, xerostomia, ciclos menstruais e estresse, que são fatores predisponentes para o aumento de VSC em odor bucal. Deve-se prescrever o uso de raspadores de língua, uso de dentifrícios com triclosan, fermento soda, óleos essenciais ou fluoreto estanhoso, e um enxaguatório. É importante que o paciente com halitose realize uma visita de retorno, onde o examinador pergunta se a terapia recomendada funcionou. O teste organoléptico, a medida com monitor de sulfeto e a cromatografia gasosa são utilizadas novamente. Por isso, devido a halitose apresentar uma etiologia multifatorial, é necessário um diagnóstico preciso e elaboração do plano de tratamento adequado. O trabalho tem como objetivo, através da revisão de literatura, mostrar os métodos de diagnóstico e formas de tratamento que o cirurgião dentista deve adotar para promover uma vida saudável ao paciente.

NEUTROPENIA CICLÍCA: REVISÃO DE LITERATURA

PEREIRA, Caroline Zilma Kalil de Paula Costa*; SAMPAIO, Hellen Lobato; MOREIRA, Hyngrid Carolinne Soares Ferreira; NUNES, Leticia Corrêa; MOURA, Tábata Maria Leite Machado de; FALCÃO, Ângela; VIANA, Juliane Cançado.

Email: carol_zilma@hotmail.com

Área / Especialidade: Farmácia

Neutropenia Cíclica é uma patologia congênita, autossômica dominante rara, caracterizada pela falência na produção dos neutrófilos (importantes células imunológicas na resposta inicial aos agentes patológicos) por parte da medula óssea, ocorrendo alterações no quantitativo do mesmo periodicamente – com duração de 3-10 dias, que se repetem em intervalos de 14-21 dias. Esta falência ocorre devido a uma mutação no gene ELANE, localizado no cromossomo

19.p13.3 e que é responsável pela codificação da enzima neutrófilo elastase – enzima dos grânulos nos neutrófilos. Em decorrência da baixa no quantitativo de neutrófilos, o paciente apresenta sintomas recorrentes como febre, faringite, estomatite, lesões de boca associadas à gengivite crônica e infecções de pele. Três métodos podem ser adotados para o diagnóstico para Neutropenia Cíclica: 1- realização de hemogramas duas vezes por semana, durante seis semanas; 2- teste genético através do cromossomo 19; e 3 - entrevista com os familiares - por se tratar de uma doença autossômica dominante, um dos pais, obrigatoriamente, apresenta o gene da doença para que o filho possa manifestá-la. Inicialmente, o tratamento deve ter como objetivo o controle das infecções e febres recorrentes. Comitantemente, faz-se uso de fatores estimulantes de linhagem mielóide, como o G-CSF filgrastim, que regula a linhagem neutrofílica, promovendo o aumento dos níveis de neutrófilos circulantes e principalmente, diminuindo o tempo de maturação. Desta forma, observa-se que escassez de informações sobre a doença está diretamente relacionada à raridade de sua ocorrência, prejudicando a elaboração de novos tratamentos que promovam o bem-estar e melhoria da qualidade de vida do paciente.

NOVOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ODONTOLOGIA PARA DOENÇA PERIODONTAL E CÁRIE

FELÍCIO, Ysabelle Yasminni Lobo Ferreira Fernandes*; ROZÁRIO, Victoria Monteiro Do; MUNIZ, Rafaela Costa; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: thaysmedeirosrocha@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Sabe-se que o diagnóstico é resultado do processo de análise através do qual o especialista, neste caso cirurgião dentista, faz uso de exames complementares e conhecimento clínico para chegar a uma conclusão. Com o passar do tempo a Odontologia vem utilizando métodos e técnicas cada vez mais modernas para diagnosticar determinados tipos de doenças bucais com a maior precisão e rapidez possível, agregando também como o baixo custo, auxiliando na obtenção do diagnóstico. Estes métodos podem utilizar tecnologias focando no diagnóstico por imagem ou outros meios como, por exemplo, uso de laser fluorescente, sondagem periodontal eletrônica. O aparelho de fluorescência a laser (DIAGNOdent) é método constituído de um laser de diodo com comprimento de onda de 655 nm, que emite uma luz, que é absorvida pelos componentes dentários. Por se tratar de um método quantitativo, propõe-se que a fluorescência a laser seja capaz de monitorar as alterações minerais em lesões incipientes em esmalte e avaliar a eficácia de medidas preventivas, não invasiva se apresenta bons resultados na detecção de lesões de cárie em superfície oclusal e em superfície lisa. A sonda periodontal computadorizada tem reprodução superior e significativamente mais sensível em detectar perda de inserção que a sonda periodontal manual. A sonda eletrônica apresenta vantagens como dados eletrônicos,

exames cegos para pesquisas, alta resolução, capacidade de acesso a qualquer local ao redor dos dentes e pressão controlada, tendo como a principal desvantagem o alto custo e a necessidade de calibração e treinamento do examinador.

NUTRIENTES NEUROPROTETORES NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

SANTOS, Mariana Sales dos; AZEVEDO, Camila Rodrigues; BELFORT, Iara Araújo; ; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu

Curso: Nutrição

Email: marianasalesdossantos96@gmail.com

Resumo : Introdução: A doença de Parkinson e de Alzheimer são doenças incapacitantes, neurodegenerativas, progressivas, e com causas desconhecidas (SOARES et al., 2008). Que pode ter como consequência a Epilepsia, caracterizada por convulsões que podem produzir danos neurais em diversas áreas do cérebro. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes neuroprotetores estabelece relação direta com o sistema nervoso, já que as moléculas precursoras de neurotransmissores são provenientes dos alimentos (ZIEGLER, 2015). Revisão: Os dados obtidos foram direcionados a pacientes com morbidades neurodegenerativas. Verificou-se que a utilização de nutrientes neuroprotetores pode promover uma ação preventiva contra doenças do sistema nervoso. A vitamina E apresenta alto poder oxidante e o consumo precoce (iniciada na terceira década de vida) pode reduzir o estresse oxidativo e seus danos as células do cérebro de pacientes com Doença de Parkinson (SOARES et al., 2008). Em pacientes com Doença de Alzheimer, ocorre o déficit de acetilcolina, este neurotransmissor é encarregado da concentração, aprendizado e memória, sendo sintetizado a partir colina e lecitina e minerais como, zinco e cálcio (ANDRADE et al, 2012). A Vitamina C também tem um importante papel oxidante e exerce um poder terapêutico em pacientes epiléticos na proteção contra lesões cerebrais por meio da remoção de radicais livres formados, atuando diretamente na promoção de eventos neuroprotetores durante as convulsões (FREITAS et al, 2009). Conclusão: Uma alimentação rica com nutrientes neuroprotetores tem sido sugerida para diminuir eventos relacionados a danos cerebrais, podendo auxiliar no tratamento de doenças do sistema nervoso.

O IMPACTO DA DOENÇA PERIODONTAL NA GESTANTE EM RELAÇÃO AO PARTO PREMATURO

OLIVEIRA, Thais Bezerra da Maceno*; JUNIOR, Francisco Valcy Moreira de Oliveira; ARAÚJO, Ione Haladiah Gomes; SANTOS, Aline Silva; DO LAGO, Eulla Pamela Nascimento; JÚNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro

Email: thaisfisio@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A prematuridade é considerada a principal causa de morbimortalidade infantil, contribuindo com cerca de 60% para a mortalidade neonatal. Embora, atualmente, se tenha um melhor entendimento dos fatores envolvidos no parto, assim como maior acesso aos recursos terapêuticos para promover o bloqueio do trabalho de parto, não tem sido evidente a diminuição de casos de prematuridade. Dentre os fatores de risco que podem comprometer a gestação, estudos e evidências clínicas sustentam o importante papel exercido pelas infecções maternas sobre o parto prematuro. A doença periodontal, como uma infecção crônica, poderia exercer influência direta sobre este processo sendo necessária uma análise sobre o impacto do desequilíbrio do processo saúde-doença periodontal em gestantes. Diante da importância dos cirurgiões dentistas terem conhecimento sobre os fatores de risco associados ao parto prematuro e sabendo que há uma possível associação entre a doença periodontal e o nascimento de bebês pré- termos, o presente estudo tem como objetivo descrever através de uma revisão de literatura a relação entre a condição periodontal materna e o nascimento de bebês prematuros.

O USO DE FITOTERÁPICOS ANTI-INFLAMATÓRIO: PRÓPOLIS (GEOPRÓPOLIS)

DA COSTA, Drielly Carmen Silva*; DE OLIVEIRA, Daniele Bezerra; SANTOS, Vilianne Cavalcante; CARVALHO, Amanda Viana; DOS ANJOS, Tarcila Ferreira; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL; Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: viliane_c.s@hotmail.com

A família Apidae é a única que consiste primariamente de abelhas sociais que são divididas em Meliponinae e Apinae, a qual pertence a Apis mellifera L. a espécie mais estudada. Dentre os produtos originados pelas abelhas o própolis, geoprópolis vem mostrando por meio de estudos sua eficácia fitoterápica com inúmeras propriedades farmacológicas entre atividade anticancerígena, antioxidante, fungicida, antibacteriana, antiviral e anti-inflamatória. Apresenta mais de 200 compostos químicos sendo os principais compostos ativos flavonoides, fenólico, ácidos aromáticos. O uso como remédio popular é datado milhares de anos. Em Odontologia é utilizado principalmente para combater as inflamações no período pós-operatório aumentando a produção de IL-4 e IL-10, das citocinas anti-inflamatórias, diminuição de exsudato inflamatório e ativação de macrófagos. No Brasil existem 13 grupos distintos, porém se destacado a própolis verde relacionado à planta Baccharis dracunculifolia, conhecida popularmente alecrim-do-campo, e a última descoberta o Própolis Vermelha do Brasil presente nas folhas e flores do cajueiro.

ÓBITO POR LEISHMANIOSE VISCERAL NO MARANHÃO, 2015.

FURTADO, Haryne Lizandrey Azevedo; MENDES, Thayariane Lira; FIGUEIREDO, Alecksia Montelo; OLIVEIRA, Maciara da Silva; SAUAIA, Bismarck Ascar; SOUSA, Leila Cristina Almeida de
Curso: Biomedicina

Email: haryne.lizandrey@gmail.com

Resumo: A Leishmaniose visceral atinge áreas urbanas e periurbanas de regiões metropolitanas do Brasil, em particular o Maranhão. Nos últimos anos tem se observado um perfil de urbanização da doença com significativo índice de prevalência diagnosticado por sorotipagem ou manifestações clínicas. São evidentes os critérios de endemidade que doenças negligenciadas como a leishmaniose vem apresentando socialmente. Objetivando descrever a prevalência de óbitos por leishmaniose visceral no estado, foram levantados dados descritivos dos números de casos, sua epidemiologia em boletim informativo do DATASUS, com acesso direto à rede de informação. Como resultado foi obtido um maior percentual de homens pardos (n = 27; 71,05%), com idade entre 20 e 39 anos (n=09; 23,68%), seguido de 40 a 59 anos (n=08; 21,05%). Concluiu-se que existe endemidade por doença de alta prevalência com critérios de negligenciamento por parte do poder público nas três esferas da administração, comprometendo um percentual significativo da população economicamente ativa do Maranhão.

ODONTOMA E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

SILVA, Lara Araújo da; VERAS, Nicole Paiva; BEZERRA, Tarcíria Machado; DIAS, Laércio Santos
Curso: Odontologia

Email: lariinha_araujo@hotmail.com

Resumo : Objetivou-se fazer uma revisão de literatura sobre odontoma, visando fornecer aos cirurgiões-dentistas a importância do diagnóstico precoce. Os odontomas são considerados anomalias de desenvolvimento resultante do crescimento das células epiteliais diferenciadas e mesenquimais. São os tumores odontogênicos mais comuns, sendo responsáveis por 30-40% de todas as lesões. Sua etiologia é desconhecida, embora diferentes fatores, como traumatismos, infecções ou genéticas mutações possam estar envolvidos. Eles podem ser classificados em complexos; geralmente localizados na mandíbula; e compostos; normalmente localizados na maxila, sendo o último, o mais freqüente. Geralmente são assintomáticos, e constituem achados casuais. Normalmente os odontomas são encontrados na segunda década de vida, devido aos sinais clínicos como: atrasos na erupção, persistência do dente temporário, e a presença de um tumor, muitas vezes observada em exames radiográficos de rotina, onde apresentam-se como pequenas, solitárias ou múltiplas lesões radio-opacas. Têm sido associadas situações como impactação, mau posicionamento, reabsorção, má formação dentária e desvitalização dos

dentes adjacente a 70% dos odontomas. Em todos os casos, o tratamento de escolha é a excisão cirúrgica total da lesão, com posterior exame histológico para confirmar o diagnóstico. Este, quando feito precocemente é de essencial importância para que sejam evitados distúrbios na erupção dos dentes, impatações, atraso ou retenção prolongada de dentes decíduos, estabelecendo tratamentos prévios a possíveis má oclusões causadas por este tumor.

OXIDO NITROSO

SOARES, Ana Claudia Silva; LEITE, Italo Jimmy Nunes; MEDEIROS, Bruna Kelly Santana; DUAILIBE, Vanessa Paz; MACIEL, Andrezza Maciel Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Curso: odontologia

Email: italojimmy10@gmail.com

Resumo: Proporcionar ao paciente mais conforto durante os procedimentos odontológicos significa estar atento as novas técnicas, adotando em seu consultório um diferencial positivo no tratamento da saúde bucal e com isso diminuir o medo, o estresse e a ansiedade durante o procedimento. Uma das práticas utilizadas é a sedação consciente com óxido nitroso que se trata de uma técnica de sedação leve, segura e passível de titulação. Com uma de-pressão mínima do nível de consciência, a sedação por meio do óxido nitroso permite que o paciente mantenha a respiração espontânea, respondendo aos estímulos físicos e verbais e que se restabeleça imediatamente após a finalização da administração. Esta sedação é possível porque o óxido nitroso é um gás anestésico de menor potência, de absorção e eliminação rápida, que controla a ansiedade e proporciona uma sensação de relaxamento e conforto ao paciente. Para os cirurgiões-dentistas, a técnica chegou para facilitar o tratamento odontológico nos pacientes mais ansiosos e com traumas de cuidados anteriores. Com isso, os próprios profissionais conseguem realizar seus procedimentos com calma, critério e cautela, não tendo o medo do paciente como pressão para antecipar o término da sessão.

O PAPEL DAS METALOPROTEINASES NA DEGRADAÇÃO DA INTERFACE ADESIVA ENTRE DENTINA E RESINA COMPOSTA

DE MORAIS, Iaura dos Santos*; KUSSANO, Sandro Carvalho; GOMES, Isabela Azevedo; MOURA, Rommisson Yacones Lessa; DE ARAÚJO, Cássio Felipe Silveira; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; NOGUEIRA, Rodrigo Proença

Email: iaura_santos@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: As Metaloproteinases (MMPs) são enzimas proteolíticas que degradam colágeno presente no tecido dentinário. Desta forma, a longevidade de restaurações adesivas em resina

composta pode ficar comprometida se essas endopeptidases realizarem suas atividades de degradação nessa região. O objetivo deste trabalho é apresentar uma discussão a respeito do papel das MMPs na degradação da interface adesiva entre dentina e resina composta, como forma de alterar o tempo de vida útil dessa união, e a relação entre os inibidores exógenos de MMPs na manutenção dessa interface. Durante o processo adesivo se as fibras de colágeno não forem completamente recobertas pelo adesivo dentinário, estão sujeitas à ação colagenolítica das MMPs, comprometendo a durabilidade da interface adesiva a médio e longo prazo. As MMPs podem ser inibidas por inibidores endógenos teciduais (TIMPs), que são importantes no controle das MMPs in vivo. Várias estratégias vêm sendo aplicadas para inibir os efeitos das MMPs na degradação da camada híbrida com a aplicação dos inibidores exógenos como: Clorexidina, Galardina, Catequina. Fatores como o pH ácido, protocolo adesivo pode ativar as enzimas que, a princípio, são liberadas inativas. A aplicação da clorexidina após o condicionamento ácido não interfere na ação de ligação dos adesivos e previne a degradação pelas MMPs. O chá verde foi relatado como um inibidor natural das MMPs, reduzindo lesões erosivas e abrasivas na dentina, devido aos polifenóis presente em sua composição. Portanto, conclui-se que substâncias inibidoras de MMPs podem ser incluídas nos protocolos adesivos ampliando o tempo de vida útil dos procedimentos restauradores.

O USO DO BIOVIDRO NA ODONTOLOGIA RESTAURADORA

ARAÚJO, Cássio Felipe Silveira de Araújo; LEAL, Adriana Mara Araújo; KUSSANO, Sandro Carvalho; GOMES, Isabella Azevedo; CAMPOS, Lara Ferraz; CARNEIRO, Karina Kato

Curso: Odontologia

Email: cassiomelo123@gmail.com

Resumo: INTRODUÇÃO: O biovidro é um material bioativo que pode ser amplamente definido como aquele que foi concebido para induzir resposta biológica específica. Na Odontologia é utilizado para indução de deposição mineral em tecido ósseo e dentinário, o que permite regeneração tecidual e remineralização do substrato dentinário. DESENVOLVIMENTO: O primeiro biovidro comercial foi desenvolvido por Hench e colaboradores na década de 50 e nos dias atuais, o uso deste bioestimulador e suas variações têm sido amplamente pesquisados na Odontologia de biomateriais. Inicialmente foi utilizado em implantes dentários, porém seu uso é observado na incorporação de materiais restauradores, cimentos de inonômero de vidro, cimentos endodônticos e hipersensibilidade dentinária. CONCLUSÃO: A evolução das técnicas e protocolos de aplicação é uma realidade, desta forma as pesquisas que buscam aprimorar os resultados clínicos estão direcionando para o desenvolvimento de novos materiais, os quais sejam biocompatíveis e estimulem a regeneração do tecido vivo.

O VISAGISMO NA ODONTOLOGIA ESTÉTICA

MENEZES, Pedro Valdo Lucena de Menezes; OLIVEIRA, Bianca Bezerra de; SILVA, Natyla Maysa de Lima; GOMES, Isabella Azevedo; CARNEIRO, Karina Gama Kato; KUSSANO, Sandro Carvalho; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Curso: Odontologia

Email: iracylucena_adv@hotmail.com

Resumo: A odontologia estética está em constante evolução, com a incorporação de materiais e técnicas inovadoras. Atualmente, os fundamentos do visagismo têm sido empregados também na estética dental. O visagismo é conceituado como um toque de arte que envolve estética e beleza, baseado nos princípios de proporção e harmonia que refletem características físicas e de personalidade do indivíduo. Dessa maneira, o objetivo desse estudo é demonstrar os princípios que regem o visagismo e como este funciona, através da literatura científica. De acordo com a teoria dos humores de Hipócrates, os temperamentos humanos são divididos em quatro categorias: colérico ou retangular, melancólico ou oval, sanguíneo ou hexagonal e fleumático ou circular, e cada tipo facial possui características que são consideradas na busca da valorização de aspectos positivos e traços marcantes. Assim, conclui-se que quando o visagismo é empregado de maneira metódica, a partir da análise do formato do rosto, das feições e a personalidade do paciente, é possível alcançar a individualização do sorriso, representando grande satisfação pessoal do paciente.

OTOTOXIDADE NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO

RODRIGUES, Tuane Moraes*; CHEIN, Maria Bethânia da Costa; CALDAS, Érica Alessandra; CALDAS, Patrícia Andréia

Email: tuannemorais.rd@hotmail.com

Curso: Fonoaudiologia

Resumo: Diversos são os fatores que podem levar a perda auditiva, dentre eles a ototoxicidade devido ao tratamento oncológico. A ototoxicidade é considerada irreversível, do tipo neurosensorial e as drogas ototóxicas produzem sintomas cocleares e vestibulares associados ou não. O processo degenerativo do órgão de Corti, ocasionado pelo uso de ototóxicos poderia ser evitado através do adequado monitoramento auditivo. Em crianças a privação auditiva pode gerar danos maiores devido ao período de desenvolvimento da linguagem sendo assim de suma importância o diagnóstico precoce da alteração nos limiares auditivos. O estudo teve como objetivo realizar revisão bibliográfica sobre os principais medicamentos ototóxicos utilizados no tratamento do câncer e descrever a necessidade do monitoramento auditivo em crianças

submetidas a este procedimento. Palavras-chave: Câncer. Ototoxicidade. Criança. Perda auditiva.

O PAPEL DO PSICÓLOGO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO

PEREIRA, João Filho Gomes*; ARAUJO, Patrícia Maria Sombreira, FRANÇA, Regina Celia Cantanhede; SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito; LIMA, Rusiane Brito; LEITE, Zinole Helena Martins.

Curso: Psicologia

Email: celia.ufma@gmail.com

O envelhecimento é uma etapa significativa do desenvolvimento humano. É notório que a população idosa tem crescido em grandes proporções. Este aumento na expectativa de vida é fruto de avanços tecnológicos modernos, das descobertas científicas e da medicina. Objetiva-se com esta pesquisa bibliográfica refletir sobre o papel do psicólogo no enfrentamento à violência contra o idoso. Procedeu-se da leitura e análise de 16 artigos, publicados no período de 2002 a 2015, disponíveis nas bases de dados: LILACS, Google Acadêmico, SciELO, BVS Psicologia e Bireme. Revisão: O envelhecimento, em geral, provoca maior fragilidade ao organismo, como doenças, e, concomitantemente, vulnerabilidades. Percebe-se que, algumas vezes, fatores como a perda de vigor produtivo, maior dependência e a fragilidade física expõem a pessoa idosa a atitudes e comportamentos, por vezes, agressivos e violentos por parte de seus familiares ou cuidadores, resultando em violência física, sexual, psicológica, econômica e financeira ou patrimonial. Tão importante quanto às políticas assistenciais diante do processo de envelhecimento, é manter os vínculos afetivos e sociais. Conclusão: O combate à violência contra o idoso ainda é muito lento, tendo em vista que ela ocorre de maneira velada. O papel do psicólogo, no enfrentamento da violência contra a pessoa idosa é assegurar o seu bem-estar e garantir sua dignidade.

O ABUSO SEXUAL INFANTIL: AS CONSEQUÊNCIAS PÓS-TRAUMÁTICAS

BITTENCOURT, Lays Matos*; ALVES, Cândida Helena Lopes.

Curso: Psicologia

Email: laysbittencourt@gmail.com

O abuso sexual infantil está presente há muito tempo na história da violência cometida contra a criança. Por ser um tema que ainda é bastante presente, este estudo teve o objetivo de compreender as consequências do abuso sexual infantil e a importância de um acolhimento profissional para a vítima. O abuso sexual infantil por muito tempo foi ignorado, isso mudou com a criação dos direitos da criança onde o assunto passou a ser prioridade com ideias de

políticas públicas e ações sociais voltados para o assunto, pois uma criança que passa por este tipo de violência poderá desenvolver sequelas que a acompanhem pelo resto de suas vidas. As consequências que o abuso sexual pode desenvolver são diversas, podendo ser físicas e/ou psíquicas e de imediato ou a longo prazo. Diante disto entendemos a relevância do tema ser discutido e melhor compreendido por profissionais que podem ajudar a amenizar as decorrências, frutos do abuso sexual infantil, para que a criança viva sem os efeitos do trauma sofrido e sem a vitimização.

O USO DE PERSONAGENS DE GAME OF THRONES COMO FACILITADORES DE APRENDIZAGEM EM PSICOPATOLOGIA

SANTOS, Thiago Filipe Linhares*; ALVES, Cândida Helena Lopes;

Curso: Psicologia

Email: nzthiago@yahoo.com

A série de TV Game of Thrones se transformou em um fenômeno da cultura pop por seu rico enredo, marcado por uma densa construção psicológica dos seus personagens. A televisão costumeiramente é alvo de críticas por não explorar tanto os conteúdos informativos ou pela difusão de saberes científicos, embora se reconheça um enorme potencial para o fazer. A proposta deste artigo é ilustrar temas de psicopatologia através de comportamentos observáveis nos personagens da referida série, propondo o uso dos mesmos enquanto alternativas para que os conceitos sejam ensinados de uma maneira criativa. Usar uma abordagem mais lúdica, através da criação de hipóteses diagnósticas, pode ser um diferencial no treino da observação clínica do estudante de psicologia. Desta maneira, os personagens destacados podem auxiliar na aprendizagem de conceitos presentes no manual diagnóstico CID-10.

O USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA

RIBEIRO, Marina Salomão Ricarte*; CARVALHAL, Stéphanie Tavares; GONÇALVES, Letícia Machado; TAVAREZ, Rudys Rodolfo De Jesus

Email: marina.salomao25@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A toxina botulínica é produzida por uma bactéria anaeróbia denominada Clostridium botulinum e proporciona melhorias na qualidade de vida. Ela causa a denervação temporária de músculos esqueléticos por bloqueio da liberação mediada da Ca^{+2} de acetilcolina das terminações nervosas de neurônios motores alfa e gama, produzindo um enfraquecimento dose-dependente temporário da atividade muscular, provocando diminuição do potencial de contração muscular.

A utilização terapêutica da toxina botulínica foi primeiramente estudada por Scott e colaboradores em 1973, em primatas. No final da década de 1970 a toxina foi introduzida como um agente terapêutico para o tratamento do estrabismo. Desde então suas aplicações terapêuticas têm se ampliado em diferentes campos. Injeções de toxina botulínica são efetivas para diversas desordens clínicas que envolvam atividade muscular involuntária ou aumento do tônus muscular. Na odontologia, é indicada em disfunções temporomandibulares, distonia orofacial, hábitos parafuncionais (bruxismo e briqueamento), hipertrofia massetérica, sialorréia, assimetrias faciais de origem muscular, sorriso gengival e assimetrias labiais que podem causar exposição acentuada da gengiva. Recentemente, a aplicação profilática da toxina botulínica vem sendo indicada em casos após reabilitações sobre implantes dentários, reduzindo forças mastigatórias e protegendo as próteses e implantes de carga excessiva. Por possuir conhecimento sobre as estruturas de cabeça e pescoço, desde que tenha treinamento específico e conhecimento sobre sua utilização, o cirurgião-dentista, fazendo uso da toxina botulínica, pode modificar a qualidade de vida dos pacientes, além de aumentar a perspectiva de uma boa condição de saúde bucal

O USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA ODONTOLOGIA

FERREIRA, Barros Raissa Gabrielle*; OLIVEIRA, Portela João Marccus; MORAES, Mariana de Sousa; LIMA, Bruna Fraga; MACHADO, Claudio André Mendes; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: joamarccus14@gmail.com

Curso: Odontologia

A tomografia é um dos mais eficientes exames de imagem existentes atualmente. Sua excelência dá-se principalmente devido ao fato de gerar imagens claras e precisas, em fatias ou cortes, com pouca ou nenhuma sobreposição. As tomografias podem ser classificadas em: convencional e computadorizada; sendo esta última dividida ainda – de acordo com o formato do feixe de raios X – em: FanBeam(feixe em leque) e Cone Beam (feixe cônico). De maneira geral, pode-se afirmar que o sistema Cone Beam é o mais eficiente, apresentando maiores vantagens em relação aos outros métodos. Apesar de sua aparelhagem ser de alto custo, a dose de radiação chega a ser 15 vezes menor que a tradicional, realizando apenas uma volta do feixe de raios em torno do paciente, o tempo de exposição varia de 3 a 6 segundos. Contudo, apesar das vantagens da Cone Beam, a tomografia convencional ainda é muito utilizada e possui importantes aplicações, não apenas na Medicina. Na Odontologia, a tomografia convencional aplica-se em importantes áreas como Implantodontia, Cirurgia e no estudo da Disfunção Temporomandibular (DTM). Já a tomografia computadorizada (Fan e Cone Beam), tem suas principais aplicações em Odontologia

relacionadas às áreas de Implantodontia, Diagnóstico Bucal, Cirurgia e Ortodontia, sendo muito utilizadas para identificar e delinear processos patológicos, visualizar dentes retidos, avaliar os seios paranasais, diagnosticar traumas, mostrar os componentes ósseos da articulação temporomandibular (ATM) e os leitos para implantes dentários.

O VOLUNTARIADO NAS INSTITUIÇÕES DE ONCOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS, SUAS REPERCUSSÕES E PROBLEMÁTICAS

Dino, Alice Martins Costa Jorge*; Botelho, Helena Rubia de.

Email: alicejdino@hotmail.com

Curso: Psicologia

Esta pesquisa buscou apresentar a importância das ações voluntárias nas instituições de oncologia, suas repercussões e problemáticas. O trabalho voluntário representa uma forma de participação social, com a intenção de beneficiar outras pessoas, desenvolvendo ações nos campos educacional, recreativo, cultural, dentre outros. Teve como objetivo evidenciar a importância do trabalho voluntário, analisar as ações voluntárias, buscando a identificação das principais repercussões junto aos pacientes e familiares; pretendeu-se, também, identificar os motivos que inebriam uma pessoa a tornar-se um cuidador voluntário de pacientes oncológicos. Este estudo trata de uma pesquisa qualitativa e descritiva. Realizou-se uma revisão bibliográfica no período compreendido entre 2002 a 2016, através de busca em sites oficiais, utilizando-se também de livros de autores renomados. Os resultados da pesquisa mostraram que, com a contribuição das pessoas voluntárias e da Psiconcologia, no enfrentamento da doença, passa a ser possível oferecer um atendimento mais amplo e pautado no paciente como um sujeito integral, visando-se, assim, melhor qualidade de vida dentro do quadro específico de cada paciente com seus familiares. Concluiu-se que são necessários novos estudos, pois é um tema de relevância que merece maiores esclarecimentos.

OS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DO AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA MART)

SOUZA, Mycaele Aline Santana*; PINHEIRO, Déborah Belo Paz; COSTA, Gabrielle Damasceno Evangelista; SOUZA, Souza

Curso: Nutrição

Email: micele29@gmail.com

O açaí (Euterpe Oleracea Mart), oriundo da região Amazônica, é popularmente conhecido por seu alto valor calórico e nutritivo como também por possuir grande teor de lipídios, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. RESUMO: O objetivo do estudo foi descrever os benefícios do açaí e suas principais funções medicinais perante sua composição fitoquímica com

base em evidências científicas. O estudo compreendeu uma extensa revisão literária, utilizando como base de dados SCIELO, PUBMED, LILACS, GOOGLE ACADÊMICO entre os anos 2008 – 2015, os descritores utilizados foram: açaí, antioxidante, fitoquímicos, benefícios. Nos estudos destacaram-se propriedades antioxidantes, relacionada à prevenção de doenças, devido a sua composição possuir grande quantidade de fitoquímicos, em especial as antocianinas, muito benéficas no combate aos radicais livres, estes quando não eliminados desenvolvem o estresse oxidativo e o envelhecimento celular, que aumenta a probabilidade de desencadear doenças como câncer, doenças neurológicas e cardiovasculares. Devido a sua grande variedade de nutrientes, o açaí exerce outras funções a saúde humana como propriedade antimicrobiana e sua composição lipídica, está relacionada à redução do processo inflamatório, utilizado comumente para fins medicinais. Literaturas atuais revelam também o uso do açaí associado a efeitos antinociceptivo, podendo ser útil ao desenvolvimento de novas drogas analgésicas. CONCLUSÃO: São inúmeros os efeitos benéficos do consumo do açaí destacando-se a ação antioxidante. Há a necessidade, porém, de ampliar e reafirmar o entendimento científico acerca do efeito antinociceptivo do açaí em humanos, podendo ser desenvolvido em ações futuras um novo medicamento analgésico.

OS BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO EM IDOSOS COM OSTEOPOROSE
DE SOUSA, André Roberto Raiou*; DA SILVA, Renan Ferreira Soares; CHAVES, Reynaldo César Tavares; JÚNIOR, José Messias Ferreira Cutrim; SOARES, Máisa Carvalho Rezende; ALMEIDA, Ana Eugênia Ribeiro de Araújo Furtado

Email: rezende03@hotmail.com

Curso: Educação Física

Resumo : O envelhecimento é um fator biológico inerente ao ser humano. O Brasil vem passando por uma transformação demográfica, onde a população esta envelhecendo de forma abrupta e com o passar do tempo a sociedade aumenta cada vez mais sua expectativa de vida. Com isso o aumento da qualidade de vida na terceira idade torna-se substancial. Um dos fatores que diminuem essa perspectiva de vida é a ocorrência frequente de osteoporose em pessoas senis, ocasionando pelo próprio processo fisiológico do perpassar dos anos e acentuada pela ausência de atividades físicas. Desta forma a prática de exercício é de grande destaque na área do envelhecimento pois atuam contra a perda de massa óssea. Nesta revisão observou-se que o exercício físico resistido atua de forma eficaz no tratamento para a osteoporose, mantendo ou até mesmo aumentando a densidade mineral óssea do indivíduo senil praticante do treinamento de força. Pode-se observar também uma diversidade de protocolos usados com o objetivo de reduzir a perda de massa óssea, onde a maioria dos trabalhos apresentavam a

intensidade de 60 a 80% de 1RM com 10 a 12 repetições, sendo realizado com a maioria dos grupos musculares. Concluímos que o treinamento resistido em sua amplitude trazem benefícios a saúde nos seus mais diversos aspectos. Grande parte dos artigos relatam o treinamento resistido como mais indicado e eficaz no aumento ou manutenção da densidade mineral óssea do idoso.

OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA.

DOS SANTOS, Max David Lopes*; DA SILVA, Renan Ferreira Soares; CHAVES, Reynaldo César Tavares; JÚNIOR, José Messias Ferreira Cutrim; SOARES, Maísa Carvalho Rezende; ALMEIDA, Ana Eugênia Ribeiro de Araújo Furtado

Email: rezende03@hotmail.com

Curso: Educação Física

Resumo: A doença renal crônica (DRC) provoca mudanças em todo o organismo, os pacientes apresentam reduções no condicionamento cardiorrespiratório, muscular e na qualidade de vida. Em 15 anos o número de pacientes em diálise aumentou 300% essas pessoas são acometidas por DRC, assim percebe-se a importância de oferecer maior qualidade de vida aos pacientes em tratamento. Associado ao tratamento convencional, o exercício físico, tem sido muito utilizado nesta população. Programas de treinamento físico aeróbios e/ou resistidos de variadas intensidades são aplicados, as sessões de exercício podem ser no período Inter dialítico ou durante as sessões de hemodiálise. Os protocolos de exercício resistido utilizados variaram de intensidades, que vão de leves a moderada, duas a três vezes semanais com 30% a 50% de 1RM, dos estudos que avaliaram a força nestes indivíduos 80% obtiveram incremento da mesma. Entre as avaliações de capacidade funcional utilizadas, em 90% dos casos apresentaram melhora nesta variável após o período de treinamento com intensidade entre 50 a 65% do VO₂ (máx). Conclui-se que a prática de exercícios físicos tanto aeróbio como de força, quando elaborados adequadamente principalmente durante o período dialítico, são seguras e eficientes para pacientes portadores de DRC e podem promover diversos benefícios a estes indivíduos e ainda se especula que a prática de exercício durante hemodiálise pode levar a melhor adesão desses pacientes ao tratamento, no entanto, novos estudos direcionados a esta variável devem ser realizados.

OBESIDADE INFANTOJUVENIL: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

MARANHÃO, Shyrlucy Vieira*; MOREIRA, Andréa Maria Ribeiro; LIMA, Washington Kleber R.

Email: lucymaranhao22@gmail.com

Curso: Biomedicina

Introdução: A obesidade infanto-juvenil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma epidemia mundial e considerada um problema de saúde pública. Revisão: A obesidade é uma doença crônica de etiologia multifatorial, resultante do desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, pode ser determinada por fatores genéticos, fisiopatológicos, ambientais, comportamentais, sociais e culturais. A doença esta dividida em dois grupos: a) Primária, corresponde a cerca de 95% dos obesos decorrente da alimentação, dos hábitos sedentários de vida e da herança genética; b) Secundária, responsável por cerca 5% das causas, devido a alterações genéticas específicas, disfunções neurológicas, ou ingestão medicamentosa. O diagnóstico é clínico, baseado na história clínica e nutricional, no exame físico, e em dados antropométricos. Dados nacionais dos anos de 2008 e 2009 revelaram que uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava com sobrepeso ou obesidade. Entre os adolescentes, 21,7% do sexo masculino e 19,4% do sexo feminino apresentaram esse problema. O risco de uma criança obesa permanecer nesta condição na vida adulta é de 25%, aumentando para 80% quando o excesso de peso se instala durante a adolescência. Conclusão: Para mudarmos esse cenário, são necessárias alterações no estilo de vida. E essas mudanças podem ser iniciadas com a amamentação, que além de trazer benefícios à criança, pode prevenir contra a obesidade infantil. A atividade física também se torna benéfica para a saúde infantil. Além disso, a escolha de alimentos saudáveis e nutritivos é indispensável para o tratamento dessa patologia.

ÓXIDO NITROSO

SOARES, Ana Claudia Silva*; LEITE, Italo Jimmy Nunes; MEDEIROS, Bruna Kelly Santana; SOUSA, Flavia Karine Alves de; DUALIBE, Vanessa Paz; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: ana.clausoares@hotmail.com

Curso: Odontologia

Proporcionar ao paciente mas conforto durante os procedimentos odontológicos significa estar atento às novas técnicas, adotando em seu consultório um diferencial positivo no tratamento da saúde bucal e com isso diminuir o medo, o estresse e a ansiedade durante o procedimento. Uma das práticas utilizadas é a sedação consciente com óxido nitroso que se trata de uma técnica de sedação leve, segura e passível de titulação. Com uma depressão mínima ao nível de consciência, a sedação por meio de óxido nitroso permite que o paciente mantenha a respiração espontânea respondendo aos estímulos físicos e verbais e que se restabeleça imediatamente após a finalização da administração. Esta sedação é possível porque o óxido nitroso é um gás anestésico

de menor potência, de absorção e eliminação rápida, que controla a ansiedade e proporciona uma sensação de relaxamento e conforto ao paciente. Para os cirurgiões-dentistas, a técnica chegou para facilitar o tratamento odontológico nos pacientes mais ansiosos e com trauma de cuidados anteriores. Com isso, os próprios profissionais conseguem realizar seus procedimentos com calma, critério é cautela, não tendo o medo do paciente como pressão para antecipar o tempo da sessão.

OSTEONECROSE ASSOCIADA AO USO DE BIFOSFONATO

ALVES, Lilla Gabriella Silva Alves*; DO NASCIMENTO, Anna Luiza Pereira; DA COSTA, Lorena Soares; Cardoso, Nayara Costa; SANTOS, Bhenna Sihara dos Santos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Curso: Odontologia

Email:fernandofellyx@hotmail.com

A osteonecrose associada ao uso de bifosfonato, é uma manifestação clínica que apresenta-se como um osso sem vascularização, resultando em um osso necrótico em pacientes submetidos ao uso da droga. Essa patologia acarreta grande destruição tecidual dos ossos maxilares, transformando em um tecido ósseo frágil e quebradiço, o qual não possui a capacidade de reparar os danos resultantes da mastigação, como as micro fraturas fisiológicas as quais ocorrem diariamente nos maxilares. A utilização de bifosfonato em pacientes oncológicos ocorre em decorrência dos ótimos resultados clínicos, pois tal droga tem capacidade de controlar a reabsorção óssea de uma neoplasia maligna. Não se sabe qual a origem desta, porém quando associada ao uso de bifosfonato, acredita-se que sua incidência está relacionada ao tipo, via de administração e duração do tratamento. Os pacientes afetados podem apresentar edema, dor, sangramento, drenagem de pus persistentes, fistulas intra e extra-orais, halitose severa, parestesia do lábio inferior e mobilidade dentária, radiograficamente observa-se aumento da densidade trabecular, cicatrização deficiente de alvéolos de extração e alargamento do canal mandibular ou do assoalho do seio maxilar. Apresentando assim uma grande mudança na sua qualidade de vida, pois o bifosfonato possui a capacidade de alterar os mecanismos de reabsorção e remodelação óssea, podendo ocasionar grandes sequelas. Por isso é necessário o acompanhamento de um cirurgião dentista, antes, durante e após o tratamento, para que este possa prevenir diagnosticar e tratar de maneira que possa melhorar a qualidade de vida daqueles por ela afetados.

PANORAMA DE CÂNCER BUCAL NO BRASIL E MARANHÃO

E SILVA, Mariana Ataíde Mendes*; DE ARAUJO, Vanessa Kellen Castro; SOARES, Wanderson do Vale; MENDES, Sarah Soeiro; SOEIRO, Nathalia Chaves; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: mariana.ataide11@gmail.com

Panorama de Câncer Bucal no Mundo O termo câncer tradução latina da palavra grega carcinoma que significa: crustáceo, caranguejo; pois a deformidade e o intumescimento das veias da região causado pela doença era de tal ordem que lembrava, de forma figurada, a imagem de um caranguejo. A incidência do câncer na cavidade oral está aumentando no mundo e algumas evidências epidemiológicas, mostram que o tabaco, o álcool e a exposição ao sol são os principais fatores de risco para essa neoplasia. As estatísticas variam de país, as atuais incidências dessas patologias informam que a França, Hong Kong, Hungria e Índia são os países que apresentam os maiores números de pacientes portadores lesões malignas na cavidade oral e estruturas anexas, do que nos EUA, e muito mais raro no México e no Japão. Estima-se que anualmente ocorram 350.000 novos casos de câncer de bucal no mundo. Uma das formas propostas para diminuir esse número de casos seria com palestras e exames precoces.

Panorama de Câncer Bucal no Brasil e Maranhão O câncer bucal que inclui tanto os lábios como a cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca) de modo geral possuem incidência maior em pessoas com idade superior a 40 anos, tabagistas, consumidores de álcool, pessoas que fazem uso de próteses dentárias mal ajustadas e que possuem uma má higiene bucal, e os riscos aumentam quando o tabagista também é alcoólatra. O câncer labial é mais frequente em pessoas brancas e com maior ocorrência no lábio inferior, e nas outras regiões da cavidade bucal acomete mais tabagistas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2016 a estimativa de novos casos de câncer no Brasil é de 15.490, sendo 11.140 homens e 4.350 mulheres, esses resultados correspondem a 11,27 novos casos a cada 100 mil homens e 4,21 a cada 100 mil mulheres e no Maranhão as estimativas das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes é de 2,12 para os homens e de 1,77 para as mulheres e o número de casos novos é de 70 para os homens e de 60 para as mulheres. O câncer bucal nos homens a cada 100 mil habitantes por regiões do Brasil é de 14.58 no Sudeste, 6.86 no Nordeste, 9.15 no Centro-Oeste, 15.91 no Sul e 3.46 no Norte. Para as mulheres nos temos 4.11 no Nordeste, 5.29 no Sudeste, 1.76 no Norte, 2.79 no Centro-Oeste e 3,32 no Sul.

PARAPSICOLOGIA FORENSE: quando as experiências psi auxiliam na investigação policial

NETO, Aderson Abdon de Araújo*; ANDRADE, Francisco Pereira; SILVA, Richardson Gomes Lima.

Curso: Psicologia

Email: andrade.jair@bol.com.br

Anne Moberly, Eleanor Jourdain, Sally Headding, Alisson DuBois, e Carmen Diaz são nomes conhecidos no meio policial, especialmente na área de homicídios. Não porque tenham sido vítimas, suspeitos ou policiais, mas porque auxiliam nas investigações de forma pouco usual, através de faculdades que antigamente eram conhecidas por “paranormais” e eram estudadas pela Parapsicologia. A Parapsicologia era uma disciplina que buscava compreender os fenômenos que pareciam transcender as leis naturais, realizando investigações experimentais em ambientes controlados que pudessem comprovar ou refutar a verdade das vivências ditas “sobrenaturais”, hoje chamadas Experiências Relacionadas a Psi (ERP). Fazem parte das ERP: clarividência, telepatia, psicocinese, precognição e retrocognição, sendo esta última a habilidade que permitia às videntes citadas esclarecerem os homicídios através da “visualização” do que ocorreu em determinado ambiente apenas estando presente no local ou tocando em objetos que lá se encontravam. Atualmente, essas mesmas experiências (ERP) são estudadas pela Psicologia Anomalística, uma vertente da Psicologia que estuda as experiências anômalas, eventos que desafiam a compreensão da realidade humana com base no conhecimento científico vigente. Em sua relação com a Criminalística as ERP auxiliam a polícia através da localização de cadáveres e armas ou elucidando a dinâmica dos crimes. Nos EUA, é comum a polícia recorrer à ação de videntes quando a investigação não está progredindo, e muitos desses videntes têm um alto índice de acertos, mesmo chegando às cenas de crime sem conhecer detalhes da ocorrência, criando um ramo novo e ainda pouco explorado na ciência, que vem sendo chamado de Parapsicologia Forense.

PARESTESIA DO NERVO ALVEOLAR INFERIOR RELACIONADA A EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES

FARIAS, Gabrielle Maria Costa*; MUNIZ, Naylla Mouzinho; MACIEL, Francisco José

Email: gabycostaf@outlook.com

Curso: Odontologia

Resumo: A parestesia é uma sensação anormal e desagradável sobre determinada área decorrente da insensibilização da região inervada. Além do principal sintoma que é a ausência de sensibilidade na região afetada, o paciente poderá relatar também sensibilidade alterada ao frio, calor e dor, sensação de dormência, formigamento, “fisgada” e coceira. Esta condição ocorre quando se provoca a lesão dos nervos sensitivos, sendo estes os principais: o nervo alveolar inferior e nervo lingual. Os terceiros molares por apresentarem uma estreita relação com o nervo alveolar inferior colaboram para o aumento das chances de lesão durante a cirurgia. Logo, o conhecimento anatômico do nervo alveolar inferior, do canal mandibular, das raízes dos

terceiros molares, além de exames complementares para avaliação da proximidade anatômica entre eles, são fatores relevantes para prevenir a ocorrência da parestesia. Em geral, o retorno sensitivo ocorre normalmente dentro de 24 meses. Porém, caso depois desse período a parestesia ainda persista, os meios disponíveis para sua resolução são o medicamentoso, a terapia a laser e a cirurgia. Este trabalho tem por objetivo, portanto, avaliar a relação entre a exodontia de terceiros molares e a ocorrência da parestesia do nervo alveolar inferior abordando sua etiologia, sintomatologia, prevenção, formas de tratamentos mais utilizados e prognósticos.

PARTOS PREMATUROS E BAIXO PESO AO NASCER RELACIONADOS À DOENÇA PERIODONTAL.

VERAS, Marcela Viégas*; DOS SANTOS, Reginaldo Victor Pereira; VIÉGAS, Ingrid Silva ; NUNES, Livia Helena de Araújo Castro; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek

Curso: Odontologia

Email: marcela.vgs@hotmail.com

A doença periodontal, uma infecção crônica causada por bactérias gram-negativas, é definida como uma doença de caráter sujeito e sito-específica, onde surtos de exacerbação marcam sua evolução contínua, o que acaba resultando em uma resposta imunoinflamatória do hospedeiro à presença de bactérias e seus produtos. É citado na literatura já existente que as doenças periodontais possuem relações com outras alterações a nível sistêmico, como Diabetes Mellitus e partos prematuros. O parto prematuro é todo aquele que ocorre entre a 20ª e a 37ª semana de gestação, e crianças nascidas com menos de 2,5 kg são consideradas abaixo do padrão de peso, estando quase sempre as duas situações associadas. O caráter gram-negativo das bactérias causadoras da doença periodontal, fornece toda biologia necessária para afetar o desenvolvimento da gestação, agindo como um reservatório crônico onde ocorre a transferência de bactérias e seus produtos, como o LPS, para a unidade feto-placentária. Além do mais, substâncias como PGE2 e TNF α , produzidas pelo periodonto afetado, alcançam a placenta através da circulação sanguínea. Os níveis de PGE2 e de TNF α aumentam progressivamente durante a gestação até que seja atingido um nível crítico capaz de induzir o trabalho de parto. As citocinas podem também participar de tal processo, induzindo a ruptura de membranas fetais, através da liberação de proteases. Dessa forma, é possível associar a doença periodontal ao parto prematuro acompanhado de baixo peso, como um reflexo das características inflamatórias existentes no hospedeiro, criando, assim, um grupo de risco para ambas as condições

PERFIL DO ENFERMEIRO NA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO

BARROS, Andreia Rocha*; FERREIRA, Ana Maria Nunes; SILVA, Dheny Antonia Martins; SANTOS, Erika Layane Privado dos; RODRIGUES, Karla Regina Costa; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes.

Email: andreja_rbarros@hotmail.com

Curso: Enfermagem

Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil do Enfermeiro da Central de Material e Esterilização. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório por meio de revisão bibliográfica de literaturas atuais nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe e Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library (SciELO) e Cochrane, na base de dados do Public MEDLINE (PubMed). A Central de Material de Esterilização (CME) é uma unidade hospitalar que presta atendimento ao cliente através do processamento de materiais e artigos utilizados no cuidado em toda a sua diversidade. Como resultado evidenciou-se que na CME a maioria dos profissionais que trabalham é do sexo feminino, com idade média entre 27 anos e 54 anos. Foi identificado ainda a falta de vínculo entre profissional e setor de trabalho, o que talvez remeta falta de busca por especializações por parte deste profissional.

PERICORONARITE

REIS, Juliana de Albuquerque*; COSTA, Gabrielle; LEONEL, Matheus; ALMEIDA, Pedro; KICH, Rafaela Luiza; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: jujuba_reis@hotmail.com

Curso: Odontologia

A pericoronarite é uma inflamação que acomete geralmente tecidos moles ao redor de um 3º molar que ainda não foi totalmente erupcionado, em especial inferiores. O diagnóstico da doença é por meio de uma avaliação clínica onde o profissional poderá observar regiões com inflamação gengival. São diversas as causas da pericoronarite, tendo como principal a presença de restos alimentares abaixo do capuz gengival que recobre o dente em erupção, por ser um local de difícil escovação, além do estresse, infecções por vias aéreas superiores e afecções por traumas em dentes em contato com a mucosa afetada. Alguns sintomas podem estar presentes como dor intensa na área inflamada podendo ser irradiada para garganta e ouvido, gosto ruim na boca provocada pela secreção purulenta, dificuldade na oclusão. O diagnóstico é principalmente feito através de exame clínico pelo cirurgião-dentista, em que o mesmo observará se existe inflamação na região gengival do dente parcialmente erupcionado. O tratamento pode ser iniciado primeiramente com uma antisepsia do local infectado. Na presença de febre ou outros sintomas, utilizam-se antibióticos sistêmicos. Pode-se também, em casos mais graves, remover cirurgicamente o capuz gengival ou extração do dente. Conclui-se

que o objetivo desta revisão de literatura é explanar os principais meios de prevenção da pericoronarite, tendo em foco os principais sintomas e um tratamento adequado. Palavras-chave: inflamação plurulenta; terceiros molares; inflamação gengival

PNEUMONIA NASOCOMIAL

COELHO, Luciano André da Silva*; ARAUJO, Leanderson Cutrim; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: andre.2929@hotmail.com

A pneumonia nasocomial é definida como uma infecção do aparelho respiratório inferior, tratando-se de uma Infecção Respiratória Associada à Assistência de Saúde (IRAS). Desta forma tem pode ser definida em Pneumonia adquirida no hospital (PAH) ou Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). A pneumonia nasocomial é a segunda infecção hospitalar mais presenciada e a mais comum de mortes entre as infecções adquiridas no âmbito hospitalar. Isso pode variar de paciente, sendo que os que estão mais susceptíveis são os com idades acima de 70 anos, pacientes desnutridos, intubação ou reintubação orotraqual entre outros. A boca sofre colonização contínua, apresentando praticamente metade de toda a microbiota presente no corpo humano e, em adição a esse fato, a placa bacteriana serve de reservatório permanente de microrganismos, podendo determinar infecções à distância, para o desenvolvimento de uma (PAH).

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: CAUSAS, SINTOMAS E TRATAMENTO.

ASSUNÇÃO, Raissa Guará*; DO REGO, Mariana Cavaignac Sousa; Mayana Beatriz Saraiva GONÇALVES; ABREU, Afonso Gomes; NETO, Lidio Gonçalves Lima

Curso: Biomedicina

Email: raissa_guara@hotmail.com

Infecções hospitalares sempre foram bastante frequentes nos serviços de saúde no Brasil, destacando-se a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Neste trabalho fizemos uma breve revisão de literatura sobre a PAV, os principais problemas associados, suas causas, diagnóstico e tratamento. A PAV é uma infecção grave que normalmente acomete pacientes que estão na UTI devido à necessidade de utilização de intubação endotraqueal e pode ser definida como sendo uma pneumonia que surge entre 48 a 72 h após intubação orotraqueal e instituição de ventilação mecânica invasiva. A PAV é comum devido às más condições hospitalares, o tipo de UTI e a falta de cuidado na admissão do paciente. Atrelado a essas condições estão vários fatores de risco como: idade do paciente, traqueostomia, uso

indiscriminado de antibióticos, doenças pulmonares e cardiológicas. A pneumonia pode causar febre, tosse, respiração curta e rápida, além de secreção e dores no peito. Como forma de diagnóstico observa-se o aumento dos leucócitos, mudança de aspecto da secreção traqueal, RX de tórax, dentre outros. O diagnóstico microbiológico é ferramenta fundamental devido a sua maior especificidade, além de permitir o isolamento do agente etiológico e definir o seu grau de susceptibilidade aos antimicrobianos. Vários são os micro-organismos associados: *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pneumoniae*. Sendo assim, a antibioticoterapia deve ser utilizada de forma adequada no tratamento. Além disso, a identificação dos fatores de riscos e os patógenos associados podem auxiliar na realização de campanhas de prevenção com a finalidade de diminuição da incidência de PAV. Palavras-chave: Pneumonia; Ventilação Mecânica; bactérias; antibioticoterapia.

POTENCIAL TERAPÊUTICO DA JANAGUBA

VIANA, Ana Paula Pereira*; VIANA, Juliane Flávia Cançado;

Curso: Farmácia

Email: anadevianna@hotmail.com

Introdução: A planta medicinal *Himatanthus drasticus*, conhecida popularmente por janaguba vem sendo extensamente utilizada, na forma de leite (Mousinho et al, 2011) e extrato bruto das folhas (Sousa et al, 2010), para fins curativos e preventivos, por meio de práticas tradicionais (Albuquerque & Hanazaki, 2006). Além disso, há registros do uso fitoterápico da espécie no tratamento de gastrites e câncer de pulmão (Lorenzi & Matos, 2008). **Revisão:** Atividades antitumoral e anti-inflamatória da *Himatanthus drasticus* foram demonstradas em experimentos realizados *in vitro* e *in vivo* a partir do látex e do extrato bruto das folhas maceradas em solventes com diferentes polaridades para subsequentes análises histopatológicas, toxicológicas e imuno-histoquímica além das atividades antitumoral e anti-inflamatória. Lucetti e colaboradores (2010) demonstraram o efeito anti-inflamatório do lupeol, (constituente de uma promissora classe de metabólitos secundários), sobre a diminuição significativa de edema e infiltração de células anti-inflamatórias. Os autores propuseram o possível mecanismo de ação do acetato de lupeol associado ao sistema NO e ao sistema opióide, visto que número de células expressando iNOS, na presença do lupeol, diminuiu significativamente em edema induzido por carregenina; a liberação da mieloperoxidase (biomarcador da inflamação) também diminuiu a partir de neutrófilos humanos estimulados. Em outro estudo, os autores demonstraram o efeito antitumoral sobre o Sarcoma 180 e Carcinossarcoma 256 de proteínas presentes no látex da janaguba (hdlp) associado à atividade

imunoestimulante (Mousinho et al 2010). Conclusão: Logo, os artigos pesquisados reafirmam o potencial terapêutico da *Himatanhus drasticus*, apesar de que novos testes devem ser conduzidos.

PRODUÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS

SOUSA, Kamylla Maria Cavalcante de*; MUNIZ, Jamilly Nunes; SOUSA, Rayres Kalwana Xavier; VIANA, Juliane Flávia Cançado; SALOMÃO, Rondineli Seba.

Email: kamycavalcante2008@hotmail.com

Curso: Farmácia

Os Peptídeos Antimicrobianos (PAMs) são moléculas que fazem parte do sistema imunológico inato, onde se encontram em baixas concentrações. Essas moléculas apresentam uma grande interação com a membrana plasmática, alcançando uma ação antimicrobiana contra fungos, parasitas, vírus e bactérias. Revisão: Devido ao aumento da resistência apresentada pelos microrganismos aos antibióticos já existentes, a busca por novas moléculas com atividade antimicrobiana faz-se necessária. Com a descoberta da ação antimicrobiana dos peptídeos, o estudo pelo desenvolvimento de novos antibióticos a partir de agentes antimicrobianos cresceu. No entanto, os PAMs encontram-se em baixas quantidades no organismo e para a sua aplicação no ramo farmacêutico é necessário uma grande quantidade de moléculas. Desse modo, é indispensável que essas moléculas sejam produzidas em quantidades maiores. Técnicas como o isolamento direto do organismo, a síntese química e sistemas de expressão heteróloga são utilizadas para a produção dessas moléculas. No entanto, o isolamento direto é um mecanismo que exige muito tempo e a síntese química é uma técnica que requer uma grande quantidade de investimento com baixo custo-benefício. Existem vários sistemas de expressão heteróloga para produzir peptídeos como bactérias, leveduras e plantas. Conclusão: Na busca por inovações, vários estudos demonstram o potencial da expressão heteróloga na produção PAMs como uma ferramenta no desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos.

PROTOTIPAGEM E SEUS BENEFÍCIOS PARA A ODONTOLOGIA.

NUNES, Richardson Wesley Silva*; LIMA, Antonio Augusto Fonseca Borba; ARAUJO, Gabriella Ferreira de; SANTOS, Camila Araújo dos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: bubuto25@hotmail.com

Curso: Odontologia

Na área odontológica, a utilização da prototipagem é nova. Sua utilização fornece dados obtidos por exames que geram imagens tridimensionais, como a tomografia computadorizada e a

ressonância magnética. São quatro os processos mais utilizados na área odontológica, a implantodontia e a cirurgia buco maxilofacial. Isso possibilita construirmos biomodelos para servirem como auxiliares em planejamentos cirúrgicos e até mesmo nos próprios procedimentos. Na odontologia é útil na cirurgia bucomaxilo facial na implantodontia sendo pouco utilizado no planejamento ortodôntico, para possuir uma análise do posicionamento real dos dentes. Com o passar do tempo a tecnologia chegou aos consultórios odontológicos, se tornando uma das principais aliadas dos cirurgiões dentistas na hora de planejar cirurgias e tratamentos. O uso de imagens geradas por tomografia computadorizada ganha o espaço de radiografias e fornece material capaz de gerar modelos tridimensionais, em tamanho real dos dentes, ossos e estruturas associadas. O processo de prototipagem com implantes na odontologia é uma das tecnologias mais modernas para auxílio no planejamento da colocação de implantes. Esta técnica permite a confecção de modelos físicos a partir de dados coletados por tomografia computadorizada. Para situações extremas, como por exemplo reabsorções extensas de mandíbula e maxila e necessidade de enxertia óssea prévia ou concomitante à colocação de implantes. Alguns softwares permitem a manipulação de imagens captadas pelo tomógrafo, executando a constituição das mesmas em três dimensões na tela do computador. Na odontologia o modelo em tamanho real da estrutura óssea da face simplifica e torna mais fácil para o cirurgião perceber sua real complexidade.

POLITICAS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRANCA, A ESCOLA COMO UMA FOMENTADORA DO RACISMO

NUNES, Josiele Dias*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; SANTOS, Querlinilda Ferreira; LACERDA, Sarah Sales; CANTO, Julia de Araújo Silva; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: josielle@hotmail.com

O preconceito é sistematicamente considerado como um atributo do outro. Quando certa parcela da população brasileira reconhece a existência do racismo, essa mesma não se inclui no percentual que pratica o preconceito, silenciando-o. Trata-se de uma estratégia simbólica de fuga de uma realidade em que o preconceito impera. Estudos afirmam que as pessoas buscam elementos de identificação em grupos dominante para serem aceitos. Objetivou-se identificar os aspectos históricos favorecedores da construção do preconceito e suas consequências para o desenvolvimento do indivíduo vítima do preconceito racial. Estudo de revisão bibliográfica, baseou-se no levantamento de 15 artigos publicados a partir de 2002. O processo civilizatório ocidental constituiu-se um padrão desejável e correto, excluindo os diferentes. Observou-se na literatura a crítica que norteia a escola, como uma fomentadora do

preconceito, visto que é, na escola, que a criança negra se depara com o estereótipo do negro, e a valorização da cultura branca. Estudos demonstram que pode ocorrer uma inibição na capacidade dessas crianças de advogar seus interesses culturais, políticos e sociais. Considera-se de suma importância uma discussão mais ampla acerca do racismo e da valorização do padrão da raça branca contexto escolar, este que é criado para educação e formação de sujeitos políticos.

POTENCIAL TERAPÊUTICO DAS ESPÉCIES DO HORTO ACADÊMICO DO CEUMA CONSTANTES NA RENISUS

BRITO, Poliana Oliveira Lemos de; VIANA, Juliane Flávia Cançado; MENDES, Saulo José Figueiredo

Curso: Farmácia

Email: poliana-brito@outlook.com

Resumo: Introdução: O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, e que retém conhecimento associado ao uso e cultivo de plantas medicinais, melhorando assim a saúde da população brasileira, pois as plantas são também utilizadas em práticas populares como os remédios caseiros. Revisão: Diante do exposto, o Ministério da Saúde instituiu a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS) para orientar estudos e pesquisas que subsidiem a relação de fitoterápicos disponíveis para uso da população com segurança e eficácia pra tratamento de doenças. A ampliação das opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de Saúde, com garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde, consiste em uma importante estratégia com vistas à melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social. Assim, o Horto da Universidade CEUMA disponibiliza em sua estrutura uma seleção de plantas listadas no RENISUS como a babosa, arruda, arnica, quebra-pedra, entre outras. Conclusão: o Horto da Universidade CEUMA busca, assim, reconhecer as práticas populares e divulgar a fitoterapia além estimular pesquisa farmacológica promovendo a formação técnico-científica e a capacitação no setor de plantas medicinais e fitoterápicos além de incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicas.

POTENCIAS EVOCADOS AUDITIVOS EM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO- ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

CALDAS, Patricia Andréia*; CALDAS, Erica Alessandra; BARROS, Thyanne de Sousa.

Curso: Fonoaudiologia

Email: thayannebarros21@gmail.com

Há várias causas para a perda auditiva infantil, algumas são pesquisadas com frequência, mas a desnutrição é pouco estudada como causa de perda auditiva. Estudos mostram que o déficit de alguns nutrientes pode afetar a audição, a Vitamina D, pode provocar perda auditiva coclear, a Vitamina A, apresenta-se em alta concentração na orelha interna de indivíduos com alterações auditivas. O PEATE pode identificar lesões retrococleares e estudar a maturação da via auditiva, avalia a atividade neuroelétrica na via auditiva desde o nervo auditivo até o córtex. Considerando que a desnutrição provoca efeitos nocivos ao SNC, e pode também afetar a audição; e que o PEA pode avaliar o mínimo de respostas auditiva e via auditiva desde o nervo auditivo até o córtex, este estudo teve o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica sobre a realização do PEA em crianças desnutridas. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas revistas indexadas na base de dados da Bireme, sendo pesquisados periódicos na área das ciências da saúde, nos últimos 13 anos. Observou-se escassez de artigos, sendo 4 artigos, dos quais foi realizado resumo dos principais achados, todos relataram alterações no resultado do exame, que variavam de acordo com o grau de desnutrição apresentado pela criança, assim como pela duração, tipo e severidade. Observou-se que a latência do PEATE está significativamente aumentada em crianças desnutridas comparadas a crianças eutróficas, e redução na velocidade de condução do estímulo através do nervo. A desnutrição afeta o processo de desenvolvimento periférico da via auditiva e do tronco encefálico.

PREVALÊNCIA DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES NO SEXO FEMININO

NOGUEIRA, Amanda Palmeira Arruda*; JUNIOR, Sérgio Alves Guida Freitas; SILVA, Caroline Araujo; MOREIRA, Blenda Montelo; ARAUJO, Ana Paula Ferreira Jansen; FERNANDES, Juliana de Kássia Braga.

Curso: Odontologia

Email: amandaarrudanogueira@gmail.com

A disfunção temporomandibular (DTM) corresponde a um conjunto de condições que acomete a região da articulação temporomandibular (ATM). Caracteriza-se pela existência da dor, sensibilidade muscular, estalido da articulação temporomandibular (ATM) e limitação dos movimentos mandibulares. Embora a etiologia da DTM não esteja totalmente elucidada, estudos apontam para um caráter multifatorial com predileção pelo sexo feminino. No entanto, a rede causal de associação da DTM com o sexo feminino não está clara na literatura. Desta forma, o objetivo deste estudo é apontar possíveis fatores que sustentem esta associação. Foram selecionados artigos das bases de dados SciElo, BIREME, PubMed e Google Acadêmico, além de centros de revisão sistemático. Ao todo, foram utilizados 10 estudos nacionais e

internacionais, publicados no período de 2007 a 2016, tendo como palavras-chave “Transtornos da Articulação Temporomandibular” e “Feminino”, de acordo com os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS). Os resultados deste estudo mostram que as mulheres apresentaram a maior porcentagem dos casos, chegando a 70%; enquanto que o sexo masculino apresentou em torno de 21% de prevalência. O sexo feminino parece ser associado a maiores graus de severidade da disfunção. Os estudos encontraram como maior causa a carga de estresse, fatores hormonais e fatores fisiológicos. A prevalência de DTM no sexo feminino foi superior ao sexo masculino, apresentando também maior severidade. Com relação a causalidade, a soma dos fatores anatômicos e psicossomáticos poderia explicar a maior prevalência de DTM em mulheres.

PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA: HÁ RESULTADOS FAVORÁVEIS?

AZEVEDO, Camila Rodrigues*; ALMEIDA, Ana Karla de Araújo; BELFORT, Iara Araújo; DOS SANTOS, Mariana Sales; DOS SANTOS, Alessandro Ferreira

Email: marianasalesdossantos96@gmail.com

Curso: Nutrição

Resumo: O alimento funcional possui elementos com papel fisiológico e bioquímico, trazendo benefícios para o ser humano na prevenção de doenças. Dentre estes, os probióticos são microrganismos que beneficiam o seu hospedeiro, e na esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) tem grande importância. A EHNA é uma comorbidade hepática, caracterizada pela deposição hepática de gordura, sendo manifestada em casos de obesidade e síndrome metabólica, o que pode contribuir para aumento do risco cardiovascular. Com a redução desses fatores, adotando uma dieta equilibrada, atividade física regular e mudanças no estilo de vida, poderá ocorrer a prevenção de progressão da EHNA para doenças hepáticas mais graves. Os probióticos ajudam no controle da flora intestinal, coíbem patógenos, melhoram a digestão e diminuem o risco de tumores. Os lactobacilos dispõem de ações anti-inflamatórias e antitumorais, já as bifidobactérias potencializam funções imunes. Estes microrganismos são encontrados em leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados. Na EHNA, os probióticos atuam na melhoria das enzimas hepáticas, que costumam apresentar-se em níveis elevados nos doentes, representando dano ao fígado, além de colaborarem na prevenção de outras patologias e inibirem a absorção de endotoxinas. Uma dieta rica em probióticos tem sido aplicada para o tratamento da EHNA como parte da mudança no estilo de vida dos pacientes e traz benefícios que vão além da melhora da EHNA.

PSICOLOGIA ANOMALÍSTICA E TRANSE: ESTUDOS INICIAIS

ARAÚJO, Carla Matos*; MARINHO, Aline Mendonça; LOPES, Emanuely Soares; RODRIGUES, Sandro Eduardo; FERNANDES, Daniele Santos.

Curso: Psicologia

Email: cacau.fortes@hotmail.com

O presente trabalho, desenvolvido pelo recém-criado GEPPA - Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia Anomalística da Universidade CEUMA, tem como objetivo realizar uma revisão inicial da literatura sobre a experiência do transe a partir do olhar da Psicologia Anomalística, para a qual anomalia não significa necessariamente disfunção ou patologia. A Psicologia Anomalística caracteriza-se por ser uma área de estudo sobre as chamadas Experiências Anômalas, descritas pela American Psychological Association (APA) como experiências que, embora não necessariamente incomuns, não são suficientemente explicadas dentro do paradigma científico hegemônico, como, por exemplo, experiências sinestésicas, de sonhos lúcidos, místicas, religiosas, crenças, efeitos placebo e estados alterados da consciência. A palavra transe vem do latim *transitus*, que significa ir além, trespassar, ultrapassar, podendo ser entendida como qualquer alteração do estado da consciência. Embora a psicopatologia apresente uma definição do transe como estreitamento do campo da consciência, o que traz a marca do negativo, fontes diversas abordam a ocorrência de transe tanto na experiência de mediunidade, quanto decorrentes de sugestão hipnótica ou da ingestão de substâncias psicoativas, sem que a experiência do transe seja vivida e compreendida como algo negativo, patológico. O presente trabalho pretende apontar a necessidade, para a Psicologia, de se proceder a um levantamento das investigações acerca do transe realizadas sob a perspectiva da Psicologia Anomalística.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS, RUMOS E PERCURSOS: UM RECORTE SOBRE AÇÕES DO PSICÓLOGO JURÍDICO NO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

SANTOS, Elaine Cavalcante*; DOS SANTOS, Elma Dayana Moura; PES, Elis Regina; RIBEIRO, Cássia Franco Pereira; DE REZENDE, Daysée Daniele Medeiros; BENTIVI AQUINO, Daiane Rose Cunha

Curso: Psicologia

Email: elain.eh@hotmail.com

O presente trabalho apresenta um conjunto de reflexões em relação aos caminhos percorridos pela Psicologia e os Direitos Humanos, incluindo as questões de ética e cidadania, à luz da perspectiva sócio histórica que sugere a compreensão do ser humano inserido em uma cultura determinada, salientando a importância da Psicologia Social e as práticas jurídicas e sociais, efetivadas pelo psicólogo. O estudo foi realizado através de pesquisa exploratória com análise qualitativa, e o procedimento técnico utilizado consistiu em pesquisa bibliográfica. Os Direitos

Humanos compreendem um avanço da humanidade nas construções da convivência, através do reconhecimento do “outro” independente de classe social, raça ou faixa etária. No decorrer da revisão são apresentadas algumas concepções acerca da afinidade entre a psicologia e direitos humanos e contribuições do Psicólogo jurídico dentro do núcleo dos direitos humanos. Através da revisão de literatura observou-se que a Psicologia é uma ciência que busca ser acolhedora e não individualizante, e este ponto de trabalho teórico-prático é o que mais se aproxima dos Direitos Humanos. Visando a preservação da dignidade humana, uma sociedade mais justa para todos, a autonomia e o empoderamento do indivíduo, além da não violação de direitos do homem.

PROCURANDO DORY, SOB A LUZ DA PSICOLOGIA POSITIVA

SAUAIA, Adalgisa Lopes Pereira*; SACRAMENTO, Jozonete de Jesus; GOMES, Leonardo Sousa; LIMA, Ana Beatriz Rocha

Email: adalgisalpsauaia@bol.com.br

Curso: Psicologia

Resumo: Objetivando discorrer a análise do filme “Procurando Dory” considerando a felicidade diante das adversidades presentes na psicologia positiva. As virtudes compreendem forças de caráter: coragem (autenticidade, bravura, persistência e entusiasmo); humanidade (bondade, amor e inteligência pessoal) presentes nas atitudes de Dory. A psicologia positiva é um movimento que possibilita uma visão ampla dos potenciais, das motivações, enfatizando mais a busca pela felicidade que o estudo das doenças mentais, enfoque dessa análise. Utilizando-se observação direta e sua relação com a psicologia positiva, diversos pontos foram identificados: determinação, coragem, cumplicidade, esperança e otimismo, bondade e generosidade, confiança, perseverança e amor. Procurando Dory é filme que promove diversão, resgatando a emoção que aflora em boa parte deste, retratando de forma divertida as virtudes e forças da psicologia positiva. Dory, ainda bebê, com problemas de perda de memória recente é estimulada por seus pais a reter o maior número de informações até que se perde, passando a procurá-los mesmo com episódios de esquecimentos. Dory ajuda Marlin e Nemo e é ajudada, juntos cruzam o oceano e quando fala “minha família” emana uma força maior, a coragem aumenta assim como a determinação e o amor, passa por situações embaraçosas na companhia de Hank, polvo sábio e destemido reforçando a esperança e o otimismo no personagem, que persiste no encontro familiar, quando este ocorre é carregado de emoções. Pode-se concluir que mesmo diante de um transtorno há possibilidade de viver feliz e alcançar os objetivos, sendo para isso necessário o apoio e a motivação familiar.

PROTOTIPAGEM EM ODONTOLOGIA: USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO

OLIVEIRA, Italo Afonso Siqueira, CALIXTO, Ana Ligia de Queiroz Calixto; MACIEL, Andrezza

Email: italoafonsosiq@live.com

Curso: Odontologia

Resumo: O uso de protótipos na odontologia tem sido uma ferramenta contribuinte para o desenvolvimento tecnológico da ação do cirurgião dentista, facilitando a atuação do profissional em casos como cirurgias bucomaxilofaciais e implantodontia, pois, por representarem de forma tátil as estruturas anatômicas humanas a serem estudadas, permitem um melhor planejamento das cirurgias e estudos em odontologia, fazendo que os procedimentos sejam mais precisos e com riscos reduzidos, além de que o paciente gere confiança durante o pré-operatório. O desenvolvimento tecnológico da odontologia fez com que os protótipos, antes usados somente pra uso didático, pudessem ser incorporados de fato no meio odontológico. Nesse contexto, a prototipagem na área da saúde surge atrelada ao desenvolvimento da engenharia, desenho industrial e arquitetura e tem como principal finalidade o planejamento pré-cirúrgico, otimizando o sucesso da assistência ao paciente. Aliada e baseada em exames de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e programas de computador como o CAD-CAM, é possível obter dados e reproduzir estruturas tridimensionalmente. Desde seus primórdios em 1991 com a Prototipagem Rápida, que no ambiente odontológico, converte dados tridimensionais virtuais em biomodelos tridimensionais reais e posteriormente a utilização de processos mais sofisticados como a Estereolitografia, Sinterização a Laser Seletivo, Modelagem por Fusão e Deposição, Impressão Tridimensional, cada um com suas características, vantagens e desvantagens. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura embasada em um maior esclarecimento do que é a prototipagem no contexto odontológico e suas facilidades para com o prognóstico de casos mais complexos e sua adequação às especialidades odontológicas.

PSICOLOGIA, FAMÍLIA E ABANDONO DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES

LEITE, Zinole Helena Martins*; MARTINS, Vania Marcia Lima; SILVA, Yanlessa de Jesus David; SMPAIO, Karen Silva; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira; OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo; MENDES, Vanessa Helena Leite.

Curso: Psicologia

Email: profzinoleite@gmail.com

O envelhecimento é um fenômeno inerente à vida do ser humano, onde ocorrem perdas fisiológicas, psicológicas e sociais. Os cuidados durante o envelhecimento são necessários,

principalmente por parte dos familiares; porém muitas famílias não conseguem exercer de forma satisfatória esta função, optando pela institucionalização do idoso e posterior abandono : Esta pesquisa bibliográfica, descritiva, realizou-se mediante a leitura e análise de dissertações, teses, livros e quinze artigos em língua portuguesa, disponíveis nas bases de dados virtuais, utilizando-se como palavras chaves: “idoso e família”, “instituição asilar, abandono e família”, “idoso, família, abandono, Psicologia”. Foram inclusos para análise artigos completos contemplando os diferentes aspectos do processo de envelhecimento e artigos sobre institucionalização de idosos. REVISÃO: Falta de tempo para os cuidados com os idosos, conflitos entre gerações , trabalho e condição socioeconômica estão na base das atitudes de abandono aos idosos em instituição de longa permanência pelos seus familiares . CONCLUSÃO: Observa-se a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o processo de envelhecimento, bem como uma intervenção psicológica no contexto da instituição de longa permanência visando melhorias na qualidade de vida dos idosos, estimulando-os do ponto de vista cognitivo e favorecendo a elaboração dos aspectos psicossociais relativos ao abandono familiar . Dirimir atitudes familiares negativas em relação ao idoso, constitui-se elemento chave de intervenção do psicólogo, evitando o processo de institucionalização e abandono do idoso.

PSICOLOGIA DA SAÚDE, INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO ÂMBITO HOSPITALAR INFANTIL

LACERDA, Sarah Sales*; SILVA, Jozielma Bastos; CHAVES, Jessica Bastos; CANTO, Julia Araujo Silva; SILVA, Paula Rayssa Nogueira; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Curso: Psicologia

Email: sarah_lacerda96@hotmail.com

Atualmente vem sendo aplicado a interdisciplinaridade no contexto hospitalar em substituição ao modelo tradicional fragmentado promovendo trocas entre os especialistas. A intervenção psicológica no âmbito hospitalar é uma área rica de possibilidades, compreende-se que a transdisciplinariedade seria um caminho que fortalece os diálogos entre diferentes domínios do saber buscando envolver a família e a comunidade na busca de melhores estratégias para uma vida mais saudável. Estudo busca identificar as demandas psicológicas existentes no contexto hospitalar no atendimento infantil. Configura-se esta pesquisa bibliográfica e descritiva. Partiu-se da análise de 15 artigos disponíveis nas bases de dados: Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Observou - se na literatura que os profissionais trabalham para manter o equilíbrio que em alguns casos é perdido durante o período de internação quando a criança é tirada do convívio da família, privada de brincadeiras e da vida escolar e passa a ser obrigada a se envolver em tratamentos e relacionamentos com pessoas estranhas. A criança hospitalizada sofre uma série de transformações psicológicas, passando por um processo de despersonalização. Constatou-se

que diante dessa demanda o psicólogo atua para desenvolver meios para que a criança possa sentir-se mais segura no ambiente hospitalar. Pesquisas recente tem mostrado o grande êxito do uso da brinquedoteca no contexto hospitalar como técnica de intervenção e avaliação psicológica, promovendo uma maior interação entre a criança hospitalizada e a equipe multidisciplinar.

PSICOLOGIA ESCOLAR EM ONGS NO MARANHÃO: ANÁLISE DE UM CENÁRIO EM POTENCIAL PARA ATUAÇÃO

ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima; MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de; RIBEIRO, Wallyson Martins; SILVA, Eldi Pereira; LOBO, Eliene Aquino; GALVÃO, Pollianna; BECKMAN, Márcia

Curso: psicologia

Email: liviaguedesandrade@gmail.com

Resumo : Para se compreender os espaços emergentes de atuação em Psicologia Escolar, é de extrema importância conhecer o contexto histórico e social em que se desenvolve. As ONGs no Maranhão surgiram na década de 1960, muitas delas fundadas por missionários religiosos para o desenvolvimento de projetos em benefício social. Essas instituições atravessaram uma trajetória complexa e contraditória, provocando múltiplas compreensões sobre os ideários que orientam a sua atuação. Na contemporaneidade, essas instituições têm como seu papel mais amplo, ações e posturas mais ativas na elaboração de projetos de intervenção social e na participação nas definições de políticas públicas junto às esferas governamentais. Considera-se que a atuação do psicólogo escolar deve de comprometer com esses contextos, pois alinha-se a princípios fundamentais de sua profissão corroboram para a otimização da qualidade da educação não formal oferecida. Este trabalho objetiva apresentar o cenário das ONGs no Maranhão e conhecer as características institucionais e pedagógicas de uma instituição de educação não formal que podem ser indicadores para atuação do psicólogo escolar. As atividades de assessoria à gestão institucional, acompanhamento ao trabalho de educação social, o aporte psicológico aos educadores ante a situações de trabalho, formação assistida em serviço dos educadores sociais, comparecem nos resultados como os principais indicadores de intervenção da Psicologia Escolar. Espera-se que o estudo possa ampliar e aprofundar a discussão crítica sobre as ONGs educativas no contexto do Maranhão e que se despontam como um campo fértil para atuação de psicólogos escolares.

PUERICULTURA: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA

ARAÚJO, Eliane Sousa*; ABREU, Elinis da Costa; FERREIRA, Fabianne Ribeiro; MARTINS, Débora Bastos; CORDEIRO, Sandra Komarsson Carvalho; NORONHA, Francisca Maria Ferreira.

Email: eliane.araujo88@hotmail.com

A assistência à saúde da criança é uma atividade de fundamental importância em função da vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida e exige-se que o enfermeiro tenha muita atenção na realização da consulta. O enfermeiro é fundamental na realização da puericultura, pois esta envolve uma sequência de etapas que direcionam as ações de modo que haja um atendimento eficaz às necessidades da saúde da criança e aos anseios da família. Objetivou-se no presente estudo, avaliar o papel da enfermagem na consulta de puericultura, a partir de levantamento bibliográfico de artigos disponíveis na base de dados SCIELO compreendendo o período de 2010 a 2015. Utilizou-se como descritores: puericultura, criança e crescimento. Foram selecionados 5 artigos que apontavam que por meio do acompanhamento da criança saudável possível reduzir a incidência de doenças, aumentando suas chances de crescer e desenvolver-se para alcançar todo seu potencial. Não se trata apenas de aferir as medidas antropométricas, mas sim avaliar a criança na sua integralidade, observando crescimento e seu DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), com ênfase nas orientações de cuidado, com objetivo de prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma global e individualizada, identificando problemas de saúde-doença, avaliando e executando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde da criança. Deste modo, a consulta de puericultura apresenta-se como um recurso para a atenção humanizada à criança, à mulher e à família e a consulta de enfermagem é competência exclusiva do enfermeiro.

REFLEXÃO CRÍTICA ACERCA DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO PARENTAL

PEREIRA, Andreia Reis*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; DE SOUSA, Juliana Avelar; FRANÇA, Regina Célia Cantanhede; COSTA, Bianca Steves Barros; AQUINO, Daianne Rose Cunha Bentivi; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado

Email: josylma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: A alienação parental é um problema bastante complexo com consequências devastadoras para as vítimas e seus familiares. O tema em questão passa a ser estudado em 1985 pelo médico e Professor de psiquiatria infantil da Universidade de Colúmbia, o pesquisador Richard Gardner. Seus estudos objetivavam descrever a situação em que casais em processo de separação em situações de desavenças temporárias, disputando a guarda da criança. Durante esse processo um dos genitores tenta manipular e a condicionar o filho para romper os laços

afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de ansiedade e temor em relação ao ex-companheiro. O estudo busca promover uma reflexão acerca tema a alienação parental e as suas consequências para os envolvidos neste processo. A pesquisa se caracteriza em um estudo de natureza bibliográfica, qualiquanti de cunho exploratório. Este estudo consistiu primeiramente de um levantamento bibliográfico de dados foram às bases BVS- PSI, CAPES e no buscador Google acadêmico Nesta pesquisa foi utilizado como instrumento de construção de enquete o Doodle, um recurso disponível online, onde foi construído um questionário com dez questões fechadas, sendo sete questões sobre o tema e três para saber se o público era profissionais, graduandos ou estudantes. Constatou-se neste estudo que alienação parental tem seus efeitos diversos trazendo danos de ordens psiquiátricas, psicológicas e social. A literatura apontou que esse tipo de atitude tem sido cada vez mais comum. Percebe-se a necessidade de uma intervenção mais precoce e efetiva em parceria com profissionais de diversas áreas para que este problema seja contemplado de acordo com suas múltiplas facetas. Palavras-chave: Alienação parental, Família, Mediação de conflitos, Psicologia jurídica

REGULAÇÃO EMOCIONAL E INFLUÊNCIA DE COGNIÇÕES DISTOCIDAS NO DESENVOLVIMENTO DE PSICOPATOLOGIAS

RIBEIRO, Halysson Cezar Rezende* ; RANDÃO JUNIOR, Edimilson da Silva; OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes de; DINIZ, Juliana Pinheiro; DUTRA, Grazielle Caldas; ALVES, Cândida Helena Lopes;

Email: halyssonribeiro.hr@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: As emoções integram-se aos processos cognitivos e homeostáticos e a sua identificação tem uma grande importância para a compreensão das respostas fisiológicas do corpo, envolvidas diretamente com a subjetividade. Algumas psicopatologias surgem a partir da persistência de emoções negativas, manutenção, desenvolvimento e incapacidade de regulá-las. O humor e comportamentos negativos são usualmente resultados de pensamentos e crenças distorcidas que provocam reações emocionais disfuncionais. Envolve a visão de si, do ambiente, dos outros e do futuro. Este estudo teve por objetivo explicar o envolvimento dos aspectos cognitivos e a sua relação com os produtos do comportamento e emoções, pela visão da neurociência e da terapia cognitivo-comportamental. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da consulta das bases de dados: SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde, no período de 2015 a 2016. Foi possível observar que a inabilidade de regulação das emoções pode levar a grandes impactos, exercendo influência direta no meio social, comportamental e cognitivo. Concluiu-se também que mudanças cognitivas e comportamentais podem alterar

circuitos cerebrais, trazendo a possibilidade de modificações de associações neurais, que se relacionam com transtornos psiquiátricos com consequência direta nas emoções. As emoções podem ser compreendidas levando-se em consideração a forma como cada indivíduo atribui significado a uma situação. As experiências quando encaradas de maneira negativa, antecipam resultados desfavoráveis para os seus problemas, resultando em erros de interpretação quando diz respeito ao desempenho pessoal e julgamento das situações externas, estruturando as suas experiências de forma absolutista e inflexível

REFLEXÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL

SILVA, Jozielma Bastos; SANTOS, Alison Reis; ARAÚJO, Ana Paula Maranhão; LUZ, Jéssica Barbosa; GALVÃO, Pollianna.

Curso: Psicologia

Email: josielle@hotmail.com

Em qualquer sociedade, o sistema educacional é essencial para criação de um forte processo de inclusão social e de promoção da igualdade. No Brasil questões geradas por séculos de escravidão e a falta de interesse dos gestores públicos vem refletindo e fortalecendo esse quadro de diferença. O papel da escola e a formação de qualidade do professor são temas relevantes no processo de transformação na educação e conscientização do sujeito, no que diz respeito a ações de igualdade entre brancos e negros. Esse trabalho trata-se de uma revisão da literatura a partir de busca de descritores “Educação, População Negra, Ensino de Qualidade” na base de dados do site da CAPES, Google acadêmico e Scielo. Resultados: Atualmente por meio de ações afirmativas e Políticas de Cotas, tem-se buscado resgatar um espaço de igualdade dentro da sociedade, sob o principal argumento de que é importante gerar políticas sociais que minimize o impacto das injustiças herdadas pelos países pós-colonizados. Os estudos apontaram que existe percentual dominante no nível salarial entre brancos e negros está associado à desigualdade educacional e outra parte da herança da discriminação educacional infligida às gerações dos pais dos estudantes. Afirma-se que há uma diminuição de desigualdade, sendo conquistada pelas ações afirmativas, porém existe uma longa luta para alcançar os direitos de uma educação igual e justa.

RELAÇÃO PROFISSIONAL X PACIENTE: AMBIENTE ODONTOLÓGICO

DE ARRUDA, Mariana Thalia Lima*; ABREU, Erico Rafael Cinoca; RAMOS, Thalita Sousa; ALVES, Paloma Cristina Nascimento; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: marianaarruda47@gmail.com

O ambiente odontológico como nas outras ciências na área da saúde é de extrema importância um planejamento do espaço, permitindo uma instalação ergonômica dos equipamentos, proporcionando uma condição melhor de trabalho. A instalação do consultório tem dois fatores importantes: a adequação do imóvel e a infraestrutura (representada pela instalação elétrica, hidráulica, de esgoto, do ar comprimido). Um bom ambiente de preferência deve ter dois tipos de iluminação, a natural para que possa receber os raios solares, com janelas favoravelmente voltadas para o norte, e a iluminação artificial que são as lâmpadas fluorescente, proporcionando um espaço agradável. O uso do ar condicionado é imprescindível para manter uma temperatura confortável. Deve-se manter também uma atenção constante os ruídos provocados pelos equipamentos odontológicos como também os ruídos provocados no ambiente externo (fora da clínica) mas esse é mais difícil de controlar. Outro ponto muito importante é a seleção das cores do âmbito odontológico, pois devem sempre apresentarem tons frios de forma harmonizada.

RELAÇÃO ENTRE A DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇA CARDIOVASCULAR

CANDEIRA, Bruna Lima*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; COSTA, Lucas Tadeu Magalhães; MOUCHERECK JÚNIOR, José Carlos Elias; NUNES, Livia Helena De Araújo Castro

Curso: Odontologia

Email: brunalimac@hotmail.com

Ao longo da história muito se fala sobre a relação da doença periodontal com doenças cardiovasculares. Existia uma crença que a doença da cavidade oral tinha efeito no resto do corpo, por esse motivo foram e são realizados inúmeros estudos a respeito dessa relação. A doença periodontal consiste em uma patologia inflamatória de origem infecciosa que atinge os tecidos do periodonto de proteção (gengiva) e posteriormente os tecidos de suporte (osso alveolar, cemento e ligamento periodontal) e pode ser descrita como “infecção bactéria mista” por ser formada por múltiplas espécies bacterianas. Enquanto que a doença cardiovascular é uma doença sistêmica que dificulta ou impede a boa circulação sanguínea. Essa relação começou a ser estudada depois de observado que os agentes infecciosos das periodontites também podem ser encontrados na formação de doenças cardiovasculares como a aterosclerose, que é a formação de gordura, cálcio e células inflamatórias nas paredes das artérias. Além disso, foi percebida através de pesquisas uma grande proporção de pacientes com doença periodontal que também exibia doença cardiovascular. Neste contexto vão ser analisados alguns estudos para se entender a relação dessas patologias e assim evidenciar a importância da descoberta precoce da doença periodontal, evitando seu agravamento e evolução para outra doença. A

partir disso podendo concluir que a prevenção da doença periodontal é importante não só para saúde bucal como de todo o corpo.

RELAÇÃO SIMBIÓTICA ENTRE ANATOMIA GERAL E OSTEOMIELITE

E OLIVEIRA, Italo Afonso Siqueira*; SILVA, Talyne Grayce Cunha*; ARAUJO, Leanderson Cutrim; FAUSTO, Brenda Pereira; LIMEIRA, Herick Cruz; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: italoafonsosiq@live.com

A osteomielite é um processo agudo ou crônico do osso produzido por bactérias piogênicas (produtoras de pus) ou por fungos, que pode permanecer localizada ou difundir-se, comprometendo medula, parte cortical, parte esponjosa e perióstio. Tal infecção pode ser acometida por traumatismo, sendo encontrada com maior frequência em fratura complicada e ferimentos de arma de fogo. Essa doença é encontrada frequentemente como osteomielite supurativa aguda, osteomielite supurativa crônica e mais três de suma importância para o cirurgião-dentista como: A osteomielite crônica focal esclerosante, dá-se pela reação incomum do osso a uma infecção, acompanhada de dor ligeira por estar relacionada a polpa infectada; osteomielite crônica esclerosante difusa, relacionada a uma reação proliferativa do osso a uma infecção de baixo grau, está intimamente ligada a doença periodontal difusa; osteomielite crônica com periostite proliferativa, espessamento localizado do perióstio de ossos longos, com formação periférica de osso reacional, em consequência de irritação ou infecção leve. Este trabalho busca uma revisão de literatura abordando as três fases do tratamento da osteomielite e a correlação da anatomia geral com tratamentos odontológicos, abordando ainda as formas que devem ser tratadas as fraturas visando sempre resolver o problema e evitar o agravamento do processo infeccioso.

RELAÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA COM A SÍNDROME METABÓLICA

MUNIZ, Rayssa Michelle Viegas*; LIMA, Washington Kleber Rodrigues; LIMA, Cláudia Zeneida G. Parente

Email: rayssamichelle11@gmail.com

Curso: Biomedicina

Resumo: A síndrome metabólica (SM) é um fator de desenvolvimento de doenças, que está associada a riscos cardiovasculares, obesidade central e diabetes. Ela tem como base resistência à insulina, que é a incapacidade das células do corpo receber a glicose, gerando uma série de

doenças a médio e longo prazo. Existem alguns motivos que contribuem para o seu aparecimento como a genética, dieta inadequada com excessos de açúcares além do sedentarismo. Geralmente a resistência insulínica é assintomática, mas pode ser detectada através de uma análise bioquímica chamada “curva de tolerância a glicose”. A obesidade é o sinal mais evidente e pode mostrar-se com o aparecimento de verrugas no pescoço, escurecimento da pele em regiões de dobras de braço, axilas, chamado de acantose nigricans. Desenvolvimento: As pessoas mais suscetíveis ao ganho de peso são aquelas que não possuem tempo ou até mesmo dinheiro para fazer uma boa alimentação, optando por fast food, alimentos industrializados que são ricos em gorduras trans ou saturados. Essa carência alimentar moldou o cérebro humano de tal maneira, que ele procura obter o máximo de calorias possível para mobilizar energia acumulando-a sob a forma de gordura que será usada nos períodos de fome provocados pela escassez de comida. A atividade física é essencial para o controle da resistência insulínica, pois as células musculares absorvem grande quantidade de glicose no ato do exercício, assim como uma alimentação equilibrada com alimentos que fornecem açúcar lentamente para a corrente sanguínea. Palavras-chave: Síndrome metabólica, Resistência à insulina, Obesidade

RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA HOSPITALAR

MENESES, Renata Gonçalves*; SOUSA, Carla Carolina Oliveira de; SILVA, Kallyne Trabulsi da; VIERA, Patrissandra Corrêa Rodrigues; SILVA, Silmara Serrão; FARIA, Simony Sousa

Curso: Psicologia

Email: meneses.renata@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo compreender questões voltadas ao vínculo médico-paciente para destacar as implicações psicológicas resultantes desta relação, considerando a subjetividade do paciente no atendimento por meio do olhar da Psicologia Hospitalar para ressaltar como a humanização na prática médica pode trazer melhores resultados e adesão ao tratamento, buscando, dessa forma, problematizar a relação de atendimento entre médico e paciente, a necessidade do surgimento de um acordo de cooperação e comunicação irrestrita e, como a ausência destes influenciam na eficácia do tratamento, que porventura será recomendado, a partir da empatia que surgirá entre os interlocutores citados. Portanto, a relevância de discutirmos o tema se torna interessante para refletirmos como o encontro entre profissionais da saúde e pacientes necessita de maior proximidade e a contribuição da Psicologia na mudança deste paradigma.

RELAÇÃO DIRETA ENTRE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E AS FUNÇÕES DO SISTEMA IMUNE

NETO, Alfredo Ramalho Pereira*, MESQUITA, Gabriele Pereira; SILVA, Isis Maria Miranda Vidal; BARROS, Mariana Castro; ZAMIGNAM Adrielle; DE SOUSA, Rosângela Maria Lopes.

Email: isis.vidal@gmail.com

Área / Especialidade: Nutrição

O funcionamento e o desempenho do sistema imune são os primeiros atingidos quando o organismo está exposto a situações de alimentação inadequada e desnutrição. A presente revisão busca explicar a relação entre uma alimentação saudável e o funcionamento do sistema imune. Revisão: As vitaminas e minerais são nutrientes que regem a boa atuação do sistema imunológico, de modo que uma alimentação equilibrada, rica nos mais diversos nutrientes que atenda às necessidades fisiológicas mantém o bom funcionamento do sistema imunológico, atuando na proteção do organismo contra agentes externos, como bactérias, fungos, protozoários ou vírus. Compostos, como a vitamina A, é responsável pela modulação das células fagocitárias, que são eficientes em englobar e eliminar substâncias infecciosas. Sua deficiência tem como prejuízos a redução na capacidade de destruição de agentes infecciosos devido à redução de órgãos como o timo e o baço, além da diminuição das células natural killer. Os minerais, como o ferro e o zinco também exercem importantes funções, entre elas estão: manutenção e proliferação dos linfócitos T, atividade normal das células T auxiliaadoras, além da preservação da capacidade fagocitária dos leucócitos. Conclusão: Sendo assim os estudos feitos levaram a um melhor entendimento dos impactos da deficiência de vitaminas e minerais na alimentação, causando inúmeros prejuízos ao sistema imune que acaba por ter uma redução da capacidade de identificação e destruição de agentes infecciosos, expondo o organismo aos mais diversos agentes patológicos e disfunções dos órgãos que compõem esse sistema.

RELAÇÃO DO CANCER PANCREÁTICO COM A DOENÇA PERIODONTAL

MACHADO, Mayanne*; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; SARAIVA, Lívia; ZAGO, Patrícia Maria Wiziack; NUNES, Lívia Helena de Araújo Castro.

Email: mayannemachado@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

DOENÇA PERIODONTAL E SUA RELAÇÃO COM O CÂNCER DE PÂNCREAS Autores: Mayanne Matos José Carlos Elias Mouchrek Júnior Co-orientadora: Lívia Helena de Araújo Castro Nunes Orientadora: Patrícia Maria Wiziack Zago O câncer de pâncreas é altamente letal, de rápido desenvolvimento e responsável por mais de 40 000 mortes ao ano somente nos Estados Unidos. A sua detecção precoce poderia aumentar a sobrevivência de muitos pacientes, porém, nenhum marcador específico para a doença foi estabelecido com sucesso. Assim, a detecção e prevenção precoce do câncer adquire maior importância, o que fomenta estudos que verifiquem outras

condições envolvidas com o seu aparecimento. Dentre essas condições está a doença periodontal, cujo caráter inflamatório poderia auxiliar em uma forma precoce de detecção de vários tipos de câncer, caso uma associação entre as duas enfermidades fosse estabelecida. Nesse sentido, alguns estudos investigaram e verificaram a relação entre a doença periodontal e o câncer de pâncreas. Pesquisas puderam identificar em indivíduos tabagistas, todavia, sendo o fumo confirmado como um fator de risco para o câncer de pâncreas, a extrapolação desses resultados para uma associação com a doença periodontal não pode ser estabelecida. Recentemente, outro trabalho verificou que indivíduos que continham em sua microbiota bucal uma das bactérias periodontopatogênicas como a *Porphyromonas gingivalis* ou *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* apresentaram uma maior chance de desenvolver o câncer de pâncreas. Da mesma maneira, outra pesquisa identificou a presença de espécies de *Fusobacterium* nos tecidos de um pâncreas doente. Conclui-se que a presença de uma microbiota periodontopatogênica em pacientes com câncer pancreático sugere uma relação positiva entre as duas doenças; no entanto, mais estudos são necessários tanto para a comprovação quanto para a definição da maneira em que ambas estão associadas

RELAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA COM PACIENTES COM TRANSTORNO DE DEFICIT ATENÇÃO HIPERATIVIDADE (TDAH) INFANTIL

ARAÚJO, Hellen Dayane Ferreira*; SARMENTO, Cássia Laís Sousa; SANTOS, Lilian Raquel Garcês; DIAS, Yrlla Rafaelle Rodrigues; ROCHA, Josielma Mafra; ALVES, Cândida Helena Lopes;

Curso: Fisioterapia

Email: hellen_araujo1@live.com

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH infantil quando não diagnosticado corretamente, ou possui falhas em seu tratamento pode acarretar no fracasso escolar e gerar comportamento antissocial no indivíduo. O quadro clínico do TDAH apresenta problemas como de conduta, e socialização que podem repercutir em seu desenvolvimento emocional, psicológico e social, além de comprometimento das habilidades cognitivas e problemas neurológicos e motores. E é neste contexto que o Fisioterapeuta se insere, quando a motricidade e o desempenho funcional do indivíduo é afetado. A psicomotricidade pode intervir e ajudar às crianças hiperativas através da transformação do espaço, a criança poderá conter seu pensamento e se engajar verdadeiramente na ação, saindo da atividade motora impulsiva em que se encontrava. O problema motor mais encontrado entre pacientes de TDAH infantil é o Distúrbio do Desenvolvimento da Coordenação (DDC). O distúrbio causa uma incapacidade de planejamento e execução de ações motoras, dispraxia do desenvolvimento. Conclui que é importante no tratamento fisioterápico estabelecer uma relação de confiança, onde o paciente

e a família se sintam confortáveis e dispostas a contribuir com o tratamento. E embora o fisioterapeuta não conste claramente nos tratamentos do TDAH infantil, é óbvio que os resultados alcançados por indivíduos com a patologia são mais satisfatórios e eficazes. O tratamento dos sintomas psicomotores por meio do fisioterapeuta, buscando a recuperação de alterações motoras, cognitivas de coordenação e de equilíbrio.

RELAÇÃO ENTRE A DOENÇA PERIODONTAL E A ASMA

MARTINS, LUCYANA GOLÇALVES*; NUNES, Livia Helena Castro; MOUCHREK JUNIOR, José Carlos Elias;

Curso: Odontologia

Email: lucyanagm@hotmail.com

As doenças periodontais decorrem da ação de microrganismos e podem ser divididas em gengivites e periodontites. A gengivite apresenta-se como a inflamação do tecido gengival e a periodontite como o processo inflamatório que estende-se às estruturas periodontais de suporte (cimento, osso alveolar e ligamento periodontal). A asma pode ser dividida em intrínseca e extrínseca. A asma intrínseca está relacionada com uma reação de hipersensibilidade tardia. Já a asma extrínseca relaciona-se à resposta de hipersensibilidade imediata. É bem provável que as reações de hipersensibilidade podem estar relacionadas com o processo de desenvolvimento da doença periodontal, onde os níveis de imunoglobulina E (IgE) mostram-se elevados no tecido gengival de um portador de periodontite. Pelo fato da asma ser uma doença de caráter inflamatório, pacientes asmáticos possuem uma alteração na capacidade de defesa do organismo, o que ajuda no desenvolvimento de infecções, entre elas a doença periodontal. Em pacientes asmáticos, a presença de patógenos periodontais pode estimular a produção de anticorpos específicos que podem alterar a resposta imunoinflamatória, além disso, o uso de corticosteroides por tempo prolongado para o tratamento da asma são fatores que devem ser considerados. A diminuição do fluxo salivar apresentado por quem utiliza esse tipo de medicamento pode estar fortemente relacionada ao desenvolvimento da periodontite, logo, se em pacientes asmáticos, o desenvolvimento da doença periodontal pode ser mais expressivo em comparação aos indivíduos saudáveis, à presença de grande quantidade de microrganismos bucais, pode contribuir para um pior controle da doença.

RESILIENCIA E ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO: RESISTIR, RESSIGNIFICAR E RECOMEÇAR UM NOVO PROJETO DE VIDA

FERREIRA, Isabel Cristina Rezende Carnota*; LIMA, Rusiane Brito; DE OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo; LEITE, Zinole Helena Martins

Email: rusianebrito@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Situações de extrema ameaça à vida psicológica, prescindem de uma qualidade especial para ser superadas e ressignificadas através de uma postura resiliente. Não se nasce resiliente, nem se adquire a resiliência “naturalmente” no desenvolvimento: depende de certas qualidades do processo interativos do sujeito com outros seres humanos, responsável pelo seu desenvolvimento. Objetiva-se com esta pesquisa bibliográfica e exploratória refletir sobre a importância da resiliência frente a situações de estresse pós-traumático. Analisou-se livros e artigos relacionados aos temas disponíveis nas bases de dados virtuais, considerando-se as palavras-chaves: Resiliência. Transtorno pós-traumático, estresse. Revisão: A resiliência corresponde a um conjunto de traços de personalidade e capacidades que tornavam invulneráveis as pessoas que vivenciaram experiências traumáticas e não desenvolveram doenças psíquicas, diferenciando, assim, a qualidade de serem resistentes. Está presente em diferentes graus nos seres humanos, mas é no meio a tormentos que se revela, ou depois como uma força canalizadora de energia de sofrimento que transforma, restaura e dá impulso para um novo movimento na vida das pessoas, especialmente em situações de estresse pós-traumático. Conclusão: Pessoas resilientes são capazes de vencer as dificuldades e situações traumáticas, retornando à sua homeostase; encontram soluções criativas para adaptar-se ao seu projeto de vida. A falta de flexibilidade em situações de traumas e sofrimentos é uma das dificuldades para harmonizar um projeto de vida, é um fator que inibe o desenvolvimento da capacidade resiliente, predispondo a sofrimentos psíquicos.

RESINAS BULK FILL: CARACTERÍSTICAS E DISPONIBILIDADE NO MERCADO

CASANOVA, Rayanne Ribeiro*; CARNEIRO, Karina Gama Kato; GOMES, Isabela Azevedo; KUSSANO, Sandro Carvalho; CAVALCANTI, Karoline Guará Brusaca Almeida; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; NOGUEIRA, Rodrigo Proença.

Curso: Odontologia

Email: raycasanova@outlook.com

As resinas Bulk fill foram introduzidas no mercado para melhorar o dia a dia do consultório sem comprometimento das propriedades mecânicas do material. O objetivo deste trabalho foi realizar uma breve revisão da literatura com trabalhos relacionados ao tema no intervalo de 5 anos de maneira a informar sobre as características da resina Bulk fill, quais marcas estão disponíveis e sobre a principal proposta deste material no mercado. A técnica de restauração incremental, onde esse incremento deve ser inserido na cavidade com até 2mm de diâmetro, é a mais utilizada tendo em vista uma completa polimerização do material, um maior controle da

contração de polimerização da resina e manutenção de suas propriedades. As resinas Bulk Fill têm o propósito de inserção na cavidade em único incremento de 4-5mm de diâmetro com baixa contração de polimerização e maior transmissão de luz. Além disso, o emprego de novos monômeros a base de metacrilato, sistemas fotoiniciadores e reforço da fase inorgânica com fibras de vidro, justificam a tecnologia diferenciada dessas resinas. As resinas Bulk fill podem ser classificadas de alta e baixa viscosidade (Bulk fill flow). Apesar do enfoque atual, a literatura ainda é controversa quanto ao desempenho das resinas Bulk fill, uma vez que ainda existem restrições a cerca de alguns componentes do material, que leva a pouca informação sobre o seu desempenho. Desta forma, vê-se a necessidade de realização de mais estudos para elucidar as dúvidas sobre o material.

RESPIRADORES ORAIS: A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA.

VALE, Carlos Eduardo Silva*; FERREIRA, Mychelle Thainá Marques; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: eduardo.vale88@live.com

Área / Especialidade: Odontologia

Com avanço da tecnologia, ainda é bastante negligenciada a percepção dos sinais e sintomas de pacientes nas clínicas de odontologia, onde os respiradores orais são um dos casos mais afetados com a falta de conhecimento do profissional. É importante que o cirurgião dentista reconheça algumas das principais características destes indivíduos como: respiração bucal, obstrução nasal, ardência prurido na faringe, muco espesso aderido à orofaringe, cefaleia e halitose. Observa-se ainda face alongada, gengiva hipertrófica, estreitamento da arcada superior do palato e das narinas, lábio superior hipotônico, entre outros. Faz-se necessário ainda orientar o paciente a um acompanhamento multiprofissional com otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, ortodontista, dentre outros.

RESPIRADORES ORAIS: A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA.

VALE, Carlos Eduardo Silva*; FERREIRA; Mychelle Thainá Marques; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: eduardo.vale88@live.com

Curso: Odontologia

Com avanço da tecnologia, ainda é bastante negligenciada a percepção dos sinais e sintomas de pacientes nas clínicas de odontologia, onde os respiradores orais são um dos casos mais afetados com a falta de conhecimento do profissional. É importante que o cirurgião dentista reconheça algumas das principais características destes indivíduos como: respiração bucal,

obstrução nasal, ardência prurido na faringe, muco espesso aderido à orofaringe, cefaleia e halitose. Observa-se ainda face alongada, gengiva hipertrófica, estreitamento da arcada superior do palato e das narina, lábio superior hipotônico, entre outros. Faz-se necessário ainda orientar o paciente a um acompanhamento multiprofissional com otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, ortodontista, dentre outros.

REVASCULARIZAÇÃO PULPAR- PROTOCOLO CLÍNICO ATUAL

ZAMIGNAM, Kalleny*; CAVALCANTI, Jaqueline Nogueira; CALDAS, Lilliany se Fátima Janse Pereira; NOGUEIRA, Ana Gabrielly Coimbra; NETO, João Lucio Lira; CARVALHO, Ceci Nunes; RIZZI, Cláudia.

Email: kalleny95@hotmail.com

Curso: Odontologia

O tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar é um dos principais desafios enfrentados na Endodontia pois apresentam características que dificultam o tratamento, como canais amplos e paredes dentinárias delgadas. Técnicas de tratamento convencionais como a apicificação com hidróxido de cálcio ou plug apical com MTA possuem desvantagens, como a não indução do desenvolvimento radicular. Recentemente têm surgido novos conceitos de tratamento para esses dentes, embasado nos avanços sobre regeneração tecidual, a chamada revascularização pulpar. Embora a literatura documenta bons resultados clínicos de casos de revascularização pulpar, existem várias ressalvas. Não há ensaios clínicos randomizados realizados até o momento, assim, os clínicos devem contar com níveis mais baixos de evidências científicas, resultando em grandes divergências nas diferentes fases de tratamento da revascularização (como na irrigação, medicação intracanal, formação do coágulo e selamento cervical), onde os clínicos devem confiar na melhor evidência disponível, o que em alguns casos se resume à opinião de especialistas que se baseiam em estudos pré-clínicos. A mais forte evidência de sucesso após o tratamento regenerativo é a cura da periodontite apical e o término do desenvolvimento radicular baseado em exame radiográfico. Protocolos clínicos atuais não fazem uso pleno da tríade da engenharia de tecidos e de estudos pré-clínicos que indicam que a adição de fatores de crescimento específicos e scaffolds é necessária para a regeneração do tecido pulpar. Assim, este trabalho tem como objetivo descrever um protocolo clínico atual baseado nas recentes publicações científicas sobre o tema.

REVISÃO INTEGRATIVA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDÍACOS

DA CUNHA, Kátia Cristina Souza*; ALMEIDA, Lorena de Sena; DE MELO, Mayara Gomes; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes

Curso: Enfermagem

Email: katiacsdacunha@gmail.com

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Cabe aos enfermeiros promoverem o atendimento das necessidades dos pacientes. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão integrativa sobre os cuidados de Enfermagem em pacientes adultos e crianças submetidas à Cirurgia Cardíaca. Empreendeu-se levantamento bibliográfico, em abril de 2016, de periódicos em língua portuguesa dos últimos cinco anos, na Biblioteca Virtual de Saúde (bases SCIELO e LILACS) e também na base Google Acadêmico, utilizando como DeCS: enfermagem, cirurgia cardíaca e procedimentos cirúrgicos cardíacos. Após a seleção do material, foi feita leitura e análise do conteúdo abordado e analisados o perfil das instituições executoras dos trabalhos, a categoria da pesquisa e quais as principais contribuições para a assistência em enfermagem. No total, foram selecionados 20 artigos, onde a maioria, 60% (12 artigos) foram disponibilizados na base de dados SCIELO, 30% (6 artigos) produzidos por instituições do estado de São Paulo e 35% (7 artigos) publicados no ano de 2012. A complexidade que envolve a assistência ao paciente no pós-operatório exige a atuação de uma equipe multiprofissional com treinamento específico exigindo que o profissional se especialize e tenha capacidade e sensibilidade para o trabalho em caráter multi e interdisciplinar. Ainda há uma grande lacuna a ser preenchida pela enfermagem nessa especialidade, visto que, a revisão integrativa, visa a aplicação na prática dos conhecimentos coletados na literatura científica. Nesse sentido, é importante o estímulo para a confecção de mais estudos na língua portuguesa, para facilitar o acesso a esses trabalhos

RISCOS CAUSADOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO EXPOSTA AO USO DE AGROTÓXICOS

PEREIRA, Jessica Bianca Passos*; PONTES, Kamylla Karolynne; SOARES, Ester Barbosa; CARVALHO, Carolina Abreu; SILVA, Eliziane Gomes da Costa Moura; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu; CARVALHO, Wyllyane Rayana Chaves.

Email: jessiepassos@hotmail.com

Área / Especialidade: Nutrição

Introdução: Agrotóxicos são produtos químicos, utilizados no combate de pragas e doenças de plantas, e para garantir o aumento da produtividade. Podem gerar danos à saúde das pessoas. Seu crescente uso na produção agrícola e a decorrente presença de resíduos acima dos níveis autorizados nos alimentos têm causado preocupação a saúde pública. **Objetivo:** Verificar os riscos causados à saúde da população exposta ao uso de agrotóxicos. **Metodologia:** Revisão de

literatura a qual utilizou-se artigos de 2010 a 2016, disponíveis no SciELO e LILACS. As publicações foram definidas a partir dos descritores: agrotóxicos, impactos dos agrotóxicos a saúde e resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Resultados: O Brasil vem liderando o ranking de consumo de agrotóxicos no mundo. De acordo com análise coletadas em 26 estados do Brasil, um terço dos alimentos consumidos diariamente está sujeito a contaminação por resíduos de agrotóxicos. A ABRASCO mostra os riscos causados por intoxicação de agrotóxicos e destaca que pode ocasionar intoxicação aguda: irritação nos olhos, na pele, espasmos musculares, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, dor de cabeça e até morte em casos de contato com doses altas, e intoxicação crônica: dermatites de contato, danos cerebrais, arritmias cardíacas, problemas respiratórios e câncer. Conclusão: O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas de agrotóxicos, devido as plantações de soja e milho. Dados apontam que as altas dosagens de agrotóxicos nas plantações vêm acarretando danos nocivos à saúde das pessoas expostas a esses agentes químicos exigindo do governo investimento para implementar ações de controle ao uso dessas substâncias.

SENSIBILIDADE DENTINÁRIA PÓS-OPERATÓRIA

DA SILVA, Mariana Aroucha*; ARAÚJO, Leanderson Cutrim; AQUINO, Gabriela Desterro; SILVA, Leila Campos Silva; ARAÚJO, Tayane Freitas Araújo; MAIA, Mariana Figueiredo Lopes; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Email: leo.cutrim@icloud.com

Área/Especialidade: Odontologia

A sensibilidade dentinária pós-operatória é uma condição clínica considerada relativamente comum, podendo gerar desconforto tanto ao paciente quanto ao profissional. Ela pode ser definida como uma dor associada a mastigação ou ao contato com estímulos como frio, quente, doce ou azedo, que ocorre após algum tratamento restaurador e se manifesta clinicamente como dor aguda, de curta duração que desaparece quando removido o estímulo. As causas da sensibilidade pós-operatória podem ser causas pré-operatórias, como condição pulpar, trincas e fraturas do dente e áreas de exposição dentinária cervical; causas operatórias, como: calor friccional e desidratação da dentina, contaminação da cavidade, negligência com a proteção dentinopulpar, realização do condicionamento ácido e/ou aplicação do adesivo de forma incorreta, inserção inadequada da resina, contração de polimerização e falta de material nas margens da restauração; e causas pós-operatórias, como interferências oclusais. Portanto, observa-se que grande parte das causas de sensibilidade pós-operatória podem ser evitadas ou minimizadas pelo cirurgião dentista através do conhecimento e domínio adequado das técnicas restauradoras e cuidados durante o procedimento restaurador, principalmente o domínio da

técnica adesiva e conhecimento das propriedades do material restaurador utilizado e sua correta indicação. Palavras-chave: Sensibilidade da dentina; Restauração dentária permanente, Falha de Restauração Dentária

SEXUALIDADE FEMININA E CONSUMO DE PRODUTOS ERÓTICOS

GARROS, Rosilêde*; SERRA, Melina

Curso: Psicologia

Email: rosegarros@gmail.com

O crescimento do consumo feminino no mercado de produtos eróticos, constatado através de pesquisas recentes, sinalizam as questões que compõem o presente trabalho, que se propõe a refletir sobre a sexualidade feminina e o consumo de produtos eróticos. Estudos apontam que o público feminino tem se apropriado de novas alternativas para vivenciar sua sexualidade. A mulher tem buscado outras formas de experimentar se realizar sexualmente, no intuito de alcançar suas satisfações e desejos. O surgimento de butikues eróticas exclusivamente femininas e o crescimento da indústria erótica como um todo são, ao mesmo tempo, causa e consequência de transformações culturais importantes. Percebe-se um crescimento na procura de produtos eróticos femininos em lojas físicas e virtuais. A necessidade de consumo da mulher está diretamente ligada a uma dinâmica complexa, a qual envolve cultura, vivência da sexualidade e consumo. Diversas pesquisas constataram o crescimento do mercado erótico em cidades do Brasil, destacando que o maior número de clientes dos segmentos sex shop são mulheres com mais de 30 anos, heterossexuais, casadas. A literatura investigada aponta que a preferência feminina pelo consumo de produtos eróticos é ocasionada por: 1) intuito de alavancar sua autoestima e estimular sua sensualidade, 2) uma crescente curiosidade e preocupação com o próprio prazer e com a saúde sexual do relacionamento. Novos estudos que investiguem diretamente o consumo erótico são necessários para entender os novos papéis sexuais, além de contribuir para a compreensão da vivência da sexualidade feminina na contemporaneidade.

SINAIS E SINTOMAS RELACIONADOS AO USO DE ANTIBIÓTICOS NA CAVIDADE BUCAL E ANSIOLÍTICOS.

AGUIAR, Kelly Glayce Desterro*; ALMEIDA, Valeria da Silva; CORREA, Natália de Araújo; COSSON, Nathalia Miranda; NUNES, Suellen de Kassia França; MACIEL, Maciel, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: kelinhagata201333@hotmail.com

Curso: Odontologia

Muitos medicamentos utilizados com ou sem prescrição de um profissional de saúde têm o potencial de causar reações adversas na mucosa bucal. Os sinais e sintomas que normalmente são observados na cavidade bucal em decorrência do uso de antibióticos são, erupções liquenoides que acomete a pele e/ou a mucosa bucal, eritema multiforme e a xerostomia, que tem como uma de suas causas o uso de antibióticos, ela pode afetar a produção da saliva aos graus de deferimento, com algumas medicações produzindo uma sensação mais robusta de boca seca. É um sintoma frequente em pacientes de cuidados paliativos. Onde pacientes se queixam de uma boca seca persistente, muitas vezes causada por uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. O papel do clínico, seja cirurgião-dentista ou médico, deve ser o de sempre avaliar a real necessidade do emprego dos antibióticos. Em aproximadamente 60% dos casos de infecção em humanos, as próprias defesas do hospedeiro são as responsáveis pela resolução do processo, sem a necessidade de utilização de antibióticos. Outro antibiótico é a tetraciclina provoca em crianças na fase de calcificação dos dentes, descoloração marrom dos mesmos: quanto maior a dose do medicamento em relação ao peso corpóreo, mais severa a deformidade, mais escura a coloração e mais intensa hipoplasia do esmalte. Sintomas e sinais dos efeitos de antibióticos: sinais e sintomas Erupções liquenoides manchas avermelhadas disseminadas pelo corpo, placas de urticária, descamação, pústulas e bolhas Eritema multiforme lesões circulares e avermelhadas, distribuídas pelo corpo, coceira nas regiões afetadas Xerostomia produz sensação robusta de boca seca Hipoplasia manchas esbranquiçadas, rugosas, sulcos ou ranhuras nos dentes Ansiolíticos O emprego de medicamentos de classe dos ansiolíticos constitui-se em uma prática terapêutica comum para o controle de ansiedade, que pode ser associado ou não a psicoterapia. Possuem grande eficácia, baixa toxicidade e pouca capacidade de produzirem dependência química. Entretanto existem alguns efeitos adversos inerentes a tais medicamentos que causam alterações na cavidade bucal, sendo uma das principais a síndrome da ardência bucal, que é uma condição caracterizada pela sensação de queimação da mucosa bucal, sem que uma causa física possa ser detectada e ainda tem xerostomia, que é também conhecida como boca seca ou secura da boca, esse sintoma estar relacionado à falta de saliva. A xerostomia pode causar dificuldade em falar e comer. Também pode levar à halitose (mau hálito) e aumento dramático de cáries dentárias, já que o efeito de proteção da saliva não está presente, e também pode fazer com que a mucosa da boca se torne mais vulnerável a infecções.

SÍNDROME METABÓLICA: VOCÊ CONHECE OS RISCOS?

ARAÚJO, João Victor Ferreira*; DE SOUSA, Leila Cristina Almeida;

Curso: Farmácia

Email: leila-sousa@uol.com.br

A síndrome metabólica é definida com um grupo de fatores de risco que diretamente contribuem para o desenvolvimento de doença cardiovascular e/ou diabetes do tipo 2. A obesidade abdominal e a resistência à insulina parecem ter um papel fundamental na gênese desta síndrome. O estudo teve como objetivo explorar a relação entre a Síndrome Metabólica e os principais fatores associados a esta, com ênfase nas causas, sintomas e tratamentos disponíveis atualmente. Para elaboração da revisão de literatura buscou-se artigos relevantes das revistas Scielo, USP e PUBMED, que tinham em seu título as palavras-chave “Síndrome Metabólica”, além de sites brasileiros especializados no assunto. Revisão: A síndrome metabólica, conhecida também como síndrome da resistência à insulina ou síndrome plurimetabólica é um conjunto de doenças associadas que levam principalmente ao aumento do risco de problemas cardiovasculares. Tendo como principal causa o ganho de peso, esta síndrome está relacionada ao desenvolvimento de diabetes e colesterol. Conclusão: Se não tratada precocemente a síndrome metabólica tende a gerar novas complicações, diminuindo assim o tempo e a qualidade de vida do portador. Atualmente, o tratamento inclui atividade física regular, alimentação equilibrada e perda de peso.

SÍNDROMES RELACIONADAS AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

SAUAIA, Adalgisa Lopes Pereira*; DA CRUZ, Ingrid Naiany Carvalho; MOTA, Ivanize Ferreira; DA SILVA, Katiane Reis; FIDELES, Renato Moreira; LOBATO, Rafisa

Email: adalgalpsauaia@bol.com.br

Curso: Psicologia

Resumo: O presente estudo tem como objetivo conhecer algumas das principais substâncias psicoativas e seus malefícios, tais como: o álcool, maconha, cocaína e crack. Assim como conhecer as práticas psiquiátricas e psicoterápicas aplicadas ao cuidado de indivíduos que sofrem de algumas síndromes relacionadas a essas substâncias. No Brasil, o uso de substâncias químicas que alteram as funções do Sistema Nervoso Central aumenta significativamente, sendo comum seu uso nos mais diversos contextos sociais. Para Dalgalarro (2000) os quadros de intoxicação, abuso e dependência de álcool e outras substâncias psicoativas caracterizam-se por uma forma particular de relação entre os seres humanos e as substâncias químicas que apresentam ação definida sobre o SNC e o psiquismo. A relação entre o homem e as substâncias psicoativas mostra que uma parcela da população apresenta prejuízos ligados ao uso dessas substâncias que, quando ingeridas em excesso, causa uma síndrome reversível específica, gerando alterações comportamentais e mentais: intoxicação. Essa se torna abuso quando utilizada repetidas vezes. A síndrome de dependência de álcool é uma das maiores prevalências quando relacionadas a substâncias psicoativas. Enquanto que, a cocaína inalada e sua forma

fumada, o crack, continuam sendo drogas de abusos importantes no Brasil. O uso de maconha está associado ao desencadeamento de quadros psicóticos em pessoas predispostas. Pode-se concluir que a falta de conhecimento das características e do uso exagerado de cada uma dessas substâncias e os malefícios causados por dosagens elevadas são em sua grande maioria as causas do aumento alarmante de dependentes no mundo inteiro.

SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA-AUDITIVOS EM OPERADORES DE TELEMARKETING

SILVA, Ianne Melo*; RODRIGUES, Tuanne Morais; SANTOS, Danielle Ferreira; BEZERRA, Sara Wellem Sousa; CALDAS, Erica Alessandra; AMORIM, Camila Malcher Teixeira.

Curso: Fonoaudiologia

Email: iannemelo@live.com

Os atendentes de telemarketing estão constantemente expostos a agentes físicos nocivos à audição. Os distúrbios auditivos atribuídos à exposição dependem da frequência, intensidade, duração e ritmo do ruído e da suscetibilidade individual. Zumbido, cefaleia, plenitude auricular, tontura, distúrbios gástricos, estresse, além de distúrbios da visão, atenção e memória, do sono e do humor são descritos na literatura como sintomas decorrentes de ambiente ruidoso. O objetivo desse trabalho foi descrever os sintomas auditivos e extra-auditivos presentes em operadores de telemarketing, através da revisão de publicações científicas. Foi possível concluir que o ambiente físico de trabalho inadequado com mobiliário fixo com baixos níveis de adaptabilidade ao corpo dos indivíduos, ruído intenso, ausência de iluminação, ventilação natural e qualidade desfavorável dos equipamentos de telefonia podem desencadear possíveis doenças auditivas e não auditivas em operadores de telemarketing.

SINTOMATOLOGIA DE DOENÇAS VIRAIS E FUNGICAS NA CAVIDADE ORAL

SOUSA, Daniel de Aquino*; MACHADO, Daniel Augusto Pereira; MONTEIRO, Elynara de Jesus Silva; DA COSTA, Bruna Ramos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Limal

Email: danieldeaquinosousa@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: As doenças Infectocontagiosas, especialmente vírus e fungos se destacam pela evolução e sintomatologia apresentada na cavidade oral. O HPV, quando manifestado na região estomatognática, causa aparição de papilomas, condilomas acuminado, verruga virais, líquen plano, leucoplasia, hiperplasia epitelial focal e carcinomas. Os fungos possuem o crescimento em áreas de mucosa. Em especial a cândida tem sua evolução em locais de bolsas periodontais, causando aparecimento de placas esbranquiçadas, ardência, dor, dificuldade para ingerir e

agravamento da periodontite crônica. Em relação a zyka, evidencia erupções cutâneas na área labial e raramente úlceras na mucosa oral. Chikungunya demonstra dores na faringe, edema de nódulos linfáticos no pescoço, podendo ocorrer sangramento na cavidade oral. A dengue apresenta, perda da sensibilidade do paladar e falta de apetite. No caso da dengue hemorrágica observa-se sangramento gengival e oral. Manifestações do vírus HIV na cavidade bucal, manchas brancas ou manchas estranhas localizadas na língua, bochecha e faringe, eritema gengival linear, gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante e sarcoma de Kaposi. Esses portadores possuem seu sistema imunológico bem deficiente tornando alvos mais suscetíveis à aparição de verrugas orais, leucoplasia pilosa, gengivite, candidíase e herpes labial. A importância do cirurgião dentista e saber diagnosticar, conhecer, informar, identificar lesões da cavidade oral, para alertar o paciente de uma patologia que pode estar afetando seu organismo evitando que a doença se agrave.

SISTEMA TNM: CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA PROGNÓSTICO

CANTANHEDE, Ivania de Araújo*; PEREIRA, Priscila Silva; SOUSA, Itáisa Cavalcante; BECKMAN, Vanessa Maria Soares; DA COSTA, Clara Monique Lara; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: alvaroluizcardoso@yahoo.com.br

Curso: Odontologia

Resumo: O Sistema TNM para a classificação dos tumores malignos foi desenvolvido, entre os anos de 1943 e 1952, por um professor francês chamado Pierre Denoix. No sistema TNM, para cada lesão maligna, é atribuído a uma letra ou um número para descrever o tumor, linfonodos e metástases. A sigla TNM significa: T: Tumor primário, N: Para linfonodos e M: Para metástase. A classificação é dividida por categorias, a categoria T fornece informações sobre aspectos do tumor primário, tamanho, quão profundamente se desenvolveu no órgão, em que se originou e quanto invadiu os tecidos adjacentes: TX: O tumor não pode ser avaliado, T0: Não existe evidência de tumor primário. Tis: As células cancerosas estão se desenvolvendo apenas na camada mais superficial do tecido. T1, T2, T3, T4: Tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário. A categoria N descreve se o câncer se espalhou para os linfonodos vizinhos. NX- Os linfonodos não podem ser avaliados, N0- Os linfonodos vizinhos não contêm câncer. N1, N2, N3- Comprometimento crescente dos linfonodos regionais. A categoria M descreve se o câncer se espalhou para locais distantes do corpo: MX: A presença de metástase à distância não pode ser avaliada, M0: Nenhuma disseminação foi encontrada, M1: O câncer se espalhou para tecidos e órgãos distantes. Alguns tipos de câncer também têm agrupamentos especiais que são

diferentes de outros. Por exemplo, existem classificações que podem ter subcategorias, tais como T3a e T3b, enquanto outros podem não ter uma categoria N3.

SISTEMA TNM: IMPORTÂNCIA PARA PROGNÓSTICO

REIS, Cristina Lúcia Santos*; BRITO, Thayná Nildete Rodrigues Cunha; SANTIAGO, Jessica Mendanha; MEMÓRIA, Rayssa Moura; SOUZA, Bruno Alves De ; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima.

Email: thaynanildete@hotmail.com

Curso: Odontologia

A classificação dos tumores serve como um guia para o tratamento, avaliação do prognóstico e resultado terapêutico. Surgiu da constatação de que as taxas de sobrevivência são diferentes quando a doença está restrita ou se estendeu a outros órgãos. As regras internacionais possuem variáveis e elementos tais como: localização, tamanho, volume do tumor, invasão linfática e metástase à distância. Estadiamento é uma forma resumida de descrever uma doença agrupando casos com características semelhantes, em categorias com base na extensão da doença, antes de iniciar o tratamento. Utiliza-se o formato de código com caracteres alfanumérico, que torna mais fácil o entendimento em qualquer idioma, pois permite o acréscimo de valores, significados e severidade da doença. Sobre o TNM, A American Joint Committee on Cancer (AJCC) e a União Internacional de Controle do Câncer (UICC) utilizam o sistema de classificação TNM como uma ferramenta para os médicos estadiarem diferentes tipos de câncer. O TNM atribui letra e número para descrever o tumor, linfonodos e metástases. T = Extensão do tumor primário e suas subcategorias N = Ausência ou presença de linfonodos regionais e suas subcategorias M = Ausência ou presença de metástase à distância e suas subcategorias O prognóstico ocorre quando o profissional faz a leitura baseado nos indícios detalhados do diagnóstico sobre como a doença vai evoluir e estabelece as alterações para o tratamento, as chances de cura e possível duração de acordo com os sintomas, histórico do paciente. O prognóstico pode ser bom ou ruim depende dos eventos mapeados sobre o paciente.

SOJA COMO PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

VALE, Camila Costa*; SILVA, Michelle Costa; LIMA, Christiane Thays Barbosa; CARVALHO, Wyllyane Rayana Chaves; CARVALHO, Carolina Abreu De.

Email: camilac.vale@hotmail.com

Área / Especialidade: Nutrição

O Brasil está entre os maiores produtores de soja do mundo. A soja é um alimento funcional, fonte de vitaminas e minerais de grande interesse mundial devido à sua versatilidade de utilização. A relação entre o consumo de soja e a saúde humana tem sido investigada pelas características nutricionais desse alimento, que possui em sua composição elevado teor de proteína, quantidade reduzida de gordura saturada e a ausência de colesterol, além de substâncias denominadas fitoquímicos, entre os quais os flavonóides e isoflavonas, que auxiliam na redução do colesterol sanguíneo e por isso seu consumo têm sido aplicado na prevenção de doenças como os distúrbios cardiovasculares. É capaz de substituir a carne na alimentação e, ao mesmo tempo, assegurar uma dieta livre de colesterol e gordura saturada. E ainda, associada à prática de exercícios físicos regulares, ajuda a controlar a obesidade, reduz complicações da osteoporose e do diabetes. Estudos epidemiológicos demonstraram que, em países orientais que possuem consumo maior de soja, a taxa de morbidade e mortalidade para doenças cardiovasculares e diabetes é menor do que a dos países ocidentais. Embora ainda existam alguns resultados contraditórios quanto ao consumo de soja, esta é indicada a todos que desejam ter uma alimentação saudável, realizar um tratamento natural e, ao mesmo tempo, prevenir doenças metabólicas. Portanto, várias diretrizes confirmam que o consumo usual de soja é benéfico ao coração, controla os níveis de colesterol e previne doenças crônicas. Dessa forma recomenda - se a mesma para melhorar a qualidade de vida.

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE COMO DIAGNOSTICO DE PNEUMONIAS: FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS

MARTINS, Debora Bastos*; COSTAS, Anne Jacqueline de Barros; BARROS, Geane Lindozo; SILVA, Karina de Kassia; RAMOS, Dayse Léa Silva; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; SANTIAGO, Lília De Cássia Piedade

Curso: Enfermagem

Email: debie.bastos@hotmail.com

A Pneumonia é uma infecção aguda dos pulmões, é a infecção que mais acomete os pacientes internados, sendo que sua incidência pode variar de 9 a 68%. Pode ser comuns a tipos de pneumonias bacterianas como Streptococcus pneumoniae e Legionella pneumophila, exceto pela presença de cavitações em um quarto dos casos. O objetivo do estudo é identificar Streptococcus Pneumoniae como diagnóstico de pneumonias e quais fatores de riscos associados. Tratou-se de um estudo cuja pesquisa foi de forma integrativa da literatura, com finalidade de juntar e resumir o conhecimento científico já publicado sobre o tema investigado. Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, respectivamente, BDNF, SciELO e LILACS; desta maneira as publicações que se encontraram indexadas em mais de uma, foram

selecionadas na primeira busca. Conclui-se que Com base no que foi citado, pode-se observar que grande parte da população, em especial, crianças menores de cinco anos de idade, podem ser colonizados pelo *Streptococcus pneumoniae* ao ser diagnosticados por pneumonia, gerando risco de infecção respiratória e invasivas, algumas vezes mortalidade. O estudo evidencia como fatores de risco, os ambientes, condições precárias, fumo passivo e aglomerações.

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE COMO DIAGNOSTICO DE PNEUMONIAS: FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS

MATINS, Debora Bastos*; BARROS, Geane Lindozo; RAMOS, Dayse Léa Silva; SILVA, karina de Kassia Silva; PEREIRA, Anne Jacqueline de Barros Costa; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; SANTIAGO, Lília de cássia piedade

Curso: Enfermagem

Email: dedeiamenine@hotmail.com

A Pneumonia é uma infecção aguda dos pulmões, é a infecção que mais acomete os pacientes internados, sendo que sua incidência pode variar de 9 a 68%. Pode ser comuns a tipos de pneumonias bacterianas como *Streptococcus pneumoniae* e *Legionella pneumophila*, exceto pela presença de cavitações em um quarto dos casos. O objetivo do estudo é identificar *Streptococcus Pneumoniae* como diagnóstico de pneumonias e quais fatores de riscos associados. Tratou-se de um estudo cuja pesquisa foi de forma integrativa da literatura, com finalidade de juntar e resumir o conhecimento científico já publicado sobre o tema investigado. Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, respectivamente, BDNF, SciELO e LILACS; desta maneira as publicações que se encontraram indexadas em mais de uma, foram selecionadas na primeira busca. Conclui-se que Com base no que foi citado, pode-se observar que grande parte da população, em especial, crianças menores de cinco anos de idade, podem ser colonizados pelo *Streptococcus pneumoniae* ao ser diagnosticados por pneumonia, gerando risco de infecção respiratória e invasivas, algumas vezes mortalidade. O estudo evidencia como fatores de risco, os ambientes, condições precárias, fumo passivo e aglomerações.

TABAGISMO E SUAS PRINCIPAIS REPERCUSSÕES NA SAÚDE BUCAL.

MORAIS, Washington Martins Leal Santos*; FILHO, Remy Rodrigues da Silva; FERNANDES, Raquel Farias Fernandes; MATINS, Rafiza Felix Marão; FERNANDES, Juliana de Kassia Braga.

Curso: Odontologia

Email: was.odonto12@hotmail.com

Introdução: Estudos apontam que a prevalência de uso do tabaco no mundo é alta. Nos países desenvolvidos, o uso do tabaco tem sido apontado como relevante causa de morte. Ademais, pode estar associado a importantes alterações fisiológicas na cavidade oral, que por sua vez, levando a comorbidades que tem sido apontadas na literatura. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura especializada sobre as principais repercussões do uso do tabaco na saúde bucal, bem como os mecanismos que envolvem esta associação. **Revisão:** Foram encontrados 362 estudos. Destes, selecionamos 16 que atendiam aos critérios de inclusão. As principais repercussões orais do uso de nicotina e tabaco foram: câncer bucal, periodontite em diversos graus de severidade, halitose, gengivite, dificuldade de cicatrização tecidual, manchamento dos dentes, língua e mucosa. Também foi encontrada associação com o índice CPOD alto. Os principais mecanismos desencadeadores encontrados foram: redução do fluxo salivar, citotoxicidade do tabaco ao tecido periodontal, diminuição dos anticorpos séricos e salivares. **Conclusão:** A maioria dos estudos encontrou associação entre o tabagismo e alterações na saúde bucal. No entanto, poucos estudos elaboram hipóteses para esta associação. Estes resultados chamam atenção para a importância do acompanhamento odontológico dos tabagistas, bem como a inserção do cirurgião dentista no processo de enfrentamento deste hábito.

TERAPIA DO LUTO, MOMENTO DIFÍCIL DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO

SANTOS, Maria da Graça Pereira*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; NUNES, Josiele Dias; DA SILVA, Paula Rayssa Nogueira; SOUSA, Erica Louzeiros; BOTELHO, Helena Rubia de Santana

Email: josylma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Na literatura observa-se várias concepções da morte, perpassando por diferentes culturas e por década, a morte foi considerada como natural ao ser humano, tranquila e resignada. Durante muitos séculos a vivência de morte ocorria no âmbito familiar, os rituais se davam numa cerimônia pública, de que todos participavam e eram autorizados a expressar os sentimentos pela perda. Passado - se alguns anos, embora a morte fosse vista como cotidiana, também foi percebida como um fracasso do morto em relação à vida, salientando a impotência diante dela. Objetivou-se descrever as possibilidades de intervenção do profissional da psicologia frente ao paciente enlutado. Este trabalho consiste em um estudo de revisão bibliográfica, a partir da leitura de artigos publicados a partir de 2010 sobre a temática em questão. Constatou-se algumas teorias quanto ao processo de luto como: a teoria de Kluber-Ross, existem cinco fases de elaboração do luto, são elas: a negação, a raiva, a barganha, a

depressão e aceitação. Concluiu-se que o profissional de psicologia pode contribuir no processo de elaboração do luto de diversas maneiras, dentro as quais são possíveis destacar: estabelecimento de uma postura empática, para favorecer o acolhimento e vínculo; facilitar na expressão dos sentimentos relacionados à perda; explorar as crenças do paciente enlutado sobre os conceitos de morte; auxiliar através de uma abordagem terapêutica o paciente a buscar novas atividades ou investimentos afetivos, dentre outros. Palavras - chave: Terapia do Luto, Vínculo afetivo, Abordagem terapêutica

TERAPIA DO LUTO: AS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO NO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DA PERDA

Maria da Graça Pereira SANTOS*; DA SILVA, Jozielma Bastos; NUNES, Josiele Dias, DA SILVA; SOUSA, Erica Louzeiros; BOTELHO, Helena Rúbia de Santana.

Curso: Psicologia

Email: gracinhapereira_2007@hotmail.com

Na literatura observa-se várias concepções da morte. Perpassando por diferentes culturas e décadas, a morte foi considerada como natural ao ser humano, tranquila e resignada. Durante muitos séculos a vivência de morte ocorria no âmbito familiar, os rituais se davam numa cerimônia pública, de que todos participavam e eram autorizados a expressar os sentimentos pela perda. Passado - se alguns anos, embora a morte fosse vista como cotidiana, também foi percebida como um fracasso do falecido em relação à vida, salientando a impotência diante dela. Objetivou-se descrever as possibilidades de intervenção do profissional da psicologia frente ao paciente enlutado. Este trabalho consiste em um estudo de revisão bibliográfica, a partir da leitura de artigos publicados a partir de 2010 sobre a temática em questão. Constatou-se algumas teorias quanto ao processo de luto como: a teoria de Kluber-Ross, existem cinco fases de elaboração do luto, são elas: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e aceitação. Concluiu-se que o profissional de psicologia pode contribuir no processo de elaboração do luto de diversas maneiras, dentro as quais são possíveis destacar: estabelecimento de uma postura empática, para favorecer o acolhimento e vínculo; facilitar na expressão dos sentimentos relacionados à perda; explorar as crenças do paciente enlutado sobre os conceitos de morte; auxiliar através de uma abordagem terapêutica o paciente a buscar novas atividades ou investimentos afetivos, dentre outros. Palavras- chave:Terapia do Luto, Vínculo afetivo, Abordagem terapêutica.

TESTES GLICÊMICOS E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

BARROS, Livia Carneiro*; FRANÇA, Thaynara Belo; TORRES, Laíssa Guimarães; VIANA, Ana Karla Saminez; BITENCOURT, Maiza da Silva; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: arymachado@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A glicemia em jejum é um exame que serve para medir o nível de glicose no sangue, referindo-se a amostragem de sangue venoso coletado do paciente, após 8 horas sem se alimentar. Antes do exame é sugerido evitar uso de drogas ilícitas e lícitas, estimulantes, esforços físicos e ingerir medicamentos que possam alterar os resultados. Quando se é identificado Diabetes em um paciente no consultório odontológico, antes do tratamento, o profissional deve encaminhá-lo para um endocrinologista para emissão de um parecer acerca das condições do mesmo. Taxas não cabíveis são de 100 a 125 mg/dl assim, sendo considerado pacientes pré-diabéticos, valores acima de 126 mg/dl já se é considerado diabético. Nesta situação encaminhamos para o Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG), conhecido como "curva glicêmica", a qual consiste em avaliar a capacidade do organismo de processar uma quantidade da glicose no sangue após tomar um líquido açucarado. Ele é realizado em um período em jejum de 12 a 14 horas e no procedimento devemos levar em consideração o histórico do paciente, seguindo as mesmas recomendações do exame de glicemia em jejum. Seu valor de referência deve estar menor que 100 mg/dl e, após 2 hrs da ingestão da glicose, a amostra coletada deve estar até 140 mg/dl. Quando o resultado é maior de 125-200 mg/dl já se é considerado diabetes. O Cirurgião-Dentista tem uma colaboração importante em auxiliar o seu paciente quando detectar sintomas como alta ocorrência de doença periodontal, gengivite e caso o paciente apresentar hálito cetônico, aconselhando-o a fazer o teste para ter conhecimento se ele é portador ou não da diabetes. A partir disso depreende-se que é necessário um controle periódico da doença para um atendimento mais tranquilo e satisfatório para o paciente e o profissional.

TÉCNICAS DE ANESTESIA EM MAXILA E MANDIBULA REVISÃO DE LITERATURA

Santos, Aline Silva dos*; Araujo, Ione Haladiah Gomes; Oliveira, Thais Bezerra Damaceno; Lago, Eulla Pamela do; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos.

Email: alliny_gg@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

Esse trabalho tem o objetivo de, através de uma revisão de literatura, apresentar as técnicas utilizadas para anestesia na maxila e na mandíbula, demonstrando suas vantagens e desvantagens e em qual a situação se deve utilizar cada técnica. Em se tratando de um procedimento na região da maxila existem três formas de injeção de anestésico: infiltração local;

bloqueio de campo e bloqueio de nervo. O que define o uso de cada técnica é a extensão do procedimento. Infiltração local pode ser suficiente para procedimentos de pequeno porte e em pequenas áreas. O bloqueio de campo é indicado quando dois ou três dentes serão restaurados e o bloqueio de nervo é indicado para controle da dor em um quadrante inteiro. Em procedimentos na mandíbula a espessura da lamina óssea é determinante para escolha da técnica. Quando o paciente ainda possui dentição primária anestesia por infiltração ainda é bastante eficiente pois a lamina óssea ainda não é tão espessa. Por outro lado, quando o paciente já possui uma dentição mista, em regra, ocorre um espessamento da lamina óssea e nesse caso infiltração perde eficácia. Técnicas foram desenvolvidas em alternativa ao bloqueio do nervo alveolar inferior tradicional (abordagem de Halsted): Bloqueio do nervo alveolar inferior; Bloqueio do nervo Bucal; Bloqueio do nervo mandibular: técnica de Gow-Gates; Bloqueio mandibular de boca fechada de Vazirani-Akinosi; Bloqueio do nervo mental e Bloqueio do nervo incisivo. Apesar de todas essas técnicas apresentem vantagens em relação à abordagem tradicional de Halsted nenhuma é desprovida de falhas e contraindicações.

TOXINA BOTULÍNICA COMO COADJUVANTE EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS E TERAPÊUTICOS NA ODONTOLOGIA

ROSA, Caroline Sampaio*; DE SANTANA, Mayara Silva; DE ANCHIETA, Nathália Lua Soares; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima;

Curso: Odontologia

Email: casampaiorosa@hotmail.com

Popularmente conhecida como botox, a toxina botulínica é utilizada na odontologia como um recurso estético e terapêutico na resolução de casos de origem odontológica como sorriso gengival, bruxismo e cefaleia. Nos casos de sorriso gengival, é realizada uma pequena aplicação da substância no músculo interno do buço, responsável por tracionar o lábio superior para cima, impedindo que ele suba, mantendo-o no lugar e expondo menos gengiva. Em casos como o bruxismo, a toxina ajuda tanto quem range os dentes como quem os aperta, pois a substância é aplicada de cada lado da face, nos principais músculos da mastigação fazendo com que percam a força excessiva. Ou seja, ela age paralisando o músculo que está em hiperfunção devolvendo seu estado de normalidade. O uso da substância é seguro e não há comprometimento motor da boca. Também pode ser utilizada em disfunção da ATM e dor orofacial. Além de ser muito útil na preparação dos músculos da boca quando se vai receber implantes dentários, pois ajuda no relaxamento da musculatura da mastigação favorecendo a adaptação das próteses dentárias.

TOXINA BOTULÍNICA COMO COADJUVANTE EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS E TERAPÊUTICOS NA ODONTOLOGIA

ROSA, Caroline Sampaio Rosa; SANTANA, Mayara Silva de; ANCHIETA, Nathália Lua Soares de; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: casampaiorosa@hotmail.com

Resumo: Popularmente conhecida como botox, a toxina botulínica é utilizada na odontologia como um recurso estético e terapêutico na resolução de casos de origem odontológica como sorriso gengival, bruxismo e cefaleia. Nos casos de sorriso gengival, é realizada uma pequena aplicação da substância no músculo interno do buço, responsável por tracionar o lábio superior para cima, impedindo que ele suba, mantendo-o no lugar e expondo menos gengiva. Em casos como o bruxismo, a toxina ajuda tanto quem range os dentes como quem os aperta, pois a substância é aplicada de cada lado da face, nos principais músculos da mastigação fazendo com que percam a força excessiva. Ou seja, ela age paralisando o músculo que está em hiperfunção devolvendo seu estado de normalidade. O uso da substância é seguro e não há comprometimento motor da boca. Também pode ser utilizada em disfunção da ATM e dor orofacial. Além de ser muito útil na preparação dos músculos da boca quando se vai receber implantes dentários, pois ajuda no relaxamento da musculatura da mastigação favorecendo a adaptação das próteses dentárias.

TRATAMENTO DA SÍNDROME DE EAGLE

ABREU, Mariana Thais Lima d Silva; COELHO, Vinícios Sousa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Curso: odontologia

Email: rainha_claudiha@hotmail.com

Resumo : A síndrome de Eagle é caracterizada uma dor craniofacial e cervical provocadas devido a ossificação do ligamento estilohióideo ou mesmo por conta da hipertrofia da hapófise estiloide do osso temporal. Sua etiologia ainda é desconhecida, no entanto apresenta uma incidência maior no sexo feminino e sem predisposição para a uni ou bilateralidade. Dor facial, otalgia, cefaleias, disfagia, odinofagia, zumbidos e trismo podem ser sinais indicativos dessa síndrome. Seu diagnóstico é bastante difícil, no entanto ele é eminentemente baseado no exame clínico e de imagem. O estudo de imagem é de suma importância para pesquisa de ossificação anormal do complexo ósteo-ligamentar estilohióideo. O tratamento pode variar de acordo com a severidade da patologia podendo muitas das vezes ser amenizado apenas com o uso de analgésicos. O tratamento cirúrgico para pacientes que apresentem apófise estiloide alongada

com sintomas compatíveis com a síndrome de Eagle é a melhor forma de conduzir estes casos, sendo a via de abordagem que oferece mais segurança e que possibilita uma ressecção mais completa.

TRATAMENTO DA DOR OROFACIAL

JUNIOR, Sérgio Alves Guida Freitas*; NOGUEIRA, Amanda Palmeira Arruda; SILVA, Caroline Araújo; SANTOS, Ângela Gabriela Sousa; LIMA, Sâmara Souza; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Curso: Odontologia

Email: sergio.junior8@hotmail.com

O primeiro passo para que um tratamento seja vantajoso é saber quais são os fatores que estão intimamente relacionados ao surgimento da dor, o tempo em que o indivíduo a sente, para distingui-la em aguda ou crônica, determinar a sua localização e a sua natureza; e essa situação só poderá ser conhecida através da anamnese onde o paciente relatará todo o histórico da doença ao cirurgião-dentista, sendo que esse momento é imprescindível para o diagnóstico da dor. O método de tratamento da dor orofacial, portanto dependerá da situação em que o indivíduo se encontra, para que possa determinar o tipo de plano de intervenção: conservador ou invasivo. Atualmente existem dois tipos de planos de tratamento na odontologia, o primeiro e mais importante é o conservador, o qual sempre visa a preservação do tecido, seja ele ósseo ou tegumentar. Tem-se como exemplos desse tipo de abordagem, o tratamento da neuralgia utilizando a terapia farmacológica por meio de medicamentos como os opióides; outro exemplo muito difundido é o uso da terapia térmica, que faz uso principalmente do frio. Infelizmente nem sempre a abordagem conservadora é possível e quando esse tipo de tratamento não é viável, o cirurgião dentista deve-se optar pelo método invasivo, onde deverá recorrer, por exemplo, à cirurgia ou a injeção de medicamentos via intramuscular ou intrarticular. Dentre os tratamentos de destaque para solução da dor orofacial encontram-se o uso de placas miorrelaxantes, compressas térmicas, psicoterapia, ajustes oclusais, alinhamento ortodôntico, mudança de hábitos alimentares associados à fisioterapia muscular.

TRANSPLANTE DENTAL AUTÓGENO- REVISÃO DE LITERATURA

QUEIROZ, Jefferson De Brito*; CAVALCANTE, Walman Pereira; FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros; SOUZA, Wenny Karolliny Moreira; DOS SANTOS, Rianna Marques; CORRÊA, Silvan; MARQUES, Tarcia Virgínia Falcão

Curso: Odontologia

Email: jeffqueirozodonto@gmail.com

O transplante dental autógeno é definido como uma cirurgia que movimenta um dente que pode estar incluso ou erupcionado de um local para outro, no próprio indivíduo, em alvéolos vazios após extração e/ou que foi preparado cirurgicamente para receber o mesmo. É uma forma de tratamento para repor elementos dentários, quando se tem um dente passível de doação, o transplante pode ser indicada em casos de perda prematura de dente e agenesia dental, tal manobra é influenciada por vários fatores como: idade, tipo de dente a ser transplantado, estágios do desenvolvimento radicular, trauma durante a cirurgia no dente a ser transplantado, armazenamento após remoção e alvéolo receptor. O objetivo deste trabalho é demonstrar através de uma revisão de literatura de trabalhos publicados sobre transplante dental nos últimos anos. Através desta revisão literária pode-se confirmar a eficácia e o sucesso dos transplantes dentais sendo também uma alternativa rápida, segura e econômica para repor as perdas dentárias.

TROMBOCITOPENIA

DA SILVA, Gabriela Barbosa Bezerra*; COELHO, Aline Rocha; SILVA, Maressa Keila de Souza; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; DAMASCENO, Pamela Mouryel Azevedo; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos

Email: gabi-bbs@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

As plaquetas são necessárias para hemostasia e formação do coágulo, sua contagem considerada normal corresponde entre 200.000 e 400.000 /mm³. A trombocitopenia é definida como uma desordem hematológica caracterizada por um número diminuído de plaquetas sanguíneas circulantes, essa diminuição pode ser resultado dos seguintes fatores: produção reduzida, destruição aumentada e sequestro do baço. Clinicamente a mesma só é observada quando os níveis plaquetários estejam menores que 100.000 /mm³, a severidade está intimamente envolvida com a extensão desta redução. Muitas vezes tal condição é inicialmente detectada pela presença de lesões orais: lesões hemorrágicas puntiformes ou petéquias, se uma quantidade maior de sangue é extravasada, então o resultado será uma equimose ou contusão, com quantidades maiores de sangue extravasado, um hematoma se desenvolverá. Portanto é de fundamental importância o conhecimento do cirurgião dentista quanto a esta condição, pois as lesões orais podem ser fundamentais para a descoberta da trombocitopenia.

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS CLÍNICOS.

FURTADO, Thais Sereno*; DOS ANJOS, Bruna Caroline Carlos; DE SOUSA, Janicelma Fernandes; DE CRISTO, Girllayd Reis Da Silva; SOARES, Karla Virginia Bezerra De Castro; ALVES, Cândida Helena Alves

Email: thais_sereno@hotmail.com

Área / Especialidade: Psicologia

A Doença de Parkinson é comumente conhecida por suas manifestações motoras crônicas, progressivas e idiopáticas, sendo a segunda doença neurodegenerativa mais comum na fase do envelhecimento, atingindo de 1 a 2% das pessoas acima de 65 anos. O conhecimento de sua sintomatologia se faz necessário para todos os profissionais da área da saúde, no sentido de contribuir para uma intervenção eficaz que melhore a qualidade de vida daquele que a adquirem. Objetivo: discorrer sobre a doença de Parkinson e seus principais aspectos clínicos com foco nos principais transtornos motores. Método: revisão bibliográfica feita através dos bancos de dados: PUBMED, LILACS e SciELO, com refinamento de abrangência temporal entre os anos de 2010 a 2016. Resultados: De etiologia não esclarecida, a DP possui como fatores predisponentes a herança genética, exposição a neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo, exitoxidade e anormalidade mitocondrial. Em sua fisiopatologia, observa-se diminuição exacerbada de Dopamina, neurotransmissor que age na condução de mensagens entre os neurônios motores, responsáveis diretos na condução de ordem para a realização dos movimentos voluntários e automáticos. Os transtornos motores decorrentes são os tremores em repouso, acinesia ou bradicinesia, rigidez e instabilidade postural, mas para um diagnóstico conclusivo se faz necessária a presença de apenas dois ou três dos principais sinais, o que caracteriza a doença como sindrômica. A terapêutica consiste em uma abordagem multidisciplinar envolvendo intervenção medicamentosa, fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento psicológico. Conclusão: Nos últimos anos não houve avanço efetivo no que diz respeito ao avanço da doença, sendo necessários maiores estudos que contribuam para uma melhor qualidade de vida dos pacientes parkinsonianos. Descritores: Doença de Parkinson: Transtornos De Movimento, Etiologia, Bases De Dados Bibliográficas.

UMA VISÃO EMPÁTICA AOS MORADORES DE RUA

FONSECA, Jéssica Silva*; DE OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes; FARIA, Simony de Sousa

Curso: Psicologia

Email: alessandra.oliveira06@hotmail.com

É preocupante considerar aceitável a situação de pessoas que fazem da rua seu lar, pois seus direitos são sucumbidos e perdem a sua dignidade. Sendo uma problemática não apenas do poder público, mas de toda a sociedade. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, com suas

histórias de vida que merecem ser vistas e acolhidas. O que deveria ser percebido com espanto, por se tratar de um sofrimento de ordem latente, o eu, sozinho, é da verdade uma representação clara de exclusão social, a sombra da invisibilidade. A solidariedade é parte integrante do homem, efetivada através de uma relação empática, congruente. É de suma relevância que a sociedade se organize, com o intuito de lutar pelos direitos de todos, inclusive dos moradores de rua que fazem parte do todo. Dito isso, a Constituição Federal possui um papel importante, pois deve assegurar os direitos básicos de todos os cidadãos. O artigo foi desenvolvido através de consultas da base de dados SCIELO, pesquisas em livros, e outros artigos científicos, publicados entre 2010 e 2016. O presente trabalho possui a finalidade de mobilizar as pessoas, para que desenvolvam consciência do seu poder de mudança e que possam, assim, modificar essa dura realidade dos moradores de rua. É necessário pensar em uma educação que os valores morais se estabeleçam, a partir da troca empática para com o outro, e assim, este seja reconhecido na sua integridade, na condição essencial do ser, desenvolvendo a sua sensibilidade com o próximo.

UTILIZAÇÃO DO LASER NA ODONTOLOGIA: QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO

OLIVEIRA, Tharcisio de Jesus Boaes*; FURTADO, Guilherme Silva; ARAÚJO, Erika Michele dos Santos; RODRIGUES, Fernanda Cristina Nogueira; LÚCIO, Julia Gomes; LAGO, Andréa Dias Neves

Curso: Odontologia

Email: tharcisio.boaes2@outlook.com

Resumo: A terapia com laser na Odontologia é considerada uma opção auxiliar indispensável nos consultórios atuais nas mais diversas especialidades. O laser é uma fonte de luz com diferentes comprimentos de onda que lhe conferem propriedades terapêuticas excelentes. A laserterapia vem sendo utilizada há cerca de 50 anos com lasers de comprimentos de ondas que variam do espectro visível na faixa do vermelho (660nm) até o espectro invisível na faixa do infravermelho (790nm). Este trabalho tem como objetivo avaliar a ação terapêutica do laser de baixa potência nas diversas especialidades odontológicas através de uma revisão de literatura ilustrada com casos clínicos realizados no projeto de extensão “Laser na Odontologia da Universidade Federal do Maranhão”. Esta revisão de literatura foi elaborada a partir de 25 artigos selecionados das bases de dados Scielo, Science Direct, PubMed, Imesh, LILACS no período compreendido entre 2010 e 2016. Foram incluídos trabalhos de pesquisa in vitro e in vivo, assim como relato de caso clínico. Assim, foi possível concluir que o tratamento com laser de baixa potência, conforme a revisão de literatura realizada e os atendimentos clínicos executados, deve seguir protocolos clínicos individuais para cada paciente. É necessário um conhecimento não só da patologia inerente, através de uma detalhada anamnese e exame

clínico, mas também de um conhecimento aprofundado na literatura, visando uma dosimetria adequada para que ocorra o sucesso do tratamento.

VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR E FAMÍLIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ESTILOS PARENTAIS

SILVA, Rebeca do Socorro Nepomuceno Brito*; FRANÇA, Regina Célia Cantanhede; LIMA, Rusiane Brito; SANTOS, Alison Reis; VIANA, Otávio Wellington Rodrigues; LEITE, Zinole Helena Martins.

Curso: Psicologia

Email: becanepomuceno@gmail.com

As condutas educacionais, resultantes dos diferentes estilos parentais, favorecem tanto o desenvolvimento de habilidades sociais importantes para o convívio escolar, como podem ensejar comportamentos tidos como violentos na escola. O presente estudo descritivo e bibliográfico propõe-se analisar a relação entre os estilos parentais e a incidência da violência no contexto escolar. Para a sua realização, procedeu-se leitura e análise de 35 artigos científicos publicados a partir de 1998, considerando as seguintes bases de dados: Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando-se como palavras-chave “Estilos parentais”, “Habilidades sociais”, “Violência nas escolas”. Revisão: Lamborn e cols., Baumrind destacam que pais autoritativos favorecem o desenvolvimento de empatia, atitudes favoráveis a aprendizagem escolar e baixo índice de disfunção comportamental e psicológica. Porém, Weber e Oliveira destacam que pais que adotam o estilo autoritário, geram filhos com poucas habilidades sociais e desempenho escolar moderados. Bolsoni-Silva apontam que filhos de pais negligentes, apresentam os piores índices de ajustamento e rendimento escolares, além de apresentarem tendência a comportamentos antissociais. Para Darling e Mondin, os pais indulgentes predis põem os seus filhos a baixa autoestima e envolvimento em comportamentos agressivos. Conclusão: Assim, verificou-se que, filhos de pais com estilos parentais autoritários, negligentes e permissivos estão mais propensos a envolver-se em comportamentos violentos e de dificuldades de ajustamento social.

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV): EPIDEMIOLOGIA, VIAS DE TRANSMISSÃO, ASPECTOS CLÍNICOS, CARACTERÍSTICAS IMUNOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. REVISÃO DA LITERATURA.

DE MELO, Bruna De Oliveira*; MAIA, Hermerson Sousa; BOMFIM, Maria Rosa Quaresma

Curso: Biomedicina

Email: brunaoliv.96@gmail.com

Desde o diagnóstico das primeiras infecções pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), no início dos anos 80, o vírus se disseminou pelo mundo tornando-se um dos maiores problemas de saúde pública. A AIDS ou Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida é a doença causada pela infecção com o HIV. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2015, foram registrados 2,1 milhões de novos casos de infecções. O HIV pertence à família Retroviridae e gênero Lentivirinae e atua em células do sistema imunológico do hospedeiro provocando a morte destas células, debilitando o sistema imune do indivíduo, deixando-o exposto a diversas infecções por patógenos oportunistas. Diversas formas de transmissão do vírus podem ocorrer, tais como: por relação sexual desprotegida, por transfusão de sangue e hemoderivados, transplante de órgãos, por compartilhamento de agulha entre os usuários de drogas injetáveis, transmissão vertical da mãe para o filho durante a gestação, parto e aleitamento materno. Ocasionalmente, infecções podem acontecer no ambiente de trabalho entre os profissionais da saúde. Este estudo teve como objetivo revisar vários aspectos referentes à patogenia, aspectos clínicos, características imunológicas, epidemiologia, diagnóstico e tratamento das infecções causadas pelo HIV.

PAINEL REVISÃO DE LITERATURA PÓS GRADUAÇÃO

ACUPUNTURA NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PIVATTO, Alanna Rosa Mota Carvalho*; DÓRIA, Ivelaine Da Silva; PITTA, Ana Maria Fernandes; DIAS, Rosane Da Silva.

Email: motaalana@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem integrando às Práticas Integrativas e Complementares (PIC) nas políticas públicas desde 1970, permitindo ampliar o sentido de cuidar na Atenção Primária à Saúde (APS). A acupuntura reuniu-se dentro das PIC, quando em 2006, a portaria 971 foi instituída, regulamentando tais práticas no Sistema Único de Saúde - SUS. No Brasil, as PIC encontram várias dificuldades, entre elas, se destaca a insuficiência de pesquisas, além de poucos especialistas. A pesquisa propõe demonstrar a acupuntura na APS, relacionando facilidades e / ou dificuldades, bem como a aceitação ou rejeição dessa prática pelos usuários por meio de publicações selecionadas em uma revisão sistemática da literatura no Google Scholar, BVS, Scielo e PubMed. A discussão se inicia pela palavra integralidade no campo da saúde, levando a reflexões e configurando uma ação de ampliação na perspectiva de qualificação dos serviços na APS desde a análise situacional até a implantação nas Unidades Básicas de Saúde. O ideal para incluir as PIC dentro da APS é fomentar pesquisas sobre as PIC e inseri-las nos cursos de graduação. A percepção dos usuários sobre a acupuntura é de que ela oferece benefícios não atingíveis na medicina tradicional. As mulheres conhecem mais a acupuntura e a queixa prevalente relatada pelo usuário dessa prática foi a “dor”. Concluiu-se

que a acupuntura nas PIC ocupa um papel crescente legitimação, porém ainda revela inconsistências nos sistemas de informação e limites nas normatizações vigentes.

BASQUETEBOL ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE SÃO LUÍS – MA

ALVES, Thiago Pinheiro*; BATISTA, Gustavo José Sá; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado

Email: thiagotpaufma@gmail.com

Curso: Educação Física

Resumo: O basquetebol é considerado pela Confederação Brasileira de Basquetebol, um esporte com grande ascensão no cenário nacional. No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem do basquetebol, o mesmo pretende desenvolver as capacidades físicas e a aprendizagem das técnicas e estratégias táticas, gerais e específicas, para os alunos/atletas nas fases de iniciação e aperfeiçoamento. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os aspectos relacionados à formação de equipes de basquetebol pelos professores de Educação Física em escolas públicas estaduais em São Luís MA. Trata-se de uma investigação de caráter transversal descritivo de natureza quantitativa. Para a coleta de dados utilizou-se uma entrevista estruturada, direcionada aos professores de Educação Física de escolas públicas, sendo 11 entrevistados, 07 do sexo feminino e 04 do sexo masculino. Observou – se que a maioria dos professores de Educação Física das escolas públicas estaduais de São Luís, pela ausência de espaço físico e materiais, não inclui a modalidade em suas aulas. Os resultados revelam a não inclusão como também a falta de participação das escolas públicas estaduais da cidade de São Luís em eventos esportivos na modalidade basquetebol. Outra questão relevante é a atuação dos professores de Educação Física nesse contexto, por meio do seu tempo de formação, planejamento de suas aulas. Palavras-chave: Basquetebol. Escola. Formação de equipes. Professores de educação física.

CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO HIV EM GESTANTES NO MUNICÍPIO DE CODO-MA NO PERÍODO DE 2010 A 2014

SERRA, Ilana Monteiro Da Silva*; COSTA, Sophia Marta Mendes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar; CORTEZ, Denise Carneiro Machado; PASSOS, Kheila Azevedo Ferreira

Email: denisecortez812@gmail.com

Área/Especialidade: Enfermagem

O HIV/AIDS é uma doença sexualmente transmissível que também possui como meio de transmissão as vias parenteral e vertical. A transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a

gestação, o trabalho de parto e o parto propriamente dito, ou através da amamentação, com risco acrescido de transmissão entre 7% e 22% a cada exposição (mamada). A notificação de casos tem sido a principal estratégia de vigilância da Aids no Brasil. O objetivo do estudo é descrever as características epidemiológicas do HIV em gestantes no município de Codó-MA no período de 2010 a 2014. Trata-se de um estudo com metodologia retrospectiva, documental com abordagem quantitativa dos dados, utilizando-se o sistema SINAN. Foram notificadas 14 gestantes com HIV no período de 2010 a 2014, 42,9% na faixa etária de 26 a 30 anos, 64,3% solteiras, 57,2% tinham o ensino fundamental incompleto, 64,3% tiveram gestação de 37 a 41 semanas, 50% fizeram uso de antirretrovirais profiláticos, e 71,4% tiveram parto do tipo cesariano. A oferta de ARV às gestantes no momento do parto e aos recém-nascidos atinge cifra próxima a 80%, que deve ser ampliada no intuito de erradicar a transmissão vertical. A notificação é fundamental para o desenvolvimento de ações públicas e técnicas no combate a essa patologia com a colaboração dos dirigentes dos órgãos públicos e não públicos para estabelecer políticas de prevenção mais eficazes, reduzindo assim o impacto dessa infecção. Palavras-chave: HIV. Gestantes. AIDS.

CONTRIBUIÇÕES DO MOVIMENTO FEMINISTA PARA O ESTUDO SOBRE A DEFICIÊNCIA

LEITE, Zinole Helena Martins*; MENDES, Vanessa Helena Leite; JANSEM, Vitoria Helena Leite; ARAUJO, Patricia Maria Sombreira;

Email: profzinoleite@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Os movimentos feministas representam uma ruptura paradigmática com uma cultura política autoritária e excludente para as mulheres e outros atores não hegemônicos. Exercem também um questionamento profundo aos pensamentos únicos sobre as relações humanas e os contextos sociopolíticos, econômicos, culturais e sexuais. Esta pesquisa bibliográfica e exploratória objetiva descrever as contribuições do feminismo para os estudos sobre a deficiência. Procedeu-se à análise de livros, dissertações e 15 artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde através das palavras chaves: Feminismo, "Deficiência", "Modelo Social da Deficiência". Foram incluídos artigos completos sobre a temática compreendidos no período de 2007 a 2016. Revisão: Duas concepções de deficiência predominam na comunidade acadêmica, modelos médico e social. O primeiro considera a deficiência um desvio, o segundo destaca que a deficiência é uma leitura social de um corpo com lesão. Ainda que complementares, estes modelos ensejam práticas diferenciadas em relação à participação social de pessoas com deficiência. A inclusão social fundamenta-se no modelo social, cujas vertentes teóricas são: Materialismo histórico e Feminismo. Conclusão:

São incipientes as pesquisas sobre feminismo e deficiência , entretanto estudos nesta área apontam para a necessidade de se incluir no contexto da deficiência temáticas como : gênero , corpo e interdependência , bem como considerar a deficiência como uma condição inerente ao ser humano, devido ao envelhecimento.

DERMATOMIOSITE JUVENIL E ODONTOLOGIA

LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco*; NUNES, Patricia Luciana Serra.

Curso: Odontologia

Email: haddalyz@hotmail.com

A dermatomiosite juvenil (DMJ) é uma doença inflamatória de natureza autoimune que afeta os músculos e a pele de crianças e adolescentes. A etiologia da doença ainda não está totalmente esclarecida, mas acredita-se que seja multifatorial, existindo relação com herança de genes altamente produtores de fator de necrose tumoral ou ainda com alguns fatores infecciosos. Apresenta incidência geral de dois a três casos/milhão de crianças/ano. Existe predominância pelo sexo feminino. O padrão de acometimento da doença é bimodal, com maiores incidências entre os 2 e 5 anos de idade e na adolescência, na faixa entre os 12 e 13 anos de idade. A doença se manifesta sistemicamente de forma frequente através de febre, fadiga, indisposição, anorexia, perda ponderal, atraso de crescimento e irritabilidade, artralguas leves e transitórias. Os músculos acometidos tornam-se dolorosos, edemaciados e rijos. Quanto a manifestações cutâneas é característico o aparecimento de eritemas ao redor dos olhos, nas regiões extensoras dos dedos das mãos, cotovelos, joelhos e tornozelos. Um aspecto relevante evidenciado em pacientes com DMJ é o padrão gengival peculiar, caracterizado por eritema gengival, dilatação capilar e formação arbustiforme em associação com atividade da doença cutânea, sugerindo que a gengiva seja um possível tecido alvo para esta doença. Tais características podem estar presentes em outras regiões da mucosa oral. Pode existir ainda, comprometimento da articulação temporomandibular (ATM), menor expressão facial em razão do comprometimento dos músculos da mímica, assim como o comprometimento de músculos da mastigação e faringe pode resultar em disfagia e disfonia. Pacientes com DMJ também podem apresentar alterações dentárias como raízes curtas, obliteração de canais radiculares, calcificações pulpares e atraso na cronologia de esfoliação dos dentes decíduos. (PAULA,) O tratamento de pacientes com DMJ consiste no controle das manifestações clínicas da doença, ou seja, eliminar a inflamação e restabelecer a força muscular. Envolve a utilização de corticoides, metotrexato e ciclosporina, entre outros, medicamentos esses que sabidamente podem provocar efeitos colaterais com manifestações orais.

MANIFESTAÇÕES ORAIS DA MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO VI: UMA REVISÃO DE LITERATURA

NUNES, Patrícia Luciana Serra*; GONÇALVES, Letícia Machado; LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco; MOFFA, Eduardo Buozi; FERREIRA, Meire Coelho

Email: patriciaserranunes@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A mucopolissacaridose VI ou Síndrome de Maroteaux-Lamy é uma doença metabólica autossômica recessiva rara, que ocorre devido à deficiência da enzima n-acetilgalactosamina-4-sulfatase ou arilsulfatase B, responsável pela degradação dos glicosaminoglicanos sulfato de dermatina e sulfato de condroitina, o que leva o acúmulo dessas substâncias em órgãos e tecidos. É considerada uma doença de depósito lisossomal, pertencendo ao grupo denominado erros inatos do metabolismo. Essa síndrome apresenta alterações orais ainda pouco descritas na literatura, mas que são de grande interesse para Odontologia. O presente trabalho tem por objetivo efetuar uma revisão de literatura sobre as manifestações orais mais comuns da MPS VI. Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo, LILACS e MEDLINE, utilizando as palavras-chaves: oral, dental, mucopolissacaridose VI, nos idiomas português, espanhol e inglês, no período de janeiro de 2015 a agosto de 2016. As manifestações orais mais comuns encontradas foram palato ogival, mordida aberta, dentes impactados e/ou inclusos, espessamento do folículo pericoronário, alterações na articulação temporomandibular, macroglossia e hiperplasia gengival. Apesar da mucopolissacaridose tipo VI ser uma doença rara, torna-se necessário o conhecimento da doença, seus achados bucais mais comuns e os benefícios do seu tratamento para proporcionar a estes pacientes uma qualidade de vida o mais próximo possível da normalidade.

ORTOREXIA: DA ALIMENTAÇÃO À OBSESSÃO

JARDIM, Ana Tamires*; ARAGÃO, Bruna Arruda*; DE SOUSA, Rosangela Maria Lopes*; NASCIMENTO, Joelma Ximenes Prado Teixeira*;

Curso: Nutrição

Categoria: Pós Graduação

Email: a-tamires@hotmail.com

Introdução: A crescente preocupação por ter uma alimentação saudável cresceu nos últimos anos, diferente de um comportamento saudável, a ortorexia se apresenta como uma obsessão. **Revisão:** O percurso metodológico escolhido foi de revisão integrativa utilizando artigos publicados no período de 2006 a 2016, utilizando-se base de dados BIREME, sobre essa temática, sendo incluídos 12 artigos. Um termo considerado novo, pois foi descrito inicialmente em 1997, pelo médico Steve Bratman, como uma obsessão patológica em comer saudável. Os indivíduos

possuem comportamentos exagerados com auto-cuidado, organizados meticulosamente ao despender tempo no planejamento, aquisição, preparo e consumo de alimentos. Conforme descrito pela literatura os grupos mais vulneráveis à ortorexia estão os profissionais da saúde, nutricionistas, médicos e estudantes de medicina. Diferem dos transtornos alimentares, que idealizam o corpo ideal ou imagem corporal, os ortoréxicos se concentram em busca da “alimentação ideal” tida como alimentação pura, onde tudo gira em torno da comida. Caracterizam-se por evitarem certos tipos de alimentos, como açúcar, sal e gorduras e os modificados geneticamente. Devido essas severas restrições alimentares podem apresentar carências nutricionais, além de anemia, osteoporose e desnutrição. Conclusão: O comportamento ortoréxico está associado à obsessão pela alimentação saudável, e não, necessariamente, à preocupação excessiva com a imagem corporal e o estado nutricional. O tratamento requer ajuda multiprofissional, além disso os profissionais da saúde devem estar aptos a identificarem sinais deste comportamento .

RESILIÊNCIA E ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO : RESISTIR, RESSIGNIFICAR E RECOMEÇAR UM NOVO PROJETO DE VIDA

FERREIRA, Isabel Cristina Rezende Carnota*; SAMPAIO, Karen Silva; DE OLIVEIRA, Thelma Mary Araujo; LEITE, Zinole Helena Martins

Email: profzinoleite@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Situações de extrema ameaça á vida psicológica , prescindem de uma qualidade especial para serem superadas através de uma postura resiliente . Não se nasce resiliente, nem se adquire a resiliência “naturalmente” no desenvolvimento: depende de certas qualidades do processo interativos do sujeito com outros seres humanos. Objetiva-se nesta pesquisa bibliográfica e exploratória refletir sobre a importância da resiliência frente a situações de estresse pós-traumático. Analisou-se livros e artigos relacionados ao tema disponíveis nas bases dados virtuais, considerando-se as palavras chaves : Resiliência. Transtorno pós traumático, Estresse. Revisão: A resiliência corresponde a um conjunto de traços de personalidade e capacidades que tornavam invulneráveis as pessoas que vivenciaram experiências traumáticas e não desenvolveram doenças psíquicas . Está presente em diferentes graus nos seres humanos, mas é no meio a tormentos que se revela, ou depois como uma força canalizadora de energia de sofrimento que transforma , restaura e dá impulso para um novo movimento na vida das pessoas , especialmente em situações de estresse pós-traumático. Pessoas resilientes são capazes de vencer as dificuldades e situações traumáticas , retornando à sua homeostase ; encontram soluções criativas para adaptar-se ao seu projeto de vida. A falta de flexibilidade em

situações de traumas e sofrimentos é uma das dificuldades para harmonizar um projeto de vida, é um fator que inibe o desenvolvimento da capacidade resiliente, predispondo a sofrimentos psíquicos. Palavras-chaves: Resiliência. Transtorno pós traumático, Estresse.

SAÚDE PÚBLICA: JUDICIALIZAÇÃO NO MARANHÃO

COSTA, Adriana do Lago Alves*; PITTA, Ana Maria Fernandes

Email: adrilagosluis@gmail.com

Área / Especialidade: Fisioterapia

O presente estudo analisou a judicialização do direito à saúde a partir da construção dos argumentos decisórios do Poder Judiciário maranhense quando da aplicabilidade das políticas públicas de saúde previstas no SUS. A judicialização das políticas públicas de saúde é um fenômeno crescente em todo o país, principalmente após a promulgação da CF/88 que reservou ao Poder público a competência de formular e implementar Políticas Públicas para assegurar o acesso universal e igualitário ao direito à saúde. REVISÃO: A análise conjugada da construção local da temática e a pesquisa jurisprudencial desenvolvida no TJ/MA apontam que os órgãos judiciários do Estado se encontravam numa trincheira ideológica conservadora e que há urgente necessidade de se constituir um diálogo entre os diferentes poderes do Estado. Constatou-se, ainda, que apesar da morosidade e, não raro, ausência de técnica dos profissionais do Judiciário, em razão da especialidade do tema, recorrer aos órgãos judiciais é uma forma eficaz de garantia do direito fundamental a saúde, notadamente, em situações emergenciais. CONCLUSÃO: Ainda existe um longo trajeto para que o Sistema Único de Saúde no Maranhão seja efetivo, eficaz e eficiente para o cidadão maranhense. Entretanto, os julgados do TJ/Maranhão acenam com solicitações de demandas como medicamentos, leitos de UTI e cirurgias, que habitualmente negadas revelam uma rede de atenção frágil que precisa ser fortalecida, para que o direito à saúde não seja exercido tão somente pelo uso do recurso da Judicialização.

TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL E ACUPUNTURA: ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS COMPLEMENTARES NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO NO IDOSO

PIVATTO, Alanna Rosa Mota Carvalho*; MUSSALÉM, Marilourdes Maranhão; PITTA, Ana Maria Fernandes; DIAS, Rosane Da Silva

Email: motaalana@hotmail.com

Área / Especialidade: Psicologia

O Brasil deixará de ser um país jovem e em 2050 se tornará um país de idosos, uma vez que se estima que terá 24% da população nessa condição, podendo alcançar, portanto, uma marca bastante significativa de mudança de perfil da sociedade. O envelhecer humano envolve

aspectos físicos, sociais e psicológicos. A depressão representa hoje uma das doenças com maior incidência na população mundial, o que exige maior atenção na prevenção e nas formas de tratamento. Essa pesquisa tem como objetivo descrever como a Terapia Cognitiva Comportamental - TCC, aliada à acupuntura poderá auxiliar no tratamento da depressão em idosos a partir de uma revisão bibliográfica. O estudo inicia com a contextualização e descrição da depressão como a doença psiquiátrica mais comum entre os idosos e que afeta bruscamente sua qualidade de vida. Evidencia-se a acupuntura como uma terapêutica isenta de toxicidade e contraindicações que pode favorecer a saúde do idoso. Para acupuntura, a depressão está relacionada com desequilíbrios principalmente ligados ao coração. Destaca-se a TCC como uma abordagem diretiva que tem objetivo facilitar a aprendizagem de novos comportamentos e cognições, bem como a generalização destes para o cotidiano do indivíduo. Concluiu-se que o envelhecimento humano envolve uma série de transformações biopsicossociais, tendo como supremacia nessa fase, o aparecimento da depressão, como fator de risco para processos demenciais. E para ampliar as formas de cuidado da depressão do idoso, abre-se a possibilidade de coadunar a acupuntura com a TCC, o que permite construir um novo olhar profissional e terapêutico.

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS CLÍNICOS.

FURTADO, Thais Sereno*; ANJOS, Bruna Caroline Carlos Dos; SOUSA, Janicelma Fernandes De; CRISTO, Girllayd Reis Da Silva De; SOARES, Karla Virginia Bezerra De Castro; ALVES, Cândida Helena.

Email: thais_sereno@hotmail.com

Curso: Psicologia

A Doença de Parkinson é comumente conhecida por suas manifestações motoras crônicas, progressivas e idiopáticas, sendo a segunda doença neurodegenerativa mais comum na fase do envelhecimento, atingindo de 1 a 2% das pessoas acima de 65 anos. O conhecimento de sua sintomatologia se faz necessário para todos os profissionais da área da saúde, no sentido de contribuir para uma intervenção eficaz que melhore a qualidade de vida daquele que a adquirem. Objetivo: discorrer sobre a doença de Parkinson e seus principais aspectos clínicos com foco nos principais transtornos motores. Método: revisão bibliográfica feita através dos bancos de dados: PUBMED, LILACS e SciELO, com refinamento de abrangência temporal entre os anos de 2010 a 2016. Resultados: De etiologia não esclarecida, a DP possui como fatores predisponentes a herança genética, exposição a neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo, exitotoxicidade e anormalidade mitocondrial. Em sua fisiopatologia, observa-se diminuição

exacerbada de Dopamina, neurotransmissor que age na condução de mensagens entre os neurônios motores, responsáveis diretos na condução de ordem para a realização dos movimentos voluntários e automáticos. Os transtornos motores decorrentes são os tremores em repouso, acinesia ou bradicinesia, rigidez e instabilidade postural, mas para um diagnóstico conclusivo se faz necessária a presença de apenas dois ou três dos principais sinais, o que caracteriza a doença como sindrômica. A terapêutica consiste em uma abordagem multidisciplinar envolvendo intervenção medicamentosa, fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento psicológico. Conclusão: Nos últimos anos não houve avanço efetivo no que diz respeito ao avanço da doença, sendo necessários maiores estudos que contribuam para uma melhor qualidade de vida dos pacientes parkinsonianos. Descritores: Doença de Parkinson; Transtornos De Movimento, Etiologia, Bases De Dados Bibliográficas.

ZIKA VÍRUS E O FUTURO DA ODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO AO PACIENTES COM MICROCEFALIA

PEREIRA, Sângela Maria da Silva*; BORBA, Alberto Sabin Moura; FILHO, Etevaldo Matos Maia; MAIA, Claudia de Castro Rizzi; PEREIRA, Cinthya Sacha da Silva; MOFFA, Eduardo Buozi; CARVALHO, Ceci Nunes

Email: sangelamaria@live.com

Área/Especialidade: Odontologia

O Zika Vírus (ZIKV) é um arbovírus, que tem o ácido ribonucleico como seu material genético, pertence a família Flaviviridae e é transmitido principalmente pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*, tendo-se registros também da sua transmissão por fluídos corporais. Desde Maio de 2015 o Brasil enfrenta um surto do vírus, que se espalhou rapidamente pelas Américas causando preocupação devido a possível relação do vírus com a microcefalia, que foi detectada no líquido amniótico e placenta de mulheres com fetos microcéfalos. Os pacientes acometidos com microcefalia possuem um perímetro cefálico inferior à média para o sexo e idade, e na maioria dos casos está associado à estrutura cerebral alterada, problemas de desenvolvimento e características faciais dismórficas, características que afetam não apenas o estado de saúde geral do paciente, mais também o atendimento odontológico, que se torna dificultado devido ao pequeno número de profissionais habilitados para o atendimento a pacientes especiais e ao pouco conhecimento das características craniofaciais e dentárias destes indivíduos. O presente artigo tem como objetivo apresentar as características craniofaciais que influenciam no atendimento odontológico e uma perspectiva sobre o futuro da odontologia no atendimento dos pacientes acometidos com microcefalia.

TEMA LIVRE CASO CLÍNICO GRADUAÇÃO

A UTILIZAÇÃO DE LIVROS LÚDICOS NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS

DA SILVA, Matheus Rodrigues*; SILVA, Mabile Francine

Curso: Fonoaudiologia

Email: matheus.rodrigues18@outlook.com

INTRODUÇÃO: O processo de alfabetização poderia propiciar a possibilidade de descobertas e gerar prazer nos estudantes, no entanto muitas vezes este ambiente acaba sendo desmotivador. A realização de atividades próximas ao cotidiano e a realidade social do estudante pode ser uma mudança de paradigma que pode gerar um progresso nesse processo. **REVISÃO:** Foi realizada uma revisão da literatura acerca do manejo de livros lúdicos para despertar o interesse de criança e o prazer em ler. Esses livros são escolhidos de forma individual ou coletiva levando em conta o ambiente onde estas crianças estão inseridas (se é urbano/rural) para que haja uma melhor compreensão pelas mesmas. As propostas de leitura variam, desde o professor como mediador, até o estudante como um agente participativo na contação de história. A interação e dinâmica também fariam um efeito positivo, com a colocação de estímulos audiovisuais e pausas para que a criança tivesse a possibilidade de comentar e interagir com a história. **CONCLUSÃO:** Os livros ajudariam as crianças a terem uma melhor interpretação e compreensão do texto, letras, palavras e expressões contidas nas historinhas. Por serem livros de contos infantis a linguagem contida neles seria de fácil compreensão e tornaria o processo de alfabetização mais dinâmico, pois com mais interação, que vão além de apenas a leitura ou cópia, o processo de aprendizagem da escrita se tornaria mais prazeroso para as crianças.

AMELOGÊNESE IMPERFEITA: REABILITAÇÃO ESTÉTICA

ABREU, Isabella Mayara Barbosa; MUNIZ, Dayane Nascimento; JESUS, Adriana Santos Malheiros de; TAVARES, Rudys Rodolfo de Jesus

Curso: odontologia

Email: isabella_barbosaa@live.com

Resumo: Amelogênese imperfeita é uma anomalia de caráter hereditário que afeta a formação do esmalte dental em ambas as dentições, decídua e permanente. Geralmente é classificada em hipoplásica, hipocalcificada e hipomaturada. Pacientes portadores de amelogênese imperfeita possuem dentes com alterações de cor e forma da estrutura do esmalte, o que leva a problemas funcionais, ocasionando uma série de transtornos estéticos e psicológicos. Dentre as várias formas de reabilitar estes indivíduos, a utilização de restaurações indiretas adesivas permite excelentes resultados, além de ser menos invasiva. O objetivo do presente caso-clínico é contribuir com a escassa literatura existente sobre este tema, descrevendo a reabilitação de uma paciente portadora de amelogênese imperfeita hipoplásica com laminados cerâmicos. A reabilitação atingiu excelente resultado estético e funcional.

CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC) – RELATO DE CASO

SILVA, Maressa Keila de Souza*; LEÓDIDO, Victor Machado; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos.

Email: mgmaressakeila@gmail.com

Curso: Odontologia

O carcinoma espinocelular, epidermóide ou de células escamosas corresponde a maioria dos casos de câncer de boca, sendo aproximadamente 95% das malignidades orais. Em sua fase inicial o CEC apresenta dor mínima, o que explica a demora pela procura de cuidados, o mesmo pode apresentar-se clinicamente de forma exofítica, endofítica, leucoplásica, eritoplásica, eritroleucoplásica. Os locais mais comuns para o aparecimento do carcinoma na região intraoral correspondem a língua, soalho da boca, palato mole e duro, gengiva, mucosa jugal e labial. O tratamento consiste na excisão da neoplasia, radioterapia ou a associação do procedimento cirúrgico com a radioterapia. Paciente do sexo feminino apresentava aumento de volume na região do palato mole, sendo realizada biopsia incisional chegou-se ao resultado de carcinoma espinocelular, após a obtenção desse diagnóstico foi realizado o procedimento de excisão da malignidade.

CUNHA INTERPROXIMAL: RESOLUÇÃO DE CASO CLÍNICO.

VERAS, Marcela Viégas*; SANTOS, Reginaldo Victor Pereira Dos; JÚNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena De Araújo Castro.

Email: marcela.vgs@hotmail.com

Curso: Odontologia

As cirurgias periodontais pré-protéticas ressectivas são aquelas onde há remoção de tecido gengival, como as cirurgias a retalho e a gengivectomia, onde conseqüentemente, acontece o aumento da coroa clínica do paciente. Tais técnicas cirúrgicas são indicadas para aumentar coroas clínicas curtas, acessar lesões de cárie profundas e subgengivais, expor fraturas radiculares, dentre outras. Essas cirurgias devem ser feitas de forma que respeitem ou até mesmo reestabeçam o espaço biológico, que é a distancia compreendida da margem gengival livre até a crista óssea alveolar, estimada em 3mm. Na prática clínica, podem ser executadas diversas técnicas, utilizando-se de retalhos e até mesmos osteotomias para alcançar tais objetivos. Paciente leucoderma, apresentou-se à clínica da Universidade Ceuma apresentando, no dente 35, uma cavidade, onde o mesmo citou ter acontecido um trauma devido à presença de aparelho ortodôntico. Clinicamente, o dente apresentava restauração provisória, além de o tecido gengival apresentar-se recobrimdo o término da cavidade do elemento dental. Foi indicada a técnica da cunha interproximal. A cirurgia foi realizada a partir de um retalho que possibilitou o acesso ao término da cavidade, para, enfim, reestabelecer as distâncias biológicas. Após o procedimento, espera-se que o tecido gengival reposicione-se em direção apical, expondo o término da cavidade. Com a finalização do tratamento, objetiva-se restabelecer o espaço biológico entre os dentes 35 e 36, possibilitando a atuação do cirurgião-dentista para reabilitar o paciente em suas funções mastigatória e estética.

DISCOPEXIA UMA REALIDADE NO TRATAMENTO DAS DTM'S - RELATO DE CASO CLÍNICO

COSTA, Hugo Costa E*; MOREIRA, Wenny Karollinny; CORRÊA, Silvan; JUNIOR, Antônio José Duarte Ferreira.

Email: hugocostaecosta@hotmail.com

Curso: Odontologia

A discopexia é um procedimento cirúrgico indicado em casos de desordens internas da Articulação Temporomandibular (ATM), do tipo deslocamento de disco sem redução e deslocamento com redução, na qual ocorre uma relação anormal entre o disco articular, o côndilo mandibular e a fossa, o disco não acompanha o movimento condilar, seja na abertura e/ou fechamento da boca. O procedimento cirúrgico consiste no reposicionamento direto do disco articular sobre o côndilo e sua fixação sobre o mesmo com mini âncoras. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente, 32 anos de idade, gênero feminino que compareceu ao serviço de cirurgia com queixa de dor nas ATM's e limitação de abertura bucal. Após a avaliação da anamnese, exame clínico e exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada foi proposto a cirurgia de discopexia bilateral através de acesso pré-auricular.

No Pós-operatório imediato paciente não relatou algias e ao exame clínico apresentava abertura bucal dentro dos padrões de normalidade, devolvendo todos os movimentos mandibulares.

DISPLASIA ÓSSEA: RELATO DE CASO

SANTANA, Hellen Thayane Lemos*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos;

Curso: Odontologia

Email: hellen.thayane@hotmail.com

A Displasia Óssea corresponde a lesões em que o tecido ósseo normal é substituído por tecido fibroso, contendo substância mineralizada, causando crescimento excessivo do osso afetado. É considerada uma patologia benigna, de crescimento lento, congênita e proliferativa. Normalmente são um achado radiográfico, pois na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos. O sinal mais comum é um crescimento gradual e indolor do osso ou região envolvida, causando uma assimetria facial. O caso clínico relatado é de uma paciente diagnosticada com displasia óssea na região esquerda da maxila, o objetivo é apresentar as características clínicas e radiográficas, assim como o tratamento cirúrgico da lesão. Paciente do gênero feminino, 17 anos de idade, foi encaminhada para o serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Clementino Moura. Durante a anamnese, a paciente relatou um aumento pronunciado no lado esquerdo da face, a assimetria facial era bastante sutil clinicamente. Durando exame bucal, observou-se tumefação indolor e imóvel, a coloração da mucosa apresentava-se normal. Na análise da radiografia panorâmica, foi observada imagem radiopaca, unilocular e sem margens delimitadas. O tratamento de escolha foi conservador, por meio de osteoplastia da lesão, devolvendo o máximo possível de simetria facial a paciente. A displasia fibrosa quando acomete ossos gnáticos, na maioria dos casos, pode ser tratada de forma conservadora, necessitando apenas de osteoplastia e acompanhamento clínico e radiográfico.

DOENÇA DE HEACK: RELATO DE CASO

MELO, Natália Costa Oliveira*; AMARAL, Neuza Costa; NEVES, Denise da Silva, DE CARVALHO, Thaylla Sabino Nascimento; PIAZERA Cyrene; VIEIRA, Clarissa Lopes

Curso: Odontologia

Email: nataliamelo.95@hotmail.com

A doença de Heck, é uma enfermidade rara, é conhecida também como hiperplasia epitelial focal, se trata de uma proliferação causada por vírus, que se instala no epitélio escamoso, doença rara e benigna que atinge a mucosa oral de crianças e adultos jovens de variadas regiões do mundo. Apresenta correlação com o papilomavírus humano (HPV) no qual os tipos 13 e 32

têm sido consistentemente detectados nessas lesões. Paciente do sexo feminino, com 10 anos de idade, ao exame clínico, foram observadas lesões bem definidas, arredondadas, planas, localizadas em lábios, a paciente não apresentava problemas sistêmicos e bucais. Foi realizada biópsia excisional da lesão no lábio inferior, após a análise histopatológica foram constatadas alterações epiteliais, como acantose, cristas epiteliais em forma de “taco de golfe” além de células mitosóides. Esses achados foram compatíveis com a hipótese clínica de hiperplasia epitelial focal (doença de Heck). Neste caso foi feito o acompanhamento da paciente para a regressão espontânea. Durante o PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO FOI OBSERVADA A REGRESSÃO DA LESÃO.

ENDOCROWN: UMA ALTERNATIVA PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

MORAES, Bárbara Barros Leite*; GONÇALVES, Letícia Machado;

Curso: Odontologia

Email: barbara.judd@hotmail.com

O endocrown é uma opção de tratamento reabilitador disponível na odontologia atual indicado para dentes severamente destruídos e tratados endodenticamente. A reconstrução da coroa dentária é possibilitada através da ancoragem mecânica e adesivagem na câmara pulpar, eliminando a necessidade da utilização de pinos radiculares. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi relatar, por meio de um caso clínico, o passo a passo da reabilitação protética de um molar superior utilizando a endocrown. Selecionou-se uma paciente na clínica de odontologia da Universidade CEUMA com indicação para reabilitação protética do segundo molar superior direito. Após anamnese e exames complementares, foi verificado que o mesmo apresentava núcleo de preenchimento de resina composta, tratamento endodôntico satisfatório e extensa destruição coronária. Optou-se pela Endocrown devido à rapidez e eficácia clínica em relação aos demais tratamentos possíveis. Foi realizada a análise e seleção da cor dos dentes naturais, moldagem do núcleo de preenchimento e confecção do preparo coronário seguido de moldagem definitiva com silicone de adição. A endocrown foi confeccionada pelo sistema e.MAX/CAD Ivoclar Vivadent. A Endocrown demonstrou-se um tratamento conservador que visa o preparo dentário de acordo com seu remanescente, sendo um tratamento rápido e seguro. Além disso, minimiza o tempo clínico, aumentando o conforto da paciente, restabelecendo forma e função do elemento dental.

FECHAMENTO DE DIASTEMA COM RESTAURAÇÃO DIRETA:RELATO DE CASO CLÍNICO.

LUNA, Melina Vale*; MELO, Natália Costa Oliveira; MORAES, Joelma da cruz Paz; PESSOA, Thalita Fonseca; KUSSANO, Sandro Carvalho.

Curso: Odontologia

Email: melina-luna@hotmail.com

Os diastemas podem ser definidos como espaços maiores que 0,5 mm, presente entre dois ou mais dentes consecutivos, geralmente ocorre entre os incisivos centrais superiores. Podem ser de origem específica, como, distúrbios, hábitos, problemas na erupção, desequilíbrio nas forças de oclusão e até mesmo ter origem genética. A odontologia apresenta diversos tipos de tratamento para os diastemas. São estes: as restaurações diretas com resina composta, as restaurações indiretas, como facetas de porcelana, lentes de contato dentárias, coroas totais e tratamento ortodôntico. O presente estudo relata o caso de um paciente do sexo masculino 33 anos no qual relatou ter feito tratamento ortodôntico em que após alguns anos houve reicidiva do diastemas entre os elementos 11 21. Apresentava manchamento por tetraciclina no qual já fez tratamento clareador. O paciente se interessou em realizar o fechamento do diastema com resina composta pela técnica incremental com concha palatina, será empregada técnica restauradora com guia de silicóna com enceramento prévio do modelo de trabalho simulando a morfologia dental final com a aprovação do enceramento por parte do paciente e das fotos realizadas antes, durante e após o tratamento.

FECHAMENTO DE FÍSTULA BUCO-SINUSAL UTILIZANDO A BOLA DE BICHAT

SILVEIRA, Luíza Carneiro*; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; SILVA, Maressa Keila de Sousa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Email: siveiracluiza@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

Comunicações buco-sinais ocorrem devido à exodontias de dentes superiores posteriores, traumatismo gerado por uso inadequado de instrumentos, destruição do seio maxilar por lesões periapicais e remoção de cistos ou tumores do palato ou seio maxilar. Comunicações passam a ser chamadas fistulas, quando tal canal de acesso entre as cavidades se encontra revestido por tecido epitelial, oriundo da proliferação dos tecidos que circundam. Uma das principais complicações das comunicações é a sinusite maxilar, oriunda da contaminação do seio pela flora bucal. Em casos de fístula buco-sinusal que ocorrem sinusite, é importante que a sinusectomia seja feita anteriormente ao fechamento da comunicação, para que ocorra a eliminação da secreção que está presente e promover a ventilação do seio evitando uma nova infecção. Para o fechamento, a utilização do corpo adiposo bucal (bola de Bichat) tem conquistado espaço na

cirurgia buco-maxilo-facial por ser um procedimento cirúrgico rápido, relativamente simples e com alto índice de sucesso.

FRENULOTOMIA LABIAL SUPERIOR: TERAPIA CIRÚRGICA E MANEJO CLÍNICO.

SANTOS, Reginaldo Victor Pereira dos Santos; VERAS, Marcela Viégas; RODRIGUES, Natália Aguiar; LOPES, Ludmilla Ribeiro; NASCIMENTO, Marcos Vinicius Monteiro do; JUNIOR, José Carlos Elias Mouchrek; NUNES, Livia Helena de Araujo Castro

Curso: odontologia

Email: regisrvps@outlook.com

Resumo: Por definições da literatura já existente, o freio labial é uma prega de tecido mucoso que conecta o lábio superior aos tecidos que recobrem o processo alveolar da maxila. Seu trajeto inicia na face interna do lábio e vai até a linha de junção dos maxilares. O freio labial superior pode possuir várias inserções, como no limite muco-gengival, gengiva inserida e até atravessar a papila incisiva, apresentando-se interpapilar. De acordo com sua inserção, o FLS pode acarretar recessões gengivais, limitação dos movimentos labiais, diastemas, dificuldade de higienização e causar má adaptação de próteses, mostrando que o mesmo pode afetar a estética e harmonia do sorriso e terapêuticas reabilitadoras. Frente a isso, a possibilidade de remoção ou até reposicionamento do freio possibilita um melhor manejo, por parte do profissional, das estruturas envolvidas. Paciente melanoderma, utilizadora de aparelho ortodôntico, apresentou-se a clínica da Universidade Ceuma apresentando diastema na região dos dentes 11 e 21 e posição anômala do FLS. Foi indicado o reposicionamento do freio através da técnica da frenulotomia. A cirurgia foi realizada em dois tempos, no primeiro ocorreu o reposicionamento em si e no segundo foi realizado o retalho para acesso à inserção do freio e posterior remoção. Após o procedimento, o esperado é que o FLS reposicionado não interfira na mecânica ortodôntica, ou na possibilidade de recidiva do diastema anterior. Com a finalização do tratamento, objetiva-se restabelecer a harmonia do sorriso da paciente, possibilitando a atuação do aparelho ortodôntico para o fechamento do diastema.

FRENECTOMIA LINGUAL COM LASER DE ALTA POTÊNCIA

FERREIRA, Odalace Chaves*; PINHEIRO, Amanda Ferreira de Sousa; FERREIRA, Winnie Dandara Rocha; FURTADO, Guilherme Silva; LAGO, Andréa Dias Neves.

Curso: Odontologia

Email: odalace@gmail.com

A indicação de remoção cirúrgica do frênulo lingual ocorre quando os movimentos da língua e as funções de mastigação, deglutição e fonação estão significadamente alteradas. Apesar da

técnica clássica com o uso de bisturi manual ser ainda a mais executada. Atualmente, o laser de alta potência atua como um tratamento alternativo, com capacidade de promover incisões precisas e eficiente controle hemostático reduzindo assim, o tempo cirúrgico e trazendo maior conforto no pós-operatório. Paciente do gênero masculino, 22 anos, procurou o projeto de extensão “Laserterapia na Odontologia” da Universidade Federal do Maranhão, relatando dificuldades de deglutição e fala em função do frênulo lingual curto. Durante o exame clínico foi pedido para o paciente realizar o movimento de protrusão da língua, que resultou em restrições dos movimentos e das funções realizadas por ela. Realizou-se a frenectomia lingual com o laser de diodo de alta potência. O paciente retornou após 2 dias para a realização do protocolo de reparo tecidual com laser de baixa potência, seguindo os parâmetros: 660 nm, 100 mW, 2 J de energia por ponto, por 20 segundos em cada ponto. Foram irradiados 6 pontos nas bordas da cirurgia para acelerar a cicatrização, num total de 3 sessões. O paciente não relatou dor e não apresentou edema pós-cirúrgico. Pode-se concluir que a utilização do laser de alta potência associado ao laser de baixa potência foi eficaz na remoção do freio lingual, redução do edema e cicatrização pós-operatória.

FRENECTOMIA LINGUAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos*; COUTINHO, Matheus Felipe Veloso; SILVA, Maressa Keila De Souza; PINHEIRO, Vanessa Lopes; MORAES, Gabriel Felipe DE Oliveira; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: sidney-12@hotmail.com

O Freio Lingual é considerado uma inserção fibro muscular localizada embaixo da língua e que se insere na parte de trás da gengiva inferior que ainda por razões desconhecidas pode estar inserido e atuando de forma errada. Embora os pacientes possam conviver com essa anomalia, isso pode trazer sérios problemas de fonação, deglutição, além de bullying. Durante a cirurgia no freio da língua, mais conhecida como frenectomia lingual, alguns marcos anatômicos devem ser respeitados, como as artérias linguais, com o objetivo de evitar complicações no ato operatório. Desta forma o objetivo desse trabalho foi relatar um caso clínico de um paciente, elucidando a técnica cirúrgica afim de proporcionar um melhor tratamento.

INTERVENÇÕES PSICANALÍTICAS COM UMA CRIANÇA AUTISTA EM UM ATELIÊ MUSICAL

SOUZA, Marina Batista De*; SOUZA, Karen Regina Pinto; PEREIRA, Maria Do Socorro Dos Santos; PRAZERES, Adrianne; RIBEIRO, Wallyson Martins; SILVA, Mae Soares Da; RODRIGUES, Sandro.

Email: batista.marina@hotmail.com

Curso: Psicologia

Trata-se de um relato de caso clínico realizado durante a pesquisa intitulada “A capacidade de um ateliê musical no enlaçamento de crianças autistas com os outros” Teve por objetivo investigar os efeitos de um ateliê musical como instrumento formador de laço entre crianças autistas e seus semelhantes. Fundamentou-se em pesquisas que, demonstram que existe um aspecto rítmico presente na troca intersubjetiva mãe-bebê, e que este ritmo é fundamental para a estruturação psíquica do sujeito (TREVARTHEN, 2006; STERN, 1992), deste modo, além disso, pesquisas apontam que, crianças autistas mantêm a atenção à dimensão musical preservada. A pesquisa foi realizada no Município de São Luís-MA, através de um ateliê musical semanal, pautado no referencial teórico da Psicanálise com duração de uma hora, no Centro da Infância e Adolescência Maud Mannoni – CIAMM. O ateliê era formado por crianças de dois a quatro anos, de desenvolvimento típico e atípico. Para a operacionalização do ateliê foram utilizados diversos instrumentos musicais. Foram interventores: uma fonoaudiologia e professora de música, alunos do curso de graduação em psicologia da Universidade Ceuma e psicólogas. Concluímos através do estudo de caso clínico realizado com uma criança de três anos, que, mesmo sendo identificada com uma psicopatologias na infância, expressou interesse por uma comunicação musicalizada, que proporciona à ela entrar em uma sintonia afetiva com seus semelhantes. Além disso, a música por seu caráter significativo convida o sujeito a entrar em contato com outro, com sua diferença, alteridade, podendo acessar momentos arcaicos de sua vida psíquica

LINFANGIOMA:RELATO DE CASO

COUTINHO, Matheus Felipe Veloso*; OLIVEIRA, Sidney Henrique Santos; NASCIMENTO, Heney Kayo Lima; PENHA, Ana Thereza Santos; SOUSA, Daniel de Aquino; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Categoria: Graduação

Email: matheuscoutinho60@hotmail.com

Os Linfangiomas são tumores benignos que ocorrem mais comumente na cavidade bucal, cabeça e pescoço. Não têm predileção por raça ou sexo e sua origem pode ser congênita ou de desenvolvimento ao longo da vida. Embora essas lesões tenham tendência a invadir estruturas vizinhas, não têm potencial maligno. O prognóstico para a maior parte dos pacientes com Linfangiomas localizados na língua é bom. Os Linfangiomas podem ser tratados por cirurgia, radioterapia ou através de substâncias esclerosantes, no entanto, possui recidiva em cerca de 10% e 40% dos casos. Esse estudo tem como objetivo relatar um Caso Clínico de Linfangioma

localizado na língua, além de realizar uma revisão de literatura enfocando desde a biópsia aos aspectos clínicos e possibilidades terapêuticas.

MORDIDA ABERTA ANTERIOR: DA ETIOLOGIA A RESOLUÇÃO CLÍNICA.

SANTOS, Reginaldo Victor Pereira dos; VERAS, Marcela Viégas; LIMEIRA, Herick Cruz; BRAMANTE, Fausto Silva; VERCLINO, Célia Regina Maio Pinzan Verclino

Curso: odontologia

Email: regisrvps@outlook.com

Resumo : A mordida aberta anterior (MAA) é uma anomalia na cavidade bucal caracterizada pela falta de contato vertical entre os dentes do arco superior e inferior, um desvio na relação vertical entre os maxilares, sendo tal abertura de diferentes magnitudes que variam de acordo com o paciente. A MAA tem diversas etiologias que acabam interagindo para seu desenvolvimento, como: irrupção incompleta dos dentes anteriores, má posicionamento da língua, interposição labial, hábitos de sucção, deglutição atípica com interposição lingual, respiração bucal e padrão de crescimento vertical. Podem ser classificadas em dentárias, quando envolvem somente os dentes, dentoalveolares, quando acometem dentes e rebordo alveolar e as esqueléticas, que envolvem estruturas ósseas e/ou craniofaciais. Possui uma incidência relativamente alta e pode se manifestar precocemente. Após seu diagnóstico deve ser tratada o mais breve possível, para possibilitar um tratamento mais conservador e com boa estabilidade pós tratamento. Este trabalho tem como objetivo demonstrar essa má oclusão, em paciente de 13 anos de idade, portadora de hábito de sucção de polegar. Foi tratada com grade palatina, aparelho fixo e elásticos verticais. Ao fim devolveu-se a estética dentofacial e a função mastigatória.

PALATOPLASTIA: RELATO DE CASO

SILVEIRA, Luíza Carneiro; JÚNIOR, Marcelo Mesquita Martins; JÚNIOR, Francisco Valcy Moreira de Oliveira; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: silveiracluiza@gmail.com

Resumo: Deformidades craniofaciais são bastante comuns, a fissura palatina é uma das más formações mais comumente encontradas. A fenda palatina é resultante de uma falha na fusão de lâminas palatinas durante a embriogênese. Pacientes com fissuras palatinas necessitam de um tratamento multidisciplinar envolvendo ortodontista, ortopedista, fonoaudiólogo, médico e cirurgião buco-maxilo-facial. O principal objetivo do tratamento cirúrgico é o reestabelecimento

anatômico das formas alteradas, visando o crescimento normal e adequado da região e ainda, o retorno das funções alteradas como fonação, mastigação e deglutição.

PERIODONTITE APICAL CRÔNICA E REABSORÇÃO INTERNA ATÍPICA: RELATO DE CASO CLÍNICO

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Rocha*; MOFFA, Eduardo Buozzi

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

Traumatismos dentários são situações de urgência odontológica desafiantes para o profissional e desagradáveis para o paciente, que necessitam de um atendimento criterioso, porém rápido em algumas situações. De todas as injúrias dentárias, as por luxação são mais comuns, resultando na alteração da condição pulpar com comprometimento do suprimento neurovascular apical da polpa. Já a avulsão ocorre entre 1 a 16%, resulta em ruptura do ligamento periodontal e necrose pulpar. Como consequência dos traumas dentários, podem ocorrer também as reabsorções radiculares externas e internas. O presente trabalho é um relato de caso clínico de trauma dentário acometendo incisivos centrais superiores. Paciente do gênero feminino, 45 anos, procurou atendimento na clínica escola da Universidade Ceuma, queixando-se de escurecimento dentário e com relato de trauma sofrido há 17 anos. Após anamnese constatou-se que a paciente teria realizado o reimplante após avulsão do dente 11 e após exame clínico e imaginológico (panorâmica, periapicais e TC cone beam) diagnosticou-se reabsorção interna no dente 21 e periodontite apical crônica no dente 11. Foram realizados os tratamentos endodônticos dos dentes acometidos pelo trauma e a paciente retornará para acompanhamento clínico-radiográfico para avaliação dos tratamentos.

RANULA MERGULHANTE: RELATO DE CASO

CARDOSO, Lais Ines Silva*, BARBOSA, Saulo De Matos; SOUZA, Ingrid Araújo De Oliveira; DE ASSIS, Diogo Souza Ferreira Rubim

Email: laisinescardoso@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Rânulas são mucocelos que ocorrem em assoalho bucal. A variante clínica incomum dessa lesão, as rânulas mergulhantes, ocorrem quando o extravasamento de mucina dissecar os músculos do assoalho e se estendem para o espaço submandibular. Este trabalho propõe realizar um relato de caso de rânula mergulhante, além de discutir outras modalidades de tratamento disponíveis que podem ser empregadas, em função da apresentação clínica e evolução da lesão. Paciente 11 anos, sexo feminino, leucoderma, apresentou-se ao ambulatório do Hospital Infantil Juvêncio Matos, com aumento de volume indolor em assoalho bucal e região cervical. A lesão tinha

coloração roxa, aspecto cístico, mole a palpação intra-bucal, mas endurecida em região cervical, com 6 meses de evolução. A paciente relata ter feito aspiração do conteúdo líquido, mais de uma vez, em uma unidade de saúde, no entanto a lesão continuou a aumentar de tamanho. Nas imagens de tomografia computadorizada com janela para tecidos moles, observa-se imagem hipodensa de 8 cm, envolvendo os músculos milo-hióideo e gênio-hióideo. Baseado na localização anatômica da lesão, e no fato que esta dissecou os músculos envolvidos na região, o acesso extra-bucal é o de escolha. Com o paciente em decúbito dorsal, e intubação nasotraqueal, por meio de uma incisão submandibular realizou-se o acesso, e em seguida o descolamento para exposição de toda a lesão, sendo removidas também as glândulas salivares relacionadas a ela. Os achados do exame histopatológico confirmaram a hipótese de rânula plunging. Quando a abordagem terapêutica de escolha é a correta, a recidiva é rara.

REANATOMIZAÇÃO DE DENTES ANTERIORES EM RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO CLÍNICO

AQUINO, Ingrid Nayra da Costa*; MAIA, Mariana de Figueiredo Lopes; KUSSANO, Sandro Carvalho

Email: joana.josimar@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A Odontologia vem se modificando e atualizando no que diz respeito a técnicas, procedimentos clínicos e materiais utilizados. Tais avanços tornam possível a satisfação da demanda de diversos públicos, classes sociais e estilos. O uso da resina composta vem sendo difundido tanto em dentes anteriores como posteriores, em procedimentos diretos e indiretos, uma vez que este material tem apresentando características mecânicas e ópticas cada vez melhores. As indicações clínicas não se restringem a restaurações de cavidades acometidas por cárie, sendo também bastante utilizadas para correção de forma anatômica, textura e cor dos dentes. O presente trabalho relata o passo a passo clínico de um procedimento de reanatomização dos dentes 12 ao 22 com resina composta. A paciente apresentava mordida aberta anterior e elemento 22 (incisivo lateral) girovertido. Durante a avaliação clínica, foi constatado que não haveria intercorrências pelo uso da resina composta devido a mínima área de contato, o que permitiu o planejamento de incisivos centrais maiores, reduzindo o espaçamento anterior ocasionado pelo tipo de mordida. Fez-se o uso de enceramento diagnóstico e técnica de mock up, como auxiliares clínicos. O procedimento foi concluído com total satisfação do paciente, restabelecendo função e estética.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO COM GRUPO DE CRIANÇAS COM LESÃO CEREBRAL

PEREIRA, Karine Silva*; SOARES, Juliana Malta; MENESES, Renata Gonçalves; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado.

Email: meneses.renata@gmail.com

Curso: Psicologia

Este estudo relata a experiência vivida por duas acadêmicas do curso de Psicologia pela Universidade Ceuma, em um estágio extracurricular, tendo como cenário um hospital referência em neuroreabilitação na cidade de São Luis-MA. O contexto da reabilitação acontece através da interação social entre os jovens estudantes e as crianças, que por meio da mediação de atividades lúdicas e educativas relacionam-se de forma horizontal, propiciando a aprendizagem de forma colaborativa, utilizando-se da linguagem como ferramenta de apoio, e também o uso dos jogos, brinquedos, computadores e materiais de arte. O objetivo será pontuar estratégias para promover a potencialização do desenvolvimento de crianças com lesão cerebral, através de conexões entre a prática com as crianças e a teoria do desenvolvimento infantil na segunda infância. Trata-se de um relato de experiência embasado teoricamente por revisão bibliográfica. Utilizou-se sete artigos encontrados na base de dados Scielo e Google acadêmico e livros. Sabe-se que as lesões podem trazer consequências no âmbito emocional e cognitivo. A capacidade de organizar o tempo e as atividades, de controlar alguns impulsos para poder realizar e finalizar as atividades propostas passam por esse âmbito cognitivo, o campo das funções executivas. Esse momento estimula as funções executivas, que perpassa o planejamento, a organização e elaboração, até chegar na execução da ação com a ferramenta. Conclui-se que o método utilizado trouxe mudanças significativas às crianças assistidas. Através da mediação e aprendizagem colaborativa, várias funções cognitivas foram estimuladas e potencializadas nessa microcultura, levando em consideração o contexto familiar e social da criança.

RESTABELECIMENTO DA ESTETICA ANTERIOR ATRAVES DA ASSOCIACAO DA TECNICA DO RECONTORNO GENGIVAL E LAMINADOS CERAMICOS

PESSOA, Thalita Fonseca*; MOUCHREK-JUNIOR, José Carlos Elias; GONÇALVES, Letícia Machado;

Curso: Odontologia

Email: thalita_fpessoa@hotmail.com

Atualmente, a aparência está cada vez mais valorizada, por isso, os pacientes estão ainda mais exigentes com a estética. O sorriso é uma das primeiras características observadas. A interação entre especialidades tem se destacado, entre elas a Periodontia e a Prótese. Em busca da correção do sorriso gengival, as cirurgias periodontais vêm sendo procuradas pelos pacientes. Com a Odontologia minimamente invasiva e evolução do sistema adesivo surgiram os laminados cerâmicos, que podem corrigir diversas alterações dentárias, entre elas de forma e cor. A

estética da região anterior da maxila é a mais procurada tanto dos elementos dentários quanto do tecido gengival. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo descrever um relato de caso, onde será empregada a técnica do recontorno gengival e laminados cerâmicos para reanatomizar os elementos dentários do paciente. Palavras chave: Recontorno gengival. Laminados cerâmicos. Odontologia estética

REMOÇÃO CIRÚRGICA DE GRANULOMA PIOGÊNICO: RELATO DE CASO CLÍNICO

MELO, Natália Costa Oliveira*; AMARAL, Neuza Costa; LUNA, Melina Vale; VIEIRA, Clarissa Lopes; CALVET, Clélea de oliveira

Curso: Odontologia

Email: nataliamelo.95@hotmail.com

O granuloma piogênico consiste em uma lesão hiperplásica reacional, frente a agentes irritantes, como cálculo dentário, corpos estranhos e trauma, a lesão pode estar associada também a alterações hormonais. Paciente A.L.M., 65 anos, sexo masculino, apresentou um aumento de volume na região mandibular, relatou o aparecimento da lesão há 16 dias. Ao exame clínico, foi observada uma lesão localizada no processo alveolar da mandíbula por vestibular e lingual entre os dentes 35, 34 e 33, indolor, flácida, séssil de coloração vermelho vivo. Foi requerido o exame histopatológico e peça removida e encaminhada para a análise. A microscopia revelou, através dos cortes histológicos, fragmento de mucosa bucal parcialmente revestido por epitélio estratificado pavimentoso hiperparaqueratinizado e exuberante proliferação de tecido fibrovascular, conclusivo de compatibilidade com granuloma piogênico. Foi feito a remoção do fator etiológico e tratamento cirúrgico conservador, com remoção de toda a base da lesão. A reparação ocorreu satisfatoriamente, durante o período de acompanhamento do paciente não foram notados quaisquer sinais de recidiva da lesão. O granuloma piogênico é uma lesão de natureza não-neoplásica benigna. Um prognóstico favorável irá depender de um correto diagnóstico, tratamento e preservação

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CLASSE III ESQUELÉTICA - RELATO DE CASO CLÍNICO CIRÚRGICO

COSTA, Hugo Costa e*; QUEIROZ, Jefferson de Brito; CORRÊA, Silvan; JUNIOR, Antônio José Duarte Ferreira.

Email: hugocostaecosta@hotmail.com

Curso: Odontologia

A maloclusão de Classe III é relatada como uma desarmonia esquelética facial quando há um hiperdesenvolvimento das maxilas, fazendo com que haja aparência que a mandíbula se faz projetada anteriormente. Quando bem indicado, o tratamento orto cirúrgico torna-se

abordagem ideal para o tratamento desta discrepância em adultos. Neste trabalho aborda-se relato de caso clínico, visando demonstrar que as modificações esqueléticas neste tratamento buscam harmonia dos maxilares e, posteriormente dentária, em uma relação oclusal estável, seguido de uma linha média adequada e, por conseguinte demonstrar que as alterações faciais visam melhorar a estética, no perfil, no sorriso, vedamento labial passivo e relação do lábio inferior com superior adequado. Posteriormente comprovar que nas alterações esqueléticas, pode-se obter equilíbrio entre as bases ósseas e uma melhor relação dos três terços da face.

TREINAMENTO FUNCIONAL EM PACIENTE COM AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL BILATERAL: UM ESTUDO DE CASO

DE OLIVEIRA, Thiago Gonçalves*; CARREIA, Jessica Lange; NASCIMENTO, Alessandro Carlos; BARROS, Mycaelle Castro; CUTRIM, Aracy Machado; DE LIMA, Luana Rodrigues; COSTA, Rute Pires

Curso: Fisioterapia

Email: thiago_goncalves18@hotmail.com

Existem várias causas de amputação, entre elas a traumática, a equipe multidisciplinar deve entrar na vida do amputado logo após amputação. Trata-se de um estudo de caso, 15 anos, sexo masculino, com amputação transfemoral bilateral por trauma, atendido na Clínica Escola Santa Edwiges (APAE/CEST). Foi assinado pelo paciente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O plano de tratamento proposto foi de 25 sessões de treinamento funcional, O paciente foi submetido à testes funcionais e avaliação física pré e pós treino. Realizou-se 25 sessões de treinamento funcional. Os dados obtidos foram analisados através do Microsoft EXCEL 2010. O treinamento funcional mostrou-se eficaz para o paciente quanto aos fatores avaliados, porém ainda requer a necessidade de mais estudos a respeito do treinamento funcional em amputados, visto a grande carência de trabalhos científicos sobre este tema, a fim de incentivar acadêmicos ou profissionais a buscarem novas pesquisas.

VARICOSIDADES SUBLINGUAIS: RELATO DE CASO

MELO, Natália Costa Oliveira*; ALBINO, Laíla da Veiga; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Categoria: Graduação

Curso: Odontologia

Email: nataliamelo.95@hotmail.com

Malformações vasculares podem aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo cabeça e pescoço, caracterizam-se por dilatação e tortuosidade venosa, com aspecto bolhoso de

coloração vermelho escuro ou azulado. Paciente branca, sexo feminino, de 74 anos de idade relatou lesões dolorosas no assoalho da língua. Ao exame clínico, foi observado nódulo sublingual de coloração vermelha e roxo azulado, com sangramento e veias tortuosas e dilatadas. Foram requeridos exames complementares tendo como diagnóstico varizes sublinguais, as quais foram tratadas com Oletato de Etanonalamina 0,05 g/ml, com injeção intralesional, injetada lentamente, as lesões foram comprimidas com gaze de algodão. A paciente foi submetida a seis sessões de escleroterapia em cada sessão com uma semana de intervalo uma da outra. As lesões começaram a desaparecer e obter uma melhora logo após a primeira sessão. Nenhuma ocorrência foi observada após cinco meses.

TEMA LIVRE CASO CLINICO PÓS GRADUAÇÃO

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTE COM PARALISIA FACIAL DE BELL ATENDIDO NO HOSPITAL SOCORRÃO II

MORAIS, Helio Clauber Freitas de*; SOUSA, Alison Cruz de; GASSMANN, Hildenesa; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; AGOSTINHO, Cícero Newton Lemos Felício; COSTA Fábio Santos.

Email: helioclauber@hotmail.com

Curso: Odontologia

A Paralisia facial periférica decorre da interrupção do influxo nervoso de qualquer um dos segmentos do nervo facial. Seu acometimento resulta em paralisia completa ou parcial da mímica facial e pode estar associada a distúrbios da gustação, salivação e lacrimejamento. Em torno de 50% da população acometida por paralisia facial periférica a etiologia é desconhecida. A primeira e maior incidência é a idiopática, ou de Bell, e a segunda, é a traumática, entre outras. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, viroses, gravidez são apontadas com condições associadas. O grau de recuperação da função do nervo facial depende da idade do paciente, do tipo de lesão e da etiologia, nutrição do nervo, comprometimento neuromuscular e terapêutica instituída. A recuperação da lesão do nervo facial pode ocorrer em algumas semanas, até quatro anos. O tratamento requer abordagem medicamentosa, fisioterapêutica. Sendo a fisioterapia indispensável com o intuito de restabelecer o trofismo, a força muscular e a função muscular. O presente trabalho visa descrever a abordagem multidisciplinar (cirurgia bucomaxilo e fisioterapia) em um caso de paralisia facial periférica de Bell em um paciente, atendido no Hospital Socorrão II, São Luís-MA.

BIPROTRUSÃO DENTÁRIA

ALBERTIN, Silvia Américo*; GURGEL, Júlio de Araújo; BRAMANTE, Fausto

Curso: Odontologia

Email: sialbertin@yahoo.com.br

BIPROTRUSÃO DENTÁRIA RESUMO A biprotrusão dentária é caracterizada pela projeção dos dentes anteriores superiores e inferiores em relação às bases ósseas, resultando em protrusão dos lábios e convexidade aumentada da face com conseqüente prejuízo a estética facial. A maioria dos casos de biprotrusão é tratada com extração de quatro pré-molares e retração dos dentes anteriores, possibilitando as mudanças desejadas nos aspectos dentários e dos tecidos moles. É necessário um criterioso planejamento através da análise facial, pois a escolha da exodontia de pré-molares, conduta irreversível, pode também ser indesejável em alguns casos. Uma vez que esta retração produz força igual e oposta nos dentes posteriores, o desafio destes tratamentos consiste em anular estas forças, criando uma ancoragem, que consiste na manutenção dos dentes posteriores em suas posições originais. A introdução dos miniimplantes com esta finalidade, proporciona ao profissional um sistema alternativo de ancoragem. O presente trabalho consiste na apresentação do tratamento de paciente adulta, com biprotrusão, tratada com exodontia de primeiros pré-molares e retração com uso de miniimplantes, restabelecendo a função e melhorando a estética da paciente.

FASCEÍTE NECROSANTE CÉRVICO-FACIAL CAUSADA POR INFECÇÃO ODONTOGÊNICA

DA SILVA, Jéssica Karla Silva*; COSTA, Fábio;

Categoria: PÓS-GRADUAÇÃO

Email: jessicaskarlas@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A fasceíte necrotizante (FN) da região cérvico-facial é uma infecção bacteriana destrutiva e rapidamente progressiva do tecido subcutâneo e fáscia superficial, rara, que acomete, geralmente, os pacientes com doenças que levam à imunossupressão sistêmica. É caracterizada por uma necrose extensa dos tecidos moles, com possível formação de gases nos tecidos subcutâneos, seguida por progressão rápida e potencialmente fatal. Este trabalho tem por objetivo descrever um caso de fasceíte necrotizante com origem odontogênica, enfatizando o diagnóstico, evolução clínica e o tratamento dessa patologia. Paciente do gênero feminino, 23 anos, com histórico de infecção odontogênica evoluindo para um quadro de fasceíte necrosante, sendo tratada por equipe multidisciplinar do Hospital Clementino Moura e realização de desbridamento cirúrgico e antibioticoterapia. A FN facial é uma infecção de progressão rápida e se não tratada, potencialmente fatal, que requer diagnóstico e tratamento adequado e

imediatamente. O tratamento é composto por antibioticoterapia sistêmica, desbridamento cirúrgico e monitoramento intensivo

HODOR! HODOR! HODOR!: UM CASO CLÍNICO DE AFASIA DE BROCA EM GAME OF THRONES

SANTOS, Thiago Filipe Linhares*;

Curso: Psicologia

Email: nzthiago@yahoo.com

Afásias são distúrbios de comunicação que podem se apresentar na dificuldade de fala, leitura, escrita, reconhecimento e/ou compreensão. A afasia de Broca, tem por características mais comuns a manutenção de boa parte da capacidade de compreensão e a pobreza na fluência verbal do indivíduo. Esta forma de afasia é assim denominada por ser causada por lesões, traumas, tumores, infecções ou falta de oxigenação cerebral na área de Broca, localizada no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo cerebral, podendo estender-se para a substância branca subcortical. Este trabalho visa relatar o caso do personagem Wylis, mais conhecido como Hodor, da série de TV Game of Thrones. O paciente estudado é assim reconhecido pelo seu núcleo social, em virtude de repetir a expressão “Hodor” constantemente, em quaisquer situações. Trata-se de um sujeito do sexo masculino, submetido a uma avaliação neuropsicológica baseada na sua história de vida e no acompanhamento e análise da sua dinâmica comportamental ao longo das seis temporadas veiculadas da série. Este trabalho, utiliza-se do método clínico em neuropsicologia com o objetivo de auxílio diagnóstico. Cria-se hipóteses sobre o desencadeador da afasia de Broca no personagem. Conclui-se apresentando vantagens e limitações metodológicas em se realizar um estudo de caso clínico desta maneira.

LAMINADOS CERÂMICOS: UMA ALTERNATIVA PARA REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE MICRODENTES

MORAES, Bárbara Barros Leite*; GONÇALVES, Letícia Machado; FARIAS, David;

Curso: Odontologia

Email: barbara.judd@hotmail.com

Pacientes que apresentam anomalias de tamanho e forma dentária são comuns na prática clínica. Entre elas existem a microdontia, que é o termo utilizado para designar que os dentes são menores que o tamanho normal, podendo se limitar a um único grupo de dentes, ou envolver todos eles. Essa anomalia dentária pode afetar a autoestima, e produzir consequências que seja necessário a intervenção odontológica. Atualmente a constante busca por um sorriso estético e harmônico eleva o nível de exigência e expectativa dos pacientes. As facetas laminadas são um destaque como opção de tratamento para a reabilitação estética por

possuírem procedimentos mais conservadores preservando as estruturas dentais remanescentes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi relatar, por meio de um caso clínico, o passo a passo da reabilitação estética de microdententes anteriores utilizando facetas laminadas cerâmicas.

MÁ OCLUSÃO DE CLASSE III ESQUELÉTICA: CASO CLÍNICO

PEREIRA, Caroline Chavier*; PINZAN, Célia Regina Maio Vercelino; BRAMANTE, Fausto Silva; FERREIRA, Meire Coelho

Curso: Odontologia

Email: carolchavier@hotmail.com

A má oclusão de Classe III é uma alteração dento-esquelética no sentido sagital que se caracteriza por um queixo proeminente. Com uma prevalência média de 3% na população, traz um prejuízo estético de grande significado para sua vida social além da alteração funcional. Pode ser advinda de um maxilar retrognático, de uma mandíbula proeminente ou ainda a associação de ambos. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir um caso clínico de tratamento precoce de paciente portador de má oclusão de Classe III esquelética. O paciente do gênero masculino, 12 anos de idade, no final da dentadura mista, portador de mordida aberta e cruzada anterior, mordida cruzada posterior bilateral e má-oclusão de Classe III de Angle. Foi submetido a tratamento ortopédico interceptor por meio de disjunção com aparelho Hass e mecânica de Classe III e, posteriormente, com aparelho progênico com grade lingual e mentoneira. Após o final da primeira fase de tratamento, foi iniciada a segunda fase por meio do tratamento corretivo. Ao final da terapia, foi alcançado resultados estéticos e funcionais favoráveis e com boa estabilidade pós-tratamento.

MIÍASE EM CAVIDADE BUCAL REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASO

SOUSA, Alison Cruz*; DE MORAIS, Helio Clauber Freitas; AGOSTINHO, Cicero Newton Lemos Felicio; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Email: alisonjc7@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A miíase bucal é a infestação dos tecidos orais por larvas de moscas. É mais comum em países do terceiro mundo, como os da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia, mas podem ocorrer em países desenvolvidos ou em turistas em viagem a países tropicais. A história e características dos pacientes podem incluir: má higiene, pacientes portadores de doenças mentais, hemiplegia, epiléticos, morador de áreas rurais, presença de tecidos necrosados, etilismo, desnutrição, falta de selamento labial, resistência corporal diminuída, respiração bucal, mordida aberta anterior,

infecção dental crônica, extração dental, traumatismos faciais e lesões necróticas. Várias espécies têm sido relacionadas à miíase bucal e no Brasil, a mosca *Cochliomyia hominivorax* é a espécie mais importante. Os sinais e sintomas gerais podem incluir: febre, mialgia, artralgia, hipereosinofilia, reação inflamatória no local da infestação, prurido, dor, tumefação e mobilidade do local. Na boca, o local de prevalência é a área dos dentes superiores anteriores. O aspecto pode variar de pequenas úlceras a grandes destruições de tecido com a presença de larvas. A visualização das larvas no tecido é a chave do diagnóstico e o tratamento baseia-se na remoção dessas e dos tecidos necrosados. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do hospital Dr Clementino Moura (Socorro II), paciente A.R. 81 anos deu entrada no serviço vítima de miíase em cavidade bucal sendo o tratamento cirúrgico para remoção de 42 larvas com anestesia geral.

PACIENTE COM FRATURA MULTIPLAS EM FACE: RELATO DE CASO

JUNIOR, Carlos Farias*, MACIEL, Andreza De Almeida Bastos; AGOSTINHO, Cícero Newton Lemos Felício.

Email: junior.junior123@hotmail.com

Curso: Odontologia

RESUMO As fraturas múltiplas facias (pan faciais) recebem essa denominação quando todos os terços da face apresentam fraturas . O trauma facial pode ser considerado uma das agressões mais devastadoras encontradas em centros de trauma devido às conseqüências emocionais e à possibilidade de deformidade e também ao impacto econômico que tais traumas causam em um sistema de saúde. Nas fraturas panfaciais, também denominadas de fraturas complexas ou múltiplas da face, pelo menos dois dos três terços faciais apresentam fraturas, que com frequência estão associadas a outras lesões sistêmicas as quais necessitam de tratamento primário, protocolo esse que de certa forma prolonga o tratamento definitivo das mesmas. com frequência essas lesões estão relacionadas aos tecidos moles e perdas de estruturas ósseas severas que podem levar a graves deformidades faciais e maloclusão. Devido a ausência de estruturas óssea estáveis, as quais sirvam de arcabouço para a redução das fraturas, esse tratamento é considerado complexo. Sendo assim, várias formas de tratamento vêm sendo propostas, contudo todas são variações das duas abordagens clássicas “de baixo para cima e de dentro para fora” e “de cima para baixo e de fora para dentro”. O objetivo aqui é discutir um caso clinico de fratura pan facial atendido no serviço de urgência e emergencia DR Clementino moura (socorrão 2).

RECONSTRUÇÃO DE MANDIBULA COM ENXERTO DE ILIACO EM PACIENTE COM AMELOBLASTOMA ATENDIDO NO HOSPITAL SOCORRÃO II

MORAIS, Helio Clauber Freitas de*; SOUSA, Alison Cruz de; GASSMANN, Hildenesa; AGOSTINHO, Cícero Newton Lemos Felício; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos.

Email: helioclauber@hotmail.com

Curso: Odontologia

O ameloblastoma é um tumor que acomete os ossos maxilares, sendo composto por epitélio odontogênico, sem a participação de ectomesênquima. É uma neoplasia benigna, que se desenvolve a partir de remanescentes epiteliais da embriogênese dentária. A incidência dos ameloblastomas quanto ao gênero não é conclusiva. Embora muitos autores tenham verificado que sua ocorrência é aproximadamente igual entre homens e mulheres, alguns trabalhos demonstram uma maior predileção para o gênero masculino. Considerando a variável idade e relacionando a com os tipos clínicos, há relatos, na literatura, de que o tipo unicístico acomete pacientes mais jovens, predominantemente na segunda década de vida, o tipo sólido ocorre entre a terceira e a sétima década, e o tipo periférico, em pacientes na quinta década. Contudo, a maioria dos tumores ocorre entre os 20 e 50 anos de idade. Os ameloblastomas geralmente são assintomáticos e descobertos durante exames radiográficos de rotina. Quando se tornam sintomáticos, são percebidos: expansão das corticais ósseas, edema, dor, maloclusão e mobilidade dentária. . O presente trabalho visa descrever a reconstrução mandibular com enxerto de íliaco em paciente com ameloblastoma em um paciente atendido no Hospital Socorrão II, São Luís-MA.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PSICOLOGIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR.

VIEIRA, Ana Paula Alves Vieira*; ROCHA, Jefther Felipe Lima; MIRANDA, Ana Maria Ramos; DE OLIVEIRA, Me. Christianny Valente; GUIMARÃES, Dr. Roberto Mendes;

Curso: Psicologia

Email: jefther.felipe@yahoo.com.br

O presente trabalho objetiva propor uma reflexão acerca da experiência do psicólogo como profissional promotor de saúde no âmbito escolar. Tais reflexões partem a partir de um relato de experiência de estágio realizado em uma escola municipal localizada num bairro carente da capital maranhense. Por meio da investigação qualitativa e de um estudo explanatório, pode-se concluir que o psicólogo inserido no ambiente escolar possui sua atuação limitada pela insipiência tanto dos gestores quanto deles próprios. Assim, espera-se que através da elucidação das possibilidades de atuação do psicólogo, bem como da importância da participação ativa do

profissional de Psicologia no âmbito escolar, este trabalho inspire a atuação, inserção e reconhecimento da profissão psicológica.

TRATAMENTO DE FRATURA DE MANDÍBULA APÓS TENTATIVA DE ESGORJAMENTO: UM RELATO DE CASO

JUNIOR, Carlos Farias*, MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; AGOSTINHO, Cícero Newton Lemos Felício.

Email: junior.junior123@hotmail.com

Curso: Odontologia

RESUMO As lesões do esqueleto maxilofacial que há algumas décadas ocorriam principalmente por acidentes automobilísticos, atualmente, devido à facilidade da aquisição de armamentos tem mudado o seu cenário etiológico. Portanto, as lesões faciais por armas de fogo e arma branca, têm apresentado um papel de destaque nacional e uma alta incidência nos grandes hospitais de trauma. As fraturas faciais, quando não identificadas e tratadas adequadamente, podem levar a graves seqüelas funcionais e estéticas. Este trabalho teve como finalidade de relatar um caso clinico desde a entrada do paciente no a sua finalização no Hospital Clementino Moura de São Luís/MA.

TRATAMENTO DE RÂNULA MERGULHANTE EM PACIENTE PORTADOR DE HIV: RELATO DE CASO

FERRAZ, Rodolfo Adriano Rocha*; AGOSTINHO, Cícero Newton Lemos Felício; MACIEL, Francisco José Lima; BARRETO, Samuel Benson Lima; COSTA, Fabio Santos; MACIEL, Andrezza Bastos;

Curso: Odontologia

Email: rodolferraz@hotmail.com

Rânulas são lesões de etiologia traumática que normalmente desenvolvem-se devido à ruptura de um ou mais ductos das glândulas salivares, resultando num extravasamento ou retenção do muco no assoalho da boca, sendo usualmente unilaterais e relativamente incomuns. As rânulas bilaterais são raras. Duas variedades de rânula já foram descritas: a rânula oral ou superficial e a rânula mergulhante ou cervical. A patogênese exata dessas lesões ainda e incerta. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de rânula oral com evolução para mergulhante, presente e ipsilateralmente, em um adulto portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), como também, o tratamento cirúrgico com finalidade de reduzir a taxa de recidiva da lesão.

USO DE GUIA MULTIFUNCIONAL EM PRÓTESES TOTAIS IMPLANTOSSUPORTADAS

VASCONCELOS, Ana Júlia de Carvalho Vasconcelos; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus;
MALHEIROS, Adriana Santos

Curso: odontologia

Email: anajulia.cvasconcelos@gmail.com

Resumo : O sucesso do tratamento reabilitador com próteses implantossuportadas está diretamente relacionado ao bom posicionamento dos implantes. Guias multifuncionais simplificam os passos da reabilitação em arcadas totais. O seu uso no ato cirúrgico permite ao operador instalar implantes bem posicionados baseando-se na posição da prótese final. Além disso, este mesmo guia facilita a moldagem e registro oclusal, pois predetermina a posição dental ao laboratório, agilizando o tratamento e permitindo a carga imediata ou precoce. Assim, diminui o tempo necessário para a conclusão do tratamento reabilitador e proporciona previsibilidade em grandes reabilitações. O objetivo do presente trabalho é relatar o uso do guia multifuncional em um tratamento reabilitador com uma prótese tipo protocolo suportada sobre 4 implantes na mandíbula. O guia multifuncional foi uma ferramenta essencial para o bom planejamento e execução de diferentes etapas do tratamento, pois a técnica é vantajosa e de fácil execução. Da cirurgia à moldagem e registro, o guia diminuiu o tempo dos procedimentos e permitiu o bom posicionamento da prótese e, conseqüentemente, o sucesso do tratamento.

TEMA LIVRE PESQUISA GRADUAÇÃO

A HIPNOSE COMO MÉTODO AUXILIAR TERAPÊUTICO NA ODONTOPEDIATRIA
DE SANTANA, Mayara Silva*; DE ANCHIETA, Nathália Lua Soares; ROSA, Caroline Sampaio; DO
NASCIMENTO, Luciano Maurício; PASCHAL, Marco Aurélio Benini

Email: mayarasantanan@gmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: De acordo com a Associação Americana de Psicologia, entende-se a hipnose como um estado normal de consciência em que o indivíduo tem maior capacidade de responder a sugestões. Atualmente a hipnose é reconhecida como uma ferramenta de auxílio no tratamento de pacientes em odontopediatria, que não colaboram com o atendimento, pois muitos deles apresentam histórias de traumas, fobias, ansiedades, etc. Além de ajudar na colaboração da criança, a hipnose também é utilizada para diminuição do fluxo salivar no momento do atendimento, no tratamento de pacientes bruxistas ou com outros hábitos bucais, no controle da dor, possuindo também outras finalidades. Desta forma, torna-se viável a utilização da hipnose como método auxiliar terapêutico no tratamento de pacientes pediátricos, a fim de facilitar a sua colaboração para a realização dos diversos procedimentos odontológicos. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura para expor de que maneira a utilização de técnicas hipnóticas podem auxiliar no tratamento de pacientes odontopediátricos.

AS DESIGUALDADES SOCIAIS DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

LOBATO, Alexia Lima; REIS, Caroline; NASCIMENTO, Jéssica; FARIA, Simony

Curso: psicologia

Email: alexia_lelexa@hotmail.com

Resumo: O presente estudo tem como objetivo discutir e problematizar a desigualdade social, sejam eles de que âmbito for, principalmente enfatizando as desigualdades referente à etnia, violência de gênero e deficiências, bem como desmistificar o sentido que esses temas vêm sendo elaborados e construídos ao longo da história da humanidade. Desse modo, o que se pretende é tirar da invisibilidade marginal das pessoas que sofrem com esses estigmas, fornecendo subsídios para que possamos pensar nelas como atores sociais integrados em sociedade civilizada e educada a aceitar e respeitar as diferenças próprias da singularidade de cada um. Assim, nosso propósito é discutir sobre o tema perspectiva multiprofissional, abrangendo outros campos de saberes e enfatizando a psicologia como recurso indispensável para reafirmar a sociedade como lugar de todos. A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa é de caráter qualitativo, através de revisão bibliográfica no período entre 2011 a 2016, utilizando-se de livros, trabalhos científicos, como teses, dissertações, monografias, artigos científicos e de bancos de dados como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico. Diante do exposto, é preciso se pensar que nos aspectos psicossociais das pessoas que vivenciam um mundo desigual, sabendo que no mundo contemporâneo nosso olhar para as singularidades precisa ser holístico de modo a integrar outras práticas de inserção social e modos de pensar, cuidar e acolher as multiplicidades existenciais de cada pessoa, visto que são a partir diferenças que nós crescemos enquanto pessoas no mundo da vida. Palavras-chave: Etnia. Deficiência.

A INVISIBILIDADE SOCIAL SOFRIDA POR MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA

LOBATO, Alexia Lima; SOUSA, Michelly; FARIA, Simony

Curso: psicologia

Email: alexia_lelexa@hotmail.com

Resumo: O presente estudo teve como objetivo compreender os sentimentos de mulheres diante das violências físicas, verbais e psicológicas no contexto doméstico. Evidenciou-se a necessidade de pesquisas prospectivas relacionadas ao tema desse estudo, bem como a importância dos aspectos emocionais das mulheres nesse contexto, já que muitas mulheres violentadas sofrem duplamente, quando são revitimizadas pela invisibilidade social. Desse modo, destaca-se a necessidade de suporte psicológico visando a ressignificação das violências vivenciadas. Essa situação é delicada e complexa, envolvendo questões psicossociais importantes na vida dessas mulheres, da sua família e do meio social a qual são pertencentes. A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa é de caráter qualitativo, através de

revisão bibliográfica no período entre 2011 a 2015, utilizando-se de livros, trabalhos científicos, como teses, dissertações, monografias, artigos científicos e de bancos de dados como Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico, Pepsic e Lilacs. Tendo em vista, a constante interação mente e corpo, ressalta-se a importância do acompanhamento psicológico, tanto quanto a dos aspectos físicos envolvidos no processo de mulheres vítimas de violência doméstica. Diante disso, visualizou-se a necessidade de cuidados psicológicos das mulheres e de sua família, principalmente, na elaboração dos fatos decorrentes das violências. Palavras-chave: Violência. Danos. Invisibilidade. Mulheres.

ANÁLISE FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS HIDROALCOÓLICO; CLOROFÓRMICO DAS CASCAS DA LUHEA GRANDIFLORA

FERREIRA, Gleise Almeida*; ARAÚJO, Aline Lima; FERREIRA, Hevyla Judith Pinto; EVERTON, Karina Araujo; GONZAGA, Laoane Freitas; SALOMÃO, Rondineli Seba; VIANA, Juliane Flavia Cançado

Curso: Farmácia

Email: gleice.ajc@gmail.com

A *Luhea grandiflora*, conhecida popularmente como açoita-cavalo graúdo é uma planta de origem brasileira, sendo sua ocorrência natural a Amazônia até São Paulo. Seus metabólitos secundários da casca dessa espécie têm propriedades para fins terapêuticos populares. O objetivo deste trabalho foi realizar a prospecção fitoquímica da casca da *Luhea grandiflora*. O material vegetal seco (casca) foi comprado no mercado e posteriormente rasurado. Preparou-se o extrato hidroalcoólico (70:30) e em seguida procedeu-se a partição do extrato com clorofórmio, obtendo a fração polar (hidroalcoólico) e a apolar (clorofórmio) do extrato. A prospecção fitoquímica foi realizada através da metodologia proposta por Matos (2009) para as duas frações, sendo os resultados positivos classificados como fraco (+), moderado (++) e forte (+++). Após a prospecção, os constituintes majoritários na fração hidroalcoólica foram os taninos, fenóis e flavonas (+++) e na fração clorofórmica foi o alcaloide (++) . Também foram encontrados alcaloides (++) , flavonóis antocianidinas e saponinas (+), na fração polar e flavonóis taninos e fenóis (+), na fração apolar. Os principais metabólitos trazem interesse terapêutico para a espécie em estudo uma vez que há indicação popular de uso como úlceras, doenças cardíacas, patologias da bexiga, diarreias, reumatismo, má digestão, melena, entres outras patologias. Uma das atividades desses metabólitos é o efeito antioxidantes, inibidores de determinadas enzimas que influenciam negativamente a digestibilidade das proteínas.

ANÁLISE FITOQUÍMICA DOS EXTRATOS HIDROALCÓOLICOS/CLOROFÓRMICO DAS FOLHAS DE STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS

DA SILVA, Camila Roberta Oliveira*; PEREIRA, Danielle Lima; BOGÉA, Fernanda de Jesus; RABELO, Jéssica dos Remédios; SALOMÃO, Rondineli Seba; VIANA, Juliane Flávia Cançado

Categoria: Graduação

Curso: Farmácia

Email: camilarobertaos@gmail.com

O barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*) é uma espécie nativa e endêmica do cerrado brasileiro, conhecida pelas comunidades rurais da região norte do estado de Minas Gerais pelo alto valor medicinal. O valor comercial e industrial do barbatimão está relacionado ao componente majoritário da espécie, o tanino. Determinar presença de constituintes químicos em uma amostra hidroalcóolica das folhas de Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*). O extrato bruto de Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*) foi obtido através do método de maceração utilizando-se álcool 70% como solvente. Foi realizada a partição do extrato, separando em fração polar (hidroalcóolico) e a apolar (clorofórmio) do extrato. A prospecção fitoquímica foi realizada através da metodologia proposta por Matos (2009) para as duas frações, os resultados foram classificados com fracamente (+), moderadamente (++) e fortemente (+++). Após a prospecção os principais metabólitos encontrados na fração polar foram Tanino condensado (+++), Flavonóis (+++), Flavonas (+++) e na fração apolar Tanino Condensado (++) , Flavonóis (+++), Catequinas (+) e Flavonas (+++). Os resultados que foram obtidos a partir da extração das folhas do barbatimão obtiveram a mesma produção de metabólitos secundários que já foram descobertos em outros estudos, tendo o barbatimão potencial para o tratamento de doenças e infecções da pele, queimaduras na pele, úlceras, inchaço e hematomas na pele, dores de garganta, pressão alta, corrimento vaginal, conjuntivite e gastrite.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE UM ADESIVO AUTOCONDICIONANTE EM DENTINA AFETADA POR CÁRIE

MENEZES, Pedro Valdo Lucena*; NUNES, Marilourdes; OLIVEIRA, Bianca Bezerra; BAUER, José Roberto de Oliveira; SILVA, Natyla Maysa de Lima; LEAL, Adriana Mara Araújo; CARNEIRO, Karina Gama Kato.

Curso: Odontologia

Email: iracylucena_adv@hotmail.com

A técnica de Intervenção Minimamente Invasiva está sendo amplamente aceita na prática clínica, a qual tem sido favorecida por novos métodos de remoção parcial do tecido cariado associado ao desenvolvimento dos adesivos autocondicionantes, ferramentas fundamentais na clínica odontológica que favorece a prática de uma odontologia mais conservadora. O objetivo desse estudo foi avaliar a resistência de união (RU) de um sistema adesivo autocondicionante em dentina afetada por cárie. Para isto, o esmalte da superfície oclusal de molares hígidos recém-extraídos foram removidos com um disco diamantado sob irrigação a fim de expor a superfície de dentina. A superfície de dentina dos terceiros molares humanos extraídos foram avaliadas em 2 grupos: (1) Controle – Dentina Sadia (DS); (2) Dentina afetada por cárie (DAC). A união com Single Bond Universal foi seguida por incrementos de resina composta. Após 24 h armazenados em água a 37° C, os dentes foram longitudinalmente seccionados na interface de união para produzir palitos com área adesiva de 1.0 mm², testados com o método de microtração a uma velocidade de 1.0 mm/min. O teste foi realizado após 24 h. O modo de fratura foi avaliado utilizando um estereomicroscópio (40X). Os dados foram analisados por Anova (post hoc Turkey) ($\alpha=0.05$). A dentina hígida apresentou os maiores valores de RU. A maioria das fraturas dos espécimes foi adesiva/mista em todos os grupos testados. Concluiu-se que a adesão a dentina afetada por cárie é inferior a união à dentina hígida.

AVALIAÇÃO DE EVOLUÇÃO DIRETA A SELEÇÃO À VANCOMICINA EM STAPHYLOCOCCUS AUREUS

CARVALHO; Matheus Jose Ferreira*; CARVALHO, Gesanaje Da Paz; SANTOS, Aleff Ricardo; PINTO, Bruna Lorrana dos Santos; MONTEIRO, Andrea de Souza

Curso: Biomedicina

Email: mathyferreira@hotmail.com

O *Staphylococcus aureus* é uma bactéria Gram positiva, que constitui a microbiota normal humana, colonizando a pele e o trato respiratório superior. Entretanto, podem causar infecções de caráter oportunista em pacientes imunocomprometidos. A heterorresistência tem sido evidenciada em linhagens de *S. aureus* isoladas a partir de amostras clínicas. Esse estudo tem como objetivo de avaliar e detectar através de evolução direta a seleção de clones de *S. aureus* resistentes à vancomicina. No estudo foram avaliados isolados de *S. aureus* obtidos de amostras clínicas cedidos pelo laboratório Cedro, situado em São Luis-Ma. Os isolados de *S. aureus* foram crescidos em Agar manitol, para identificação dos isolados. Para realizar a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi utilizada placas de 96 poços com vancomicina. Após identificação dos CIM, foi realizado o teste de evolução direta a seleção, que consiste em obter

clones da linhagem selvagem a partir do isolamento em concentrações crescentes de vancomicina em caldo Mueller-Hinton. As bactérias avaliadas com CIM de 1,0 µg/ml. Nos tubos apresentaram crescimento nas concentrações abaixo e acima do CIM seguintes conseguiu isolar clones bacterianos resistentes acima do CIM (até 8 µg/ml). Ao achar bactérias que conseguem resistir a grande concentração de antibióticos em meio a colônias com pouca resistência mostra que as linhagens de *S. aureus* apresentam um perfil de subpopulações que vêm se tornando resistente à vancomicina, um tipo de antibiótico de primeira escolha para o tratamento de infecções por *S. aureus*, sinalizando um problema de saúde pública com linhagens resistentes.

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE DERIVADOS DA HISTATINA-5 PARA TRATAMENTO DE CANDIDOSE BUCAL

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Rocha*; MOFFA, Eduardo Buozzi

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

O uso contínuo de antifúngicos tópicos e sistêmicos no tratamento convencional de candidose oral tem resultado no aparecimento de cepas resistentes. Por este motivo, novas tecnologias para o desenvolvimento de drogas constitui uma estratégia promissora no campo da biotecnologia. A Histatina 5 é um peptídeo encontrado na saliva humana com forte propriedade fungicida, podendo ser aplicado portanto no tratamento da candidose oral. O presente estudo teve como objetivos determinar a atividade antifúngica da Histatina-5 e dois derivados através do "Killing Assay". Aliquotas de 200µL das suspensões padronizadas de *Candida* (ATCC 90028) foram transferidas para as placas de cultura de 96 orifícios e incubadas por 90 min com diferentes concentrações da proteína. A atividade antifúngica foi realizada através da contagem do número de colônias viáveis. Os testes de citotoxicidade foram realizados sobre fibroblastos através do ensaio de MTT. Os dados foram submetidos à análise de variância com nível de significância de 5%. Nossos resultados indicam que a histatina 5 e seus derivados tiveram comportamento semelhantes durante o ensaio do "Killing Assay", porém os resultados de citotoxicidade indicam que um dos derivados apresentou menor efeito citotóxico em relação aos demais. Dessa forma, nossos resultados demonstram que uma pequena modificação na sequência de aminoácido da histatina 5, pode gerar uma proteína com potencial antifúngico semelhante, porém, menos citotóxica.

ADESÃO AO TRATAMENTO NUTRICIONAL DOS PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA

SOARES, Ester Barbosa*;KZAM, Alia Fares Barbosa; ARAÚJO, Allanne Pereira; SILVA, Gabrielle Vieira da; ; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu; MARTINS, Maylla Luanna Barbosa

Curso: Nutrição

Email: estersoares2008@hotmail.com

Adesão ao tratamento nutricional envolve o aconselhamento nutricional e requer harmonia entre o comportamento do indivíduo e as recomendações do nutricionista. A não adesão tem influência dos fatores sociodemográficos e psicossociais. Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento nutricional dos pacientes adultos atendidos em uma Clínica Escola. Metodologia: Estudo retrospectivo e transversal, realizado com prontuários. Os dados foram referentes as consultas realizadas no ano de 2010 a 2015. Foram coletadas variáveis sociodemográficas e antropométricas. A adesão ao tratamento nutricional foi avaliada de acordo com o número de retorno às consultas: baixa adesão ≤ 2 retornos e boa adesão > 3 retornos. A análise descritiva foi realizada no programa Stata®. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade UNICEUMA (976.916). Resultados: Foram analisados 330 prontuários, 83% do sexo feminino e 33,7% com 40-49 anos. Quanto à escolaridade, 58,3% têm o ensino médio completo e incompleto, 51,3% apresentaram renda de um salário mínimo e 53,6% não vivia com seus companheiros. Em relação ao IMC, 82% estavam com excesso de peso e quando analisada a circunferência da cintura, 86% tinham risco de desenvolver doenças cardiovasculares. A perda de peso (43,6%) foi o principal motivo que os levou a procurarem por um nutricionista e 67,6% retornou as consultas no máximo duas vezes, não aderindo ao tratamento nutricional. Conclusão: Os resultados demonstram a baixa adesão dos pacientes ao tratamento nutricional o que demanda a construção de estratégias conjuntas com paciente, a fim de que haja êxito no acompanhamento, melhorando a qualidade de vida.

ASSOCIAÇÃO ENTRE A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E A CÁRIE DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS: ESTUDO DE CORTE

FERNANDES ,Raquel Farias *; MARTINS, Rafiza Felix Marão; REIS, Waneska Ferreira Cavalcante Albuquerque; FERNANDES, Juliana de Kássia Braga

Curso: Odontologia

Email: raq_farias26@outlook.com

A cárie da primeira infância (CPI) é considerada um problema de saúde pública, sendo mais prevalente em regiões desfavorecidas socioeconomicamente. Esta última condição descreve o fenômeno de polarização da doença. Reconhecendo o município de São Luís como uma unidade

federativa com baixo índice IDH, em relação às demais unidades da federação brasileira, e que a CPI apresenta alta prevalência em regiões com este perfil, o objetivo deste estudo foi testar a hipótese de que a condição socioeconômica está associada a CPI no município de São Luís. Método: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo a partir de uma amostra de 1861 crianças de 12 a 32 meses. As diferenças nas frequências foram estimadas por meio do teste Qui-Quadrado, bem como entre médias por meio do teste de Mann-Whitney. As associações foram estimadas por risco relativo (RR) com intervalos de confiança a 95% (IC95%). Resultados: Dentre as variáveis socioeconômicas avaliadas, a escolaridade materna e a renda familiar apresentaram associação com a CPI, sendo que quanto menor a escolaridade materna e menor a renda familiar, maior o risco a CPI ($P < 0,05$). Conclusão: Os resultados deste estudo confirmam a hipótese testada, evidenciando o cunho socioeconômico da CPI no município de São Luís. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HU/UFMA (parecer nº 223/2009).

AValiação da Atividade Antioxidante da Punica Granatum em Modelo de Sepse Induzida em Camundongos

SOUSA, Nágila Caroline Fialho*; ARAÚJO, Mizaél Calácio; PINHEIRO, Aruanã Joaquim; PINHEIRO, Matheus Costa Rodrigue; NETO, Lídio Gonçalves Lima; DA SILVA, Luís Cláudio Nascimento; FERNANDES, Elizabeth Soares; MENDES, Saulo José Figueiredo;

Curso: Farmácia

Email: nagila-caroline2011@live.com

Introdução: O óxido nítrico (NO) é um gás produzido por células endoteliais, imunes e neuronais. Na sepse, seus níveis aumentam como resultado da ativação das células imunes inatas. Sua produção é essencial para a morte de micro-organismos, mas quando produzido de forma excessiva, contribui para a falência de órgãos. Inibidores da INOS ocasionam proteção na sepse experimental. Porém, níveis reduzidos de NO são associados a aumento de mortalidade. Extratos brutos da casca e frutos da Punica granatum (romã) apresentam ações antimicrobianas e inibem a produção de NO in vitro e in vivo. Este trabalho avaliou os efeitos da fração hexânica (HF) obtida a partir de extrato hidroalcoólico das folhas da romã, na produção sistêmica e peritoneal de NO em camundongos com sepse induzida por perfuração e ligadura do ceco (CLP). Métodos: Camundongos machos C57BL/6 receberam veículo ou HF (100 mg/kg, p.o.), 1h antes da indução da CLP. Animais falso-operados foram utilizados como controle. Após 20h, amostras de sangue foram coletadas e o plasma foi obtido. Amostras de lavado peritoneal (PEFL) foram obtidos por laparotomia. Os níveis de NO foram mensurados pelo ensaio de Griess. Os procedimentos foram realizados sob aprovação pelo CEUA-UNICEUMA. Resultados: A CLP aumentou a produção de NO em amostras de plasma e PEFL quando comparado a animais falso-

operados. O tratamento com a HF reduziu os níveis plasmáticos e peritoneais de NO em animais sépticos, sem afetar animais falso-operados. Conclusão: Sugere-se que a fração HF pode representar uma abordagem terapêutica alternativa para o tratamento de sepse.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE BRAQUETES COLADOS UTILIZANDO DISPOSITIVO SÔNICO

BRASIL, Paloma Dourado*; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; BANDECA, Matheus Coelho;

Curso: Odontologia

Email: palomabrasil07@gmail.com

Os adesivos dentários mais utilizados na Ortodontia são de condicionamento total, embora os adesivos autocondicionantes sejam mais práticos. Este trabalho teve por objetivo testar a hipótese nula de que não existe diferença estatisticamente significativa na força de descolagem dos braquetes ortodônticos usando adesivos autocondicionantes e técnicas de aplicação distintas e compará-los, além de determinar os tipos de fratura ocorridos. Esta pesquisa foi submetida à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA UNICEUMA), aprovada sob o protocolo 418/15. Foram utilizados 40 dentes bovinos e divididos em 4 grupos: : G1A – Sistema autocondicionante de 1 passo com aplicação ativa; G1B – Sistema autocondicionante de 2 passos com aplicação ativa; G2A- Sistema autocondicionante de 1 passo com aplicação sônica; G2B – Sistema autocondicionante de 2 passos com aplicação sônica. Os resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa ($p > 0,05$) entre os grupos G1A e G2A. Entretanto, houve diferença ($p < 0,05$) entre G1B e G2B. A análise do tipo de fratura mostrou que a fratura adesiva mista (A/M) prevaleceu entre os grupos. O grupo do adesivo autocondicionante Clearfil SE Bond utilizando a aplicação sônica foi o que obteve melhor resultado de resistência ao cisalhamento.

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL SUBMÁXIMA DE PACIENTES ASMÁTICOS ATENDIDOS EM UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR

REIS, Irla Nunes*; MORAES, Valkiria Kerlly Almeida; PEREIRA, Lays Amorim Silva; RIBEIRO, Kerly Madeira; PEREIRA, Eugênia Aires; CARVALHO, Laíse Neves; FERREIRA, Patrícia Rodrigues

Curso: Fisioterapia

Email: irlabratz@hotmail.com

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-responsividade brônquica e limitação variável do fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou farmacologicamente. A limitação ao fluxo aéreo promove aprisionamento do ar e hiperinsuflação pulmonar que gera alterações biomecânicas e fraqueza muscular. Essas modificações associadas à sobrecarga do

exercício promovem maior sensação de dispnéia e fadiga podendo comprometer a prática de atividade física nos asmáticos. Uma das conseqüências da inatividade física é a diminuição na tolerância aos esforços, ou seja, na capacidade funcional máxima e submáxima. Este estudo tem como objetivo descrever a capacidade funcional submáxima de pacientes asmáticos atendidos em um programa de reabilitação pulmonar. Tratou-se de um estudo observacional do tipo corte transversal realizado com 16 indivíduos diagnosticados com asma persistente de acordo com a IV Diretrizes Brasileiras de Manejo da Asma. A avaliação da capacidade funcional submáxima foi realizada através do teste de caminhada de seis minutos conforme padronização da American Thoracic Society. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Ceuma com parecer número 539.736 A mediana da distância percorrida no teste de caminhada foi de 475 (155-566), enquanto que a mediana da distância prevista 507 (364-632), sendo essa diferença não significativa ($p = 0,221$). Os indivíduos estudados obtiveram uma capacidade funcional submáxima aquém do predito para os mesmos, que pode ser explicado pelas alterações decorrentes da doença pulmonar conhecida, resultando em um descondicionamento e oxigenação deficiente para os músculos periféricos.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE BRAQUETES ORTODÔNTICOS UTILIZANDO ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES E DISPOSITIVO SÔNICO

BRASIL, Paloma Dourado; KUSSANO, Sandro Carvalho; NOGUEIRA, Rodrigo Proença; CARNEIRO, Karina Gama Kato; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; BANDECA, Matheus Coelho

Curso: odontologia

Email: palomabrasil07@gmail.com

Resumo: O sucesso da colagem de bráquetes é dependente da técnica, material e substrato dental. Os adesivos dentários mais utilizados na Ortodontia são de condicionamento total, embora os adesivos autocondicionantes sejam mais práticos. Este trabalho teve por objetivo testar a hipótese nula de que não existe diferença estatisticamente significativa na força de descolagem dos braquetes ortodônticos usando adesivos autocondicionantes e técnicas de aplicação distintas e compará-los, além de determinar os tipos de fratura ocorridos. Esta pesquisa foi submetida à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA UNICEUMA), aprovada sob o protocolo 418/15. Foram utilizados 40 dentes bovinos e divididos em 4 grupos: G1A – Sistema adesivo autocondicionante de 1 passo Single Bond com aplicação ativa; G1B – Sistema adesivo autocondicionante de 2 passos Clearfil SE Bond com aplicação ativa; G2A- Sistema adesivo autocondicionante de 1 passo Single Bond com aplicação sônica; G2B – Sistema adesivo autocondicionante de 2 passos Clearfil SE Bond com aplicação sônica. Os espécimes foram submetidos ao ensaio mecânico de cisalhamento utilizando velocidade de 0,5 mm/min. Os

resultados demonstraram que não houve diferença estatisticamente significativa ($p > 0,05$) entre os grupos G1A e G2A. Entretanto, houve diferença ($p < 0,05$) entre G1B e G2B. A análise do tipo de fratura mostrou que a fratura adesiva mista (A/M) prevaleceu entre os grupos. O grupo do adesivo autocondicionante Clearfil SE Bond utilizando a aplicação sônica foi o que obteve melhor resultado de resistência ao cisalhamento.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE ASMÁTICOS ATENDIDOS EM UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR

PEREIRA, Eugênia Aires*; REIS, Irla Nunes; NASCIMENTO, Léia Ribeiro; DOS SANTOS, Flávia Milena Silva; Valkiria Kerly Almeida; FERREIRA, Patrícia Rodrigues; CARVALHO, Laíse Carolina

Curso: Fisioterapia

Email: eugeniaapereire@hotmail.com

A asma é uma doença bastante frequente, de alta prevalência e com expressivos índices de morbidade. Tem crescido ultimamente de forma indiscriminada, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. A estimativa é de que 100 a 150 milhões de pessoas no mundo sofram de asma. No Brasil, estima-se que cerca de 10% da população seja afetada pela doença, sendo responsável por quase 400.000 internações hospitalares, mais de 2.000 óbitos e inúmeras assistências ambulatoriais. O objetivo do presente estudo foi descrever as características sociodemográficas de asmáticos atendidos em um programa de reabilitação pulmonar. Trata-se de um estudo observacional, quantitativo de corte transversal realizado no Núcleo de Pesquisa em Reabilitação Funcional da Universidade Ceuma com 16 indivíduos no período de julho e setembro de 2015. Para coleta dos dados foi utilizado um formulário desenvolvido pelo pesquisador responsável. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Ceuma com parecer número 539.736. As variáveis qualitativas são descritas em frequência relativa e percentual e as quantitativas em média e desvio padrão. Dentre os participantes, a idade média foi de 57 ($\pm 12,1$) anos, sendo 87,5% (14) pertencentes ao gênero feminino. Apenas 35,7% (5) são casados e 35,7% (5) solteiros. Segundo o critério de classificação econômica Brasil, 25,0% (4) pertencem a classe C2 e 35,5% (6) a classe D. A maior parte dos pacientes avaliados são mulheres cuja renda familiar é baixa.

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL ATUANTES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO LUÍS

PEREIRA, Ana Carolina Soares*; REIS, Waneska Albuquerque; FERREIRA, Meire Coelho

Email: anacarolinasoaper@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Avaliar características pessoais, atuação profissional e aspectos de formação dos profissionais da saúde representam condição fundamental para a operacionalização e abordagem do processo saúde-doença segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo traçar o perfil dos profissionais de saúde bucal que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) no Município de São Luís (Ma). Realizou-se um censo (Parecer CEP nº 781.129/2014) para avaliar o cumprimento das diretrizes da ESF e Política Nacional de Saúde Bucal em Unidades de Saúde da Família nos diferentes distritos sanitários no ano de 2015 com população de referência constituída por todos os profissionais das equipes de saúde bucal (Cirurgião-Dentista/CD e Auxiliar de Saúde Bucal/ASB). Os resultados evidenciam que 83,3% dos CD's são mulheres enquanto 66,6% dos ASB's são homens. Quanto à idade, 75% dos Cd's atuantes na ESF tem idade superior a 35 anos, enquanto igual percentual representa os ASB's com idade inferior a 35 anos. Considerando a formação específica voltada para atuação na ESF percebeu-se que 83,3% e 33,3% dos CD's e ASB's, respectivamente, apresentam tal requisito. Entretanto 100% dos profissionais relataram não participar das oficinas de educação permanente. Em relação ao tempo de atuação na ESF, 50% de ambos os profissionais atuam há mais de 10 anos. No tocante à satisfação com o trabalho, 66,6% dos CD's e ASB's referiram estar parcialmente satisfeitos. A pesquisa demonstrou a fragilidade da regulação, gestão e formação de políticas de recursos humanos em saúde como componente indissociável da organização dos serviços.

DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE CRECHE COMUNITÁRIA E PARTICULAR

PEREIRA, Eugênia Aires*; MENDONÇA, Ana Carolina Sá; CARVALHO, Laíse Carolina

Curso: Fisioterapia

Email: eugeniaapereira@hotmail.com

A creche é um ambiente importante para o desenvolvimento da criança, porém sabe-se que ambientes diferentes podem apresentar resultados distintos em relação ao desempenho motor fino e grosso das crianças. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar o desenvolvimento motor de crianças de creche comunitária e particular. Trata-se de um estudo analítico, observacional de corte transversal, realizado com 64 crianças de creche comunitária e particular de São Luís – MA. Foram incluídas crianças de 2 a 6 anos, de ambos os gêneros, com 75% de frequência na creche nos últimos meses. As crianças com diagnóstico de alteração neurológica ou motora foram excluídas. Para análise do desenvolvimento motor foi aplicado o teste Denver II. Foi utilizado o Qui-quadrado na comparação do desenvolvimento das crianças de ambas as creches, sendo considerado significativo $p \leq 0,05$. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Ceuma com parecer número 1.570.446. Foi verificado que 80,6%

das crianças da creche particular apresentaram atraso no desenvolvimento motor fino em comparação com 60,6% da creche comunitária ($p = 0,080$). Em relação ao desenvolvimento motor grosso, 45,5% das crianças da creche particular apresentam comprometimento motor e na comunitária, apenas 24,2% ($p=0,078$). Embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significativa entre o atraso das crianças da creche particular e comunitária, verifica-se maior frequência em ambos os aspectos do desenvolvimento motor na creche particular. Em vista disso, sugere-se novos estudos que investiguem a etiologia associada a maior frequência do atraso no ambiente particular.

DESENVOLVIMENTO ATÍPICO E INTERVENÇÃO BASEADA EM ABA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DA CRUZ ,Ingrid Naiany Carvalho *; PEREIRA, Layla Leticia Barbosa; CARNEIRO, Abigail Cunha; LOBATO, Juliana Lima

Curso: Psicologia

Email: inai-any@hotmail.com

O presente trabalho é um relato de experiência de Estágio em Psicologia no Centro de Atendimento dos Pais, Familiares e Amigos de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) – Grupo Ilha Azul. Nossa prática é baseada em um conjunto de atividades e programas de ensino desenvolvidos individualmente para cada criança. A intervenção é baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), que se consiste na aplicação dos princípios da Análise do Comportamento, ciência que busca compreender o ser humano a partir de sua interação com o ambiente. O trabalho desenvolvido tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das crianças, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades que as tornem mais adaptadas aos ambientes em que vivem e lhes proporcionem cada vez mais autonomia. Palavras-chaves: Psicologia, Análise do comportamento Aplicada (ABA), Desenvolvimento atípico

EFEITO AGUDO DO TREINAMENTO RESISTIDO SEM INTERVALOS

SEDANO, Nelson Carneiro Alamino Sedano; SOUSA, Phabullo Rocha de Sousa; ARAÚJO, Ana Eugênia Ribeiro de Araújo e; RIBEIRO, Daniella Alves Flexa Ribeiro; ALMEIDA, Fabiano De Jesus Furtado; GAMBASSI, Bruno bravaresco

Curso: educação física

Email: nelsinhosedano@gmail.com

Resumo: Efeito agudo do treinamento resistido sem intervalos de recuperação sobre a pressão arterial de mulheres idosas sem comorbidades: um estudo piloto

ESCOLA: UM ESPAÇO PARA FORTALECER VÍNCULOS ENTRE PAIS E FILHOS.

BEZERRA, Juliana Trinta Moreira Lopes; OLIVEIRA, Adriana Camila Lima de; CANTANHEDE, Adriana da Paz; CARVALHO, Carlos Montier Barbosa; ALVES, Cândida

Curso: psicologia

Email: camilakiedis@hotmail.com

Resumo: O presente trabalho é fruto de uma experiência realizada numa creche-escola de Educação infantil da Rede Pública do município de São Luís-Ma, com crianças com idade entre 4 e 5 anos. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado com base na fenomenologia que propõe a participação dos pais em rodas de leitura nas salas de aulas mediadas pelas professoras. Percebeu-se nesses grupos que a metodologia aplicada colaborou para que os participantes pudessem compreender formas diferentes de atuar no cotidiano escolar e transformar as relações na escola e na família, construindo formas de se relacionar mais harmônica e significativa que certamente irão contribuir para o processo ensino-aprendizagem. Esse estudo tem como intenção ampliar a importância da presença dos pais nas atividades em sala de aula e constatar quais os impactos dessa vivência nos aspectos cognitivos e afetivos da criança. Para tanto, concluímos que novas técnicas devem ser inseridas dentro do ambiente escolar, propiciando a quebra da rotina da aprendizagem teórico-mecanicista, transformando a escola em um espaço aberto, catalizador de novos recursos voltados para a aprendizagem significativa e qualitativa. Palavras-chave: Escola, estudo qualitativa, família.

ESTABELECIMENTO DE UM PERFIL FACIAL EQUILIBRADO NA PERCEPÇÃO DE LEIGOS E ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CEUMA.

MARCELIANO, Camila*; LIMA, Saulo.

Email: camilamarceliano@bol.com.br

Curso: Odontologia

A procura pela estética facial equilibrada torna-se a cada dia foco de grande importância, a tendência é que a mesma venha a ficar cada vez mais almejada e exigente pelos os que a desejam. Tendo em vista essa busca foi realizado um estudo através de questionários com o objetivo de estabelecer um perfil facial equilibrado através da comparação entre estudantes de odontologia e leigos da universidade Ceuma de ambos os gêneros. Foram aplicados questionários aprovados pelo comitê de ética, gerando um CAAE: 39916914.4.0000.5084 e um parecer: 1.057.343, onde os participantes escolheram dois perfis de 7 (sete) tipos existentes em

cada fileira totalizando 6 fileiras, 3 em cada pagina, colocando 1 e 7 de acordo com a sua preferência, sendo o numero 1 o menos aceito, e o numero 7 sendo o mais aceito. Sabendo que as respostas estarão sendo baseadas no âmbito estético e de atratividade e não em relação a funcionalidade. Para testar se há diferença entre os grupos de participantes da pesquisa na frequência de escolha dos demais perfis faciais, foi realizado um calculo amostral levando em consideração um poder de teste de 90% para detectar um tamanho de efeito de 0,50 com 6 graus de liberdade, empregando o teste QUIQUADRADO com um nível de significância de 0,05. O resultado foi 116 amostras, com 66 para cada grupo, onde, foi definido um perfil de preferencia para leigos e um perfil de preferencia para estudantes de odontologia, e feita a comparação entre os sexos, tendo assim como resultado o perfil mais aceitável e o menos aceitável.

ESTUDO COMPARATIVO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE RESINAS COMPOSTAS ATRAVÉS DE DIFERENTES TÉCNICAS DE POLIMENTO

AQUINO, Ingrid Nayra da Costa; GOMES, Isabella Azevedo; GOMES, Mário Gilson Nina

Curso: odontologia

Email: joana.josimar@hotmail.com

Resumo : Avaliar in vitro a rugosidade superficial de resinas compostas através de diferentes tipos de polimento. Foram selecionados 60 (sessenta) corpos de prova, divididos entre Microparticuladas (Durafill VS) e Nanoparticuladas (Opallis). Os corpos de prova foram tratados de acordo com as condições experimentais: Durafill - G1- resina + discos de lixa Soflex (n=10); G2 - resina + discos de lixa Soflex +Astropol (n=10); G3 - resina + discos de lixa Soflex + Diamond R (n=10). Opallis - G1 - resina + discos de lixa Soflex (n=10); G2 - resina + discos de lixa Soflex +Astropol (n=10); G3 - resina + discos de lixa Soflex + Diamond R (n=10). As medições de rugosidade foram realizadas através de um Rugosímetro. Para cada espécime foi realizado 3 leituras, resultando em um valor médio de rugosidade (μm). Foram calculados os valores médios e desvios padrão da rugosidade para cada tipo de Resina, submetidas aos diferentes tipos de Polimento (Soflex, Soflex + Astropol, Sofrel + Diamont R). Observou-se que, independentemente do tipo de polimento, os valores de rugosidade na resina Durafill foram sempre maiores que os valores da resina Opallis. Em relação ao tipo de polimento, os menores valores foram obtidos com o emprego dos Soflex+Astropol, seguindo pela utilização somente da Soflex. A utilização do Soflex+Diamont R, independentemente do tipo de resina utilizada alcançou valores maiores de rugosidade que as outras técnicas de polimento.

HEMOFILIA: A RELEVANCIA DO DIAGNOSTICO PRE NATAL E ACONCELHAMENTO GENETICO

COSTA, Mariana Santos Costa; ARAÚJO, Thalison Romulo Rocha; SILVA, Queren Hapuque Sousa da; MARTINS, Abia de Jesus; NUNES, Márcio Anderson Sousa Nunes

Curso: biomedicina

Email: romulorraraujo@hotmail.com

Resumo: Introdução: A hemofilia é uma deficiência hereditária, relacionada ao cromossomo X, que ocorre em quase totalidade dos casos, em pessoas do sexo masculino, na qual estes não apresentam alguns fatores de coagulação, gerando assim, hemorragias excessivas. A razão desta patologia estar relacionada ao sexo masculino se dá devido a mutações nos genes que codificam os fatores VIII ou IX, correspondendo respectivamente aos tipo de hemofilia A e B, e está no cromossomo X, sendo assim, os indivíduos do sexo feminino podem portar a patologia, porém, ela não vai se desenvolver, visto que as mulheres possuem dois cromossomos X, podendo o outro, fornecido pelo pai, produzir os fatores de coagulação necessários. Revisão: Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de salientar a relevância do diagnostico pré natal e o aconselhamento genético em gestações nas quais os progenitores possuem a deficiência dos fatores de coagulação. Sabendo que, nesta patologia, a criança gerada, sendo do sexo masculino, pode herdar a condição de hemofílico, entende-se a importância do diagnostico pré natal e o aconselhamento genético, porque, estes, oferecem uma preparação para que a criança tenha uma melhor qualidade de vida. Conclusão: Mais discussões e informações se fazem necessárias a cerca da hemofilia, na busca de elucidações e desmitificação de falsos conceitos, dando maior relevância a investigação antecipada, proporcionando maior expectativa de vida para a criança, bem como qualidade de vida aos portadores da doença.

INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUINEA OCORRIDAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

ALVES, Raissa Pinheiro Lobato*; RODRIGUES, Cianna Nunes; MACHADO, Marcia Cristina Aguiar Mendes; NORONHA, Francisca Maria Pereira; SANTIAGO, Lilia De Cassia Piedade; RODRIGUES, Cianna Nunes; CALAZANS, Dagolberto Araujo Pereira.

Email: raissa_lobato7@hotmail.com

Curso: Enfermagem

As infecções da corrente sanguínea (ICS) assim como outras infecções hospitalares (IHs) constituem um desafio para a saúde e estão entre as mais frequentes IHs ocorridas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), tendo os dispositivos intravasculares como o cateter venoso central (CVC) de curta permanência como sua principal causa. O objetivo desta pesquisa foi estudar as ICS ocorridas em uma UTI. Tratou-se de estudo descritivo, retrospectivo e com abordagem quantitativa de dados, desenvolvido em uma UTI de um hospital público situado no município de São Luís - Maranhão. A população foi composta de 1048 pacientes que estiveram internados

na UIT do referido hospital e que apresentaram ICS. Destes, 50,38% eram do sexo feminino, 33,11% estavam em a faixa etária entre 45 e 64 anos. Foram submetidos ao uso de cateteres ou acessos vasculares 764 pacientes, sendo o CVC de curta permanência o mais utilizado em um total de 118,19%. 33 pacientes desenvolveram ICS, onde ocorreram 18 casos de ICS primária e 15 de ICS relacionadas ao uso de cateter. Entre todos os pacientes internados na UTI em estudo, ocorreram 715 altas, 330 óbitos e 03 pacientes foram referenciados para outra Unidade. Conclui-se nesse estudo que o uso de dispositivos intravasculares como o CVC, apresenta-se como principal fator associado para a ocorrência de ICS. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) DA Universidade CEUMA, autorizando a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por meio do parecer nº539739, de 24 de fevereiro de 2014.

INFECÇÕES URINÁRIAS OCORRIDAS EM PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

CARVALHO, Vivian Aragão*; SOUSA, Jaqueline De Sá; CALAZANS, Dagolberto Pereira Araújo; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; RODRIGUES, Cianna Nunes; SANTIAGO, Lilia De Cássia Piedade.

Email: vivslevita@outlook.com

Curso: Enfermagem

As infecções em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) correspondem a um fator importante na melhora ou piora do estado e no tempo de permanência dos pacientes, e as infecções do trato urinário (ITU) tem um papel relevante neste contexto, uma vez que corresponde a terceira maior causa de infecções nessas unidades. O presente estudo teve como objetivo, analisar os casos de infecções urinárias em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público em São Luís/MA. Tratou-se de um estudo descritivo, retrospectivo e com abordagem quantitativa de dados. A população constituiu-se de 1048 pacientes, de ambos os sexos e com diferentes faixas etárias, que estiveram internados na referida unidade no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Os resultados demonstraram que destes pacientes, 50,38% eram do sexo feminino; 33,14% estavam na faixa etária de 45 a 64 anos. Foi observado que 87,59% dos pacientes fizeram uso de cateter vesical (CV); identificou-se 21 casos de infecções urinárias e destes, 85,72% foram em pacientes que fizeram uso de CV. Comprovada a íntima relação entre cateterização vesical e ITU é necessário que se cumpra todas as recomendações, tanto na indicação da sondagem, como na técnica de colocação, cuidados e tempo de permanência do cateter, para que esse procedimento não sirva de porta de entrada

para microrganismos. O estudo foi realizado mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA, sob o parecer nº 539739 de 24 de fevereiro de 2014.

INTERVENÇÃO MUSICAL NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS COM AUTISMO

PEREIRA, Maria do Socorro dos Santos*; DE SOUZA, Mariana Batista; PRASERES, Adrienne Fernandes; RODRIGUES, Sandro Eduardo; SOUSA, Karen Regina Pinto; TAVARES, Alexandra Avelar; DA SILVA, Mae Soares

Curso: Psicologia

Email: mariadosocorro1867@hotmail.com

O “Mix Musical” é um ateliê que se utiliza de elementos da música como o ritmo e o intervalo, na intervenção de crianças diagnosticadas com autismo ou que apresentem algum aspecto de desenvolvimento atípico. O sujeito humano se constitui no encontro com o outro, marcado pelo ritmo que é fundamental para a estruturação psíquica. Pesquisas (STERN, 1992; TREVARTHEN, 1999) apontam uma dimensão rítmica presente nas trocas da relação entre mãe e bebê. Na perspectiva psicanalítica, o desenvolvimento da subjetividade é pensado a partir da condição do sujeito desejante, o que se dá através do encontro do seu corpo com a linguagem. O ateliê musical objetiva potencializar o desenvolvimento da linguagem e do laço social dessas crianças. O “Mix Musical” foi utilizado na coleta de dados da pesquisa “Os efeitos do ritmo como função de estruturação psíquica em crianças com TID” realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise na Infância da Universidade CEUMA, durante os anos de 2014-2015 no município de São Luís-MA. Aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da mesma Instituição sob o parecer de nº 766.726, desenvolvido por uma equipe multiprofissional. Propomos por meio deste trabalho a criação de ateliês que utilizem a intervenção musical para promover o desenvolvimento da linguagem e do laço social de crianças autistas nos Centros de Atenção Psicossocial voltados para crianças e adolescentes (CAPSi). A intervenção musical encaixa-se às demandas presentes na clínica do autismo, e viável a implantação na rede pública de saúde pelos baixos custos e pela existência de uma equipe multiprofissional especializada.

INTERVENÇÃO PSICANALÍTICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO ATÍPICO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PRASERES, Adrienne Fernandes*; SOUSA, Karen Regina Pinto; DE SOUZA, Marina Batista; PEREIRA, Maria do Socorro dos Santos; RODRIGUES, Sandro Eduardo; SILVA, Mae Soares da; TAVARES, Alexandra Avelar

Curso: Psicologia

Email: adriannefernamdesp@gmail.com

Estudos realizados acerca da sintonia afetiva presente na interação mãe-bebê apontam que neste fenômeno operam mecanismos que se assemelham a conceitos musicais, como: intensidade e tempo (STERN, 1992; TREVARTHEN, 1999). A existência de uma dimensão musical anterior às palavras aponta para a música como instrumento de intervenção sobre o desenvolvimento infantil. Esta proposta baseia-se nos resultados da pesquisa “Efeitos do Ritmo como Função de Estruturação Psíquica em Crianças com TID”, realizada entre 2014-2015 no Município de São Luís-MA, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ceuma, parecer nº 766.726. Nesta pesquisa, crianças com desenvolvimento típico e atípico eram convidadas a participar de um ateliê musical, composto por uma equipe multidisciplinar. Foram utilizadas teorias e técnicas psicanalíticas como fundamentação para a intervenção e a noção do ritmo como fundamental para a estruturação psíquica. Os resultados confirmaram que a música pode ser utilizada como instrumento de intervenção, proporcionando reviver momentos arcaicos do desenvolvimento e provocando efeitos terapêuticos que permitem o desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais e enlace com o outro. Propõe-se a implementação deste formato de ateliê no contexto da Atenção Básica em Saúde (ABS), coordenado por profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e combinado ao acompanhamento da puericultura, voltado para crianças identificadas pela equipe de Saúde da Família com menor comprometimento no desenvolvimento. Entende-se que este modelo de intervenção pode contribuir significativamente para a qualidade da assistência a esse público, especialmente por não exigir grandes recursos materiais e ser facilmente executada no contexto comunitário. Palavras-Chave: Intervenção Psicanalítica, Ateliê Musical, Desenvolvimento Atípico, Atenção Básica em Saúde.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE TERMINALIA CATAPPA

LOBATO, Luis Felipe Lima Lobato; ZAGMIGNAN, José Lima Viana; Adrielle Zagnignan; SOUSA, Eduardo Martins de; ABREU, Afonso Gomes

Curso: biomedicina

Email: felipe-lobato1@hotmail.com

Resumo: A resistência bacteriana devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos é um importante problema de saúde pública. Estudos têm sido realizados com plantas à procura de novas substâncias com atividade antimicrobiana. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana do extrato hidroalcoólico da Terminalia catappa (TcHE), bem como a atividade citotóxica em células mononucleares do sangue periférico (PBMC). Extrato TcHE (4; 2; 0,8; 0,4; 0,2 mg / mL) foi utilizada para avaliar a atividade antibacteriana sobre *S. aureus* (ATCC 25923) e

Mycobacterium abscessus subespécie *bolletii*. A concentração inibitória mínima (CIM) do extrato foi determinada por resazurina, no método de microdiluição em caldo. Para investigar o efeito de TcHE em PBMC, as células foram obtidas por centrifugação com histopaque. A viabilidade celular foi determinada pelo método de MTT. E os dados analisados por ANOVA e teste de Tukey. A concentração mínima de TCHE necessária para inibir o crescimento de *S. aureus* foi de 0,19 mg / mL, enquanto que para *M. abscessus* CIM foi de 0,097 mg/mL. A viabilidade celular encontrada após o tratamento com TcHE foi: 4 mg /mL (OD: 0,44 ± 0,01) ; 2 mg/mL (OD : 0,46 ± 0,01) ; 0,8 mg/mL (OD : 0,11 ± 0,01) ; 0,4 mg / mL (OD : 0,19 ± 0,01) ; 0,2 mg/mL (OD : 0,07 ± 0,01) ; meio (OD : 0,59 ± 0,01) ($p < 0,05$) . O TcHE demonstrou atividade antimicrobiana contra *S. aureus* e *M. abscessus*, bem como, não apresentou citotoxicidade sobre a viabilidade celular de PBMC.

RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE RESINAS COMPOSTAS DIRETAS SUBMETIDAS A SISTEMAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO

MOURA, Rommisson Yacones Lessa*; CARNEIRO, Karina Gama Kato; KUSSANO, Sandro Carvalho; MAIA, Mariana de Figueiredo Lopes e; ARAÚJO, Randerson de Sousa; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; GOMES, Isabella Azevedo

Curso: Odontologia

Email: rommisson@gmail.com

O objetivo foi testar “in vitro” a hipótese nula de que não há diferença quanto à rugosidade superficial quando comparados dois sistemas de acabamento e polimento em duas resinas compostas diretas: uma nanohíbrida e uma microhíbrida. 56 discos de duas resinas compostas foram confeccionados para compor os grupos da seguinte forma: grupo 1 - resina microhíbrida – Z100 e grupo 2 - resina nanohíbrida - Opallis. Após 24h foi avaliada a rugosidade inicial de cada amostra com rugosímetro. Durante 7 dias os corpos de prova foram imersos em água destilada à 37°C na estufa bacteriológica para o acabamento e polimento com dois sistemas (A - Sof-Lex tradicional e B - Sof-Lex Espiral). A rugosidade de cada amostra foi, então, analisada com rugosímetro novamente. O mesmo operador realizou o acabamento e polimento das amostras. O operador encontrava-se cego durante as mensurações de rugosidade final. Os dados apresentaram distribuição normal. Aplicou-se Shapiro Wilk para avaliar a homogeneidade dos dados; e Análise de Variância a dois critérios e post hoc de Tukey para a comparação resina e polimento. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significativa quando comparadas rugosidade inicial e final do G1A ($p < 0,01$), expondo diferença no de rugosidade inicial e após o acabamento e polimento com discos para a resina Z100. Analisando os grupos entre si, houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos G1B e G2A ($p \leq 0,05$), que

demonstrou que o grupo da Opallis com discos Sof-Lex (0,220µm) tradicional obteve maior lisura do que o grupo da Z100 com Sof-Lex espiral (0,330 µm).

SIMULAÇÃO REALÍSTICA: UM INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

MAGALHÃES, Juliana Galvão*; BATISTA, Márcia Rodrigues Veras; LIMA, Alysson Kenedy Sales; GOMES, Jessica Aline Feitosa; OLIVEIRA, Maria Laricy Dias; MALHEIROS, Adelzir; HAIDAR, S. C. B.; CARVALHO, Laíse Neves

Curso: Fisioterapia

Email: ju-lianacat@hotmail.com

A Simulação Realística é um método utilizado na formação em saúde para substituir ou ampliar as experiências de pacientes reais com cenários desenhados para reproduzir encontros de saúde real, com o objetivo de aperfeiçoar o pensamento crítico, habilidades, aquisição de conhecimento e a capacidade de identificar a deterioração do paciente e, desta forma, colaborar na capacitação dos alunos da graduação em fisioterapia. Participam discentes do 7º período do curso de fisioterapia da Universidade CEUMA. A demanda ocorre de forma espontânea e os alunos respondem a um teste com 13 questões antes e após o projeto de extensão. Para comparação dos erros e acertos no pré e pós-teste foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo adotado o nível de significância estatística com $p < 0,05$. No pré-teste o percentual de acertos foi de 8,7% e de erros 36,9%, entretanto, houve um percentual muito alto (54,4%) de questões em branco. No pós-teste o percentual de acertos foi de 77,4% e de erros foi de 12,3%. O total de questões em branco foi apenas 10,3%. O valor do χ^2 foi de 194, 13 com uma possibilidade associada (p-valor) menor que 0,001.

VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA SUBMETIDAS AO TREINAMENTO FÍSICO.

LOPES, Vivian Lee Costa*; LIMA, Francileia Andrade; DINIZ, Renata Rodrigues; REIS, Andrea Dias; SOARES, Máisa Carvalho Rezende; CASTRO FILHA, Jurema Gonçalves Lopes De; GARCIA, João BATISTA Santos

Curso: Educação Física

Email: vivian_lee1@hotmail.com

O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais temidos e o que mais acomete mulheres em todo o mundo. Essa realidade é observada tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. A disfunção autonômica, demonstrada pela redução da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é um bom indicador de risco em desenvolver algum evento cardíaco em pessoas saudáveis, em pacientes com hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, doença de Chagas, obesidade, insuficiência cardíaca, Parkinson, Alzheimer e câncer. Analisar a

variabilidade da frequência cardíaca em portadoras de câncer de mama, antes e após 4 semanas de treinamento físico (aeróbios e resistidos). Doze mulheres (idade $48,42 \pm 8,26$) que faziam treinamento físico (aeróbico e resistido). A pesquisa, encontra-se de acordo com os princípios éticos em pesquisa do Comitê de Ética da Universidade Federal do Maranhão, sob protocolo nº 545. 547. O teste cardiopulmonar foi realizado para avaliar a aptidão cardiorrespiratória pelo VO₂ Máx estimado. A VFC utilizou os índices do domínio do tempo e da frequência. Os índices SDNN, RMSSD tiveram um aumento após 4 semanas indicando um predomínio do vago, HF, LF/HF também apresentaram um aumento após 4 semanas e LF mostrou uma redução indicando uma menor atuação do simpático e uma hiperativação do parassimpático. O presente estudo demonstrou que o treinamento físico tem se mostrado eficiente em promover melhorias na função cardiorrespiratória e autonômicas em mulheres com câncer de mama, em tratamento quimioterápico.

TEMA LIVRE PESQUISA PÓS GRADUAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA DE MANICURES E PEDICURE SÃO LUÍS

ALMEIDA, Isabella de Sousa*; CARVALHO, Alan Costa; FELIPE, Ilana Mirian Almeida

Curso: Enfermagem

Email: allan-gta13@hotmail.com

A imagem pessoal e beleza, sempre foram uma preocupação entre homens e mulheres. Práticas de embelezamento como retirada de cutículas pelos serviços de manicure e pedicure, podem ser consideradas um fenômeno social e coletivo, popular entre os brasileiros. Porém, os serviços de biossegurança são essenciais nesta prática, pois sem eles, aumentam os riscos de contágio de vírus: HBV, HCV e HIV. O objetivo deste artigo foi avaliar os procedimentos de biossegurança adotados por manicures e pedicures em salões de beleza. Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo de corte transversal. A pesquisa foi realizada nos salões de beleza dos Distritos Sanitários Coroadinho e Tirirical, do município de São Luís, MA. A amostra da pesquisa foi constituída por 25 manicures/pedicures. De acordo com a análise dos dados, observou-se que (64%) tinham 30 anos ou mais e (52%) tinham algum curso de capacitação e/ou treinamento. Ao que se refere à percepção dos entrevistados sobre os riscos a que estão expostos e adoção de medidas de biossegurança, (68%) afirmou saber que pode adquirir alguma doença de seus clientes; (60%) disse saber que pode transmitir doenças; (76%) afirmou lavar as mãos entre os clientes; (100%) afirmou usar luvas descartáveis. Quanto à situação vacinal das manicures em relação à hepatite B, (76%) afirmou possuir cartão de vacina, porém, apenas (35%) tomaram as 3 doses da vacina. Faz-se necessária que haja um maior incentivo para que esses profissionais sejam preparados da maneira correta em cursos, para prevenção de infecções nesses serviços.

COMPARAÇÃO QUANTITATIVA IN VITRO DO POTENCIAL EROSIVO DE ENXAGUATÓRIOS INFANTIS SOBRE O CIV

RAPÔSO, Nayre Maria Lauande*; DA SILVA, Aline Bastos; PASCHOAL, Marco Aurélio Benini; GONÇALVES, Letícia Machado;

Curso: Odontologia

Email: nayrelauande@gmail.com

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o potencial erosivo de enxaguatórios bucais infantis sobre cimento de ionômero de vidro convencional (CIV). **Revisão de Literatura:** Há um aumento do uso de enxaguatórios infantis em relação à população infantil, logo tem sido adotado o uso de agentes de controle químico complementando a escovação dentária e o uso do fio dental. **Materiais e Métodos:** Foram confeccionados 40 corpos de CIV divididos em 4 grupos (N=10) e submetidos à ciclagem erosiva por 15 dias, sendo expostos duas vezes/dia nas seguintes soluções de enxaguatórios bucais infantis: G1- Enxaguatório à base de cloreto de cetilpiridínio, G2 - à base de triclosan e G3 - à base de triclosan. Previamente à ciclagem, os corpos de prova foram submetidos à leitura de rugosidade superficial com o auxílio do rugosímetro. Após a ciclagem, foi realizado o cálculo de aumento real de ganho de rugosidade. O estudo adotou como controle negativo a água destilada (N = 10). **Resultados:** O enxaguatório à base de triclosan apresentou o pH levemente mais ácido (pH = 6,83) em relação aos enxaguatórios à base de triclosan/gantrez (pH = 7,18) e à base de cloreto de cetilpiridínio (pH= 7,84). Os grupos testados apresentaram aumento de rugosidade em relação ao grupo controle (Rf = 0,93±0,11). **Conclusão:** Os enxaguatórios apresentaram capacidade erosiva sobre CIV com aumento dos valores de rugosidade. **Palavras-chaves:** Erosão, Cimentos Dentários, Antissépticos

PERFIL AUDIOLÓGICO DE INTEGRANTES DE UM GRUPO DE BUMBA-MEU-BOI

MUNIZ, Carina Moreno Dias Carneiro*; DIAS, Rosane da Silva; FAÇANHA, Rachel Costa

Curso: Fisioterapia

Email: Carina.muniz@ifma.edu.br

RESUMO A exposição ao ruído acima dos limites toleráveis à orelha humana tem se tornado um agente presente no cotidiano da população, sobretudo nos ambientes sociais e ocupacionais. Os índices de perda auditiva induzida pelo ruído vêm se multiplicando e se tornando uma das maiores doenças relacionadas ao trabalho. Os músicos e dançarinos de bumba-meu-boi são expostos a ruídos e a elevados níveis de pressão sonora devido a várias horas de ensaios e ao grande número de apresentações. Estes profissionais constituem, portanto, um grupo com probabilidade para desenvolver perda auditiva de origem ocupacional. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo descritivo, composto por uma amostra com 41 integrantes de um grupo de bumba-meu-boi da capital maranhense. A coleta de dados foi realizada no período de abril a

junho de 2016, por meio do exame de audiometria tonal limiar, contendo as variáveis de estudo: grau de perda auditiva e configuração audiométrica. Estudo aprovado pelo CEP com parecer de nº 1.532.544. De acordo com a análise estatística dos dados, 53,7% dos integrantes apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade para a média tritonal das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Destes, 39,0% apresentaram configuração em entalhe, sugestivo de desencadeamento de perda auditiva com a continuação da exposição ao ruído sem proteção auricular. Apenas 2,4% dos pesquisados apresentaram como resultado o grau de perda auditiva leve, assim como o grau de perda auditiva moderado com configuração em entalhe. Conclui-se que os integrantes do grupo de Bumba meu Boi apresentam exames audiométricos sugestivos de perda auditiva o que se torna imprescindível uma conscientização sobre saúde auditiva para prevenção do agravamento desta alteração. DESCRITORES: Audiometria, perda auditiva induzida por ruído, ruído ocupacional.

TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA GRADUAÇÃO

A ÁGUA ALCALINA E SUA FINALIDADE NUTRACÊUTICO: CURA, PREVENÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS

DE CARVALHO, Raquel Araújo*; COSTA, Juliana Alberto

Curso: Biomedicina

E-mail: raquel@lcpromocoes.com.br

A água alcalina ionizada foi desenvolvida inicialmente para uso na agricultura. Em 1998 o Dr. Shirahata descobriu a ligação entre a água ionizada e as águas consideradas milagrosas de Hita Tenryosui no Japão, Alemanha e no México. Estas águas ativas são conhecidas pelo seu poder curativo e pelo seu efeito benéfico no tratamento de várias doenças. A água alcalina foi adotada por várias clínicas médicas que, apresentaram estudos evidenciando melhorias na saúde dos seus doentes. Desenvolvimento: Através do uso constante, melhora a oxigenação das células, elimina diversas toxinas, previne e ajuda no tratamento de doenças como câncer, problema na tireóide e osteoporose. A água alcalina ionizada possui um ORP altamente negativo, o que indica o seu poder antioxidante. O ORP negativo é conferido à água alcalina ionizada pela presença de substâncias redutoras, capazes de fornecer um eletrão numa reação de oxidação-redução. Conclusão: É prudente considerar uma dieta alcalina, baseada em alimentos e água alcalinos, para diminuir a morbidade e mortalidade de doenças crônicas que afligem a população. No que se refere à contaminação, faz-se necessário diminuir esta carga tóxica e alcalinizar a água que na maioria das vezes é ácida. A água alcalina é uma água benéfica para a saúde com propriedades, antioxidantes e anti-envelhecimento, contribuindo para a prevenção das doenças crônicas que hoje em dia acometem na nossa sociedade

A EFICÁCIA DA DIETA CETOGÊNICA PARA PERDA DE PESO

DE CARVALHO, Marcia Regina Liotto*; MATOS, Ana Cinara Matos; LIMA, Patricia De Souza; SOUZA, Ângela Tâmara Lemos

Email: marcialiotto@hotmail.com

Curso: Nutrição

Resumo: A dieta cetogênica (DC) é baseada na ingestão de níveis baixos de hidratos de carbono. A baixa oferta de hidratos de carbono na alimentação faz com que o organismo seja privado da principal fonte de energia que é a glicose. Com isso o organismo utiliza de outras vias para obter energia, levando o corpo a um estado de cetose que são formações de corpos cetônicos, utilizados como energia em substituição da glicose. Esse mecanismo ocorre através de degradação de Ac. graxos armazenados no corpo ou absorvido da dieta alimentar através da lipólise e da gliconeogênese, favorecendo assim uma queima maior de gorduras acumuladas nos adipócitos. RESUMO: A DC caracteriza-se por ser rica em ácidos graxos saturados e também por ser saciogênica, geralmente segue protocolos sem restrição calóricas, tornando-se uma excelente estratégia para um emagrecimento rápido a curto prazo. O objetivo deste trabalho foi levantar bibliograficamente estudos que comprovassem a eficácia da dieta cetogênica para perda de peso e também seus efeitos a longo prazo. Os estudos demonstraram que a DC demonstrou ser mais eficaz para perda de gordura corporal a curto e médio prazo em relação a dietas convencionais de baixa calorias. Houve uma maior perda de gordura corporal, maior saciedade, normalização da pressão arterial, níveis glicêmicos mais baixos, tendo como principal estatística um aumento dos níveis de HDL. No entanto em estudos feitos a mais de 12 meses alguns resultados mostraram um aumento nos níveis de LDL, sendo necessário mais pesquisas que comprovem seus efeitos a longo prazo.

A INIMPUTABILIDADE DO DOENTE MENTAL: IMPLICAÇÕES A PARTIR DA REFORMA PSQUIÁTRICA

RIBEIRO, Halysson Cezar Rezende*; JUNIOR, Edimilson da Silva; OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes; ALVES, Cândida Helena Lopes; CRUZ, Ruy Ribeiro Moraes

Email: halyssonribeiro.hr@gmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: A Reforma Psiquiátrica permitiu novas práticas na prevenção da Saúde Mental, porém, pessoas com doença mental continuam nas dependências dos hospitais de custódia e são acometidos pelo abandono familiar. O estudo realizado analisou a posição do doente mental (DM) infrator no Brasil a partir do desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica. As

responsabilidades pelos atos humanos podem gerar efeitos sociais punitivos, mas de forma divergente, aqueles que apresentam incapacidade da percepção do delito, ficam isentos de pena. Criou-se a institucionalização do “louco delinquente”, excluindo-o de assistência e de tratamento adequado. O presente estudo teve como objetivo compreender a posição social e institucional, ou seja, o lugar do louco infrator junto ao processo de institucionalização e tratamento. Realizou-se uma revisão bibliográfica no período de Maio de 2015 a Junho 2016, tendo como critério de inclusão a data de publicação das referências entre 2010 e 2016. Foram consultadas as bases de dados SciELO, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde e a legislação brasileira. No código penal brasileiro o DM é considerado inimputável e com o passar dos anos começou a ser visto como portador da loucura, recebendo tratamento compulsório e liberdade restrita, após a constatação por uma perícia médica, suficiente para levar o sujeito à institucionalização, acreditando-se que esta atitude levaria à paz social. O tratamento do DM infrator ainda depende de estrutura e acompanhamento familiar e comunitário que forneçam um desenvolvimento subjetivo, mediante tratamento que a reforma psiquiátrica ainda não conseguiu atingir.

A IMPORTÂNCIA DO EXAME CLÍNICO EM PROTESE TOTAL

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Rocha*; MOFFA, Eduardo Buoizzi

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

O exame clínico em prótese total tem a finalidade de oferecer possibilidades de tratamento ao protesista permitindo que, sob certas circunstâncias, proponha diferentes tipos de trabalho com o mais alto grau de confiabilidade. Assim, o Diagnóstico bem estabelecido tem estreita relação com a utilização da prótese, pois representa a avaliação científica das condições existentes. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma pequena revisão dos detalhes clínicos que devem ser observados durante a confecção de uma prótese total, com a finalidade de se estabelecer um prognóstico que tenha respaldo científico e que nos permita afirmar ao paciente suas verdadeiras condições de uso da mesma.

A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO DA PSICOLOGIA COM OUTRAS ÁREAS MULTIPROFISSIONAIS

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de; JUNIOR, Gilberto Assunção Costa; SOUSA, Laura Rosa de; OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes de; MATOS, Mireya Alice Moraes; ALVES, Cândida Helena Lopes; SOARES, Karla Virgínia de Castro

Curso: Psicologia

Email: elianek2@hotmail.com

Resumo : A Psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento, a experiência subjetiva e os processos mentais a eles subjacentes, possui campo de trabalho muito amplo. O presente trabalho objetiva reconhecer a importância da interação da Psicologia com outras áreas em prol do bem-estar do paciente/cliente, uma vez que busca explicar como o ser humano pode- se conhecer e interpretar a si mesmo e o mundo no qual vive, interagindo com outros seres, com a natureza, os objetos e os sistemas sociais, econômicos e políticos, colocando o seu conhecimento a serviço dos outros indivíduos e de diversas áreas (Saúde, Educação, Trabalho, Comunidades, Esporte, Trânsito, Justiça), decorrendo daí o grau de interdisciplinaridade e convergência dos seus temas, estendendo, assim, a atuação do psicólogo a escolas, hospitais, consultórios, creches, associações comunitárias, empresas, penitenciárias, entre outros setores. A partir da realização de várias leituras, investigações e da participação em diferentes grupos de pesquisas, verificou-se que o psicólogo precisa adquirir uma identidade mais crítica e consciente do seu papel e deve estabelecer um contato mais próximo, através de intercâmbios contínuos com outras profissões, agregando-se a equipes multiprofissionais, de modo a aplicar os seus conhecimentos, visando promover o desenvolvimento humano e as suas potencialidades. Enfatiza-se, portanto, que, através dessa prática interdisciplinar e de um olhar mais humanizado, considerando o indivíduo como um ser biopsicossocial, o profissional de Psicologia, certamente, estará contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida do paciente/cliente

A IMPORTANCIA DA NORMALIDADE DOS PARAMETROS DOS SINAIS VITAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

MENDES, Renata*; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos.

Email: renata.m.almeida@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Sinais vitais são medidas referentes à pressão arterial, temperatura corpórea, frequência cardíaca, frequência respiratória, e mais recentemente a dor. Alterações nas funções corporais são geralmente refletidas na variação desses sinais. A aferição dos mesmos deve ser feita nas consultas iniciais e quando necessário, antes, durante ou depois dos procedimentos odontológicos, principalmente os de caráter invasivo. A avaliação dos sinais vitais é crucial para o planejamento clínico, tendo em vista que o paciente não deve ser submetido à procedimento de risco, caso haja quaisquer alteração referente ao seu estado de saúde. Os níveis considerados normais de cada sinal, variam em: Temperatura corpórea: 36,1°C a 37,2°C Pulso (frequência cardíaca): 60 a 100 bpm, em adulto. Frequência respiratória: 12 a 20 rpm, em adulto. Pressão arterial: Normotensão - 120 x 80 mmHg. O sucesso de qualquer tratamento odontológico deve

ser sempre almejado, e para que isso aconteça é de extrema importância o cuidado e responsabilidade do profissional certificar-se das condições de saúde de cada paciente.

A IMPORTÂNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES ALERGÊNICOS EM RÓTULOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS INDUSTRIALIZADAS

PEREIRA, Gracielle Cristina Lima*; DA COSTA, Dacilene Carlos; FRÓES, Catarine Simões Silva; SILVA, Joina Cristina Taveira; DAS DORES, Thailane De Jesus Martins; SOUZA, Ângela Tamara Lemos

Email: gracycrist@hotmail.com

Área/Especialidade: Nutrição

Nas últimas décadas, tem-se observado um expressivo aumento no número de pessoas que apresentam algum tipo de alergia alimentar. Estes precisam fazer dieta com restrição ou exclusão de produtos alérgenos para garantir a saúde e alimentação adequada dos mesmos. REVISÃO: Quando os alimentos se apresentam em sua forma natural são mais fáceis de serem eliminados da dieta. O mesmo não ocorre com produtos industrializados, havendo a necessidade de maior controle, onde estes devem apresentar informações claras e precisas referente à presença ingredientes alérgenos. A própria constituição ratifica este direito no artigo 8º da lei nº 26/2015, onde destaca que fornecedores devem informa que produtos e serviços não devem acarretar riscos a saúde e segurança dos consumidores. Informações sobre os ingredientes alérgenos podem fazer toda a diferença e até salvar a vida de pessoas alérgicas. Depois da pressão e da mobilização de movimentos a favor de uma regulamentação de adequação na rotulagem de alimentos, em 2015 a ANVISA por meio da RDC nº 26/2015 definiu os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergia. Esta resolução vem obrigar as indústrias de alimentos e bebidas a informarem em seus rótulos a existência de alimentos que podem causar alergia alimentar. CONCLUSÃO: A regulamentação vem claramente beneficiar a população que possui algum tipo de alergia e faz uso de produtos alimentícios industriais, pois estas hoje estão menos expostas a riscos de acidente de cunho alimentar, antes ocasionados pela dificuldade de identificar ingredientes alergênicos

A RELAÇÃO ENTRE O FREIO LABIAL E O DIASTEMA INTERINCISAL

ROSA, Caroline Sampaio; MOUCHERЕК, José Carlos Elias;

Curso: Odontologia

Email: casampaiorosa@hotmail.com

Resumo: O freio labial é uma extensão formada pela mucosa do lábio à parede alveolar. Existem três tipos de freios: o labial superior e inferior, e o lingual. O freio labial se projeta em formato

prismático triangular e separa o vestibulo em duas metades no sentido sagital no nível da linha mediana. Os freios são classificados quanto à sua inserção. Sendo que aquele que está inserido na região interdentária se relaciona anatomicamente com o diastema desta região. Como forma de tratamento dessa condição pode-se realizar cirurgias periodontais como a frenotomia ou frenectomia. A frenotomia é considerada mais delicada por realizar o reposicionamento do freio mais acima e eliminar sua inserção intra papilar, enquanto a frenectomia realiza a remoção completa do freio, sendo considerada mais radical. À relação dada entre a cirurgia periodontal e o tratamento ortodôntico dar-se o nome de ortodontia preventiva, pois ambos irão se complementar para evitar a recidiva do diastema interincisal.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA

OLIVEIRA, Rita De Cassia Da Rocha*; SOUZA, Hamilton; JUNIOR, Wilson Gomes De Oliveira; BASTOS, Andrezza Maciel

Curso: Odontologia

Email: ritacarliveso@hotmail.com

A responsabilidade do cirurgião-dentista pode ser entendida como obrigações de ordem penal, civil, ética e administrativa, às quais está sujeito no exercício de sua atividade. É o dever de reparar o dano causado à outra pessoa, dano este provocado por um ato ilícito ou pela falta de observação das normas que regem a vida em sociedade. Na Responsabilidade Civil Subjetiva, os fundamentos são a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) e o dolo, ao passo que na Objetiva os fundamentos são a lei e o risco da atividade. A responsabilidade do cirurgião-dentista é regulamentada pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. O objetivo deste trabalho é discutir a responsabilidade civil, ressaltando a importância da manutenção de uma documentação odontológica estruturada e devidamente arquivada que, além de poder ser usada como prova na eventualidade de processos civis, penais e éticos, também pode servir de instrumento para consulta nos casos de identificação humana.

“ABCDE” DO TRAUMA

SILVA, Natyla Maysa de Lima*; GASSMAN, Hildenesa; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima.

Categoria: Graduação

Email: nathymaysa@hotmail.com

Curso: Odontologia

O trauma é a primeira causa de morte entre crianças, adolescentes e adultos jovens, tais mortes podem ser imediatas, precoces e tardias ao trauma sofrido e 70% dos pacientes que vem ao óbito nas primeiras duas horas é devido a não haver uma abordagem correta ao paciente. Dessa forma conhecer o “ABCDE” do trauma, que se refere a esta avaliação inicial é de suma importância, sendo que A significa verificar as vias aéreas, B é o boca-boca, onde se verifica a respiração, C significa verificar a circulação, D que é o déficit neurológico onde se classifica o nível de consciência e E, onde temos exposição do paciente com controle de temperatura. Portanto somente após uma correta avaliação é que teremos uma correta conduta tomada, pois é na mesma que vai se definir o que irá se fazer inicialmente no paciente, pois o mesmo ao ser vítima de traumas, necessita de cuidados imediatos com condutas adequadas.

ABORDAGEM CIRURGICA NO TRATAMENTO DE FISSURAS PALATINAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Natyla Maysa de Lima*; GASSMANN, Hildenesa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Email: nathymaysa@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Fissuras podem ser definidas como um espaço anormal congênito no lábio superior, no alvéolo ou no palato, sendo as anomalias congênitas mais comuns. A correção cirúrgica primária da fissura palatina que compreende a reconstrução cirúrgica anatômica e funcional do palato duro e/ou mole é denominada palatoplastia, ela pode ser considerada a base para o tratamento de pacientes fissurados, pois somente com a reconstrução do palato é possível que haja o reposicionamento muscular e reestabelecimento do mecanismo velofaríngeo. Tem crescido consideravelmente a variedade das técnicas de palatoplastia. O desafio hoje da mesma não esta limitada a somente o fechamento bem sucedido da fissura do palato mole e/ou duro, mas também a obtenção de um excelente resultado da fala sem que haja comprometimento no crescimento facial. No entanto ainda não há na literatura consenso quanto a melhor técnica cirúrgica que realmente possibilite bons resultados, tanto do ponto de vista anatômico quanto funcional. Portanto cabe ao cirurgião escolher a técnica adequada vista as condições de seu paciente.

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA ALÉLICA DE MARCADORES STR NA POPULAÇÃO BRASILEIRA

OLIVEIRA, Jéssica Jansen*; VIANA, Andréya Márcia de Holanda; ROCHA, Marla Raquel Pontes.

Curso: Biomedicina

Email: jyde2011@gmail.com

A análise de DNA tem como objetivo diferenciar um indivíduo de outro, através de um grande número de características, dando-lhe uma identidade absoluta como pessoa, podendo assim ser diferenciado dentre bilhões de outras. Foi através da Genética Forense, ramo da genética humana que visa identificar a origem de material biológico, individualizar pessoas ou estabelecer vínculos genéticos entre elas, que se tornou possível a identificação e montagem do perfil genético individual. O estabelecimento do perfil genético é baseado na análise de algumas regiões do DNA conhecidas que apresentam maior variação individual e facilidade de estudo, conhecidas como marcadores genéticos ou moleculares chamados minissatélites ou sequências repetitivas de número variável (VNTR), que são altamente específicas a um indivíduo, possibilitando a investigação de paternidade e a identificação em casos criminais. Diante do exposto, o presente trabalho visa contribuir para a formulação de um banco de dados nacional, através do estudo dos marcadores STRs ou microssatélites, que são polimorfismos genéticos gerados por um arranjo de sequências in tandem de múltiplas cópias de um pequeno segmento de DNA, sendo assim os marcadores moleculares de maior facilidade de estudo e potencial de variabilidade, tendo como objeto de estudo a população brasileira e seus polimorfismos genéticos, mais especificamente, os marcadores D8S1179 e VWA.

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DAS INFECÇÕES ENDODÔNTICAS

OLIVEIRA, Rita De Cassia Da Rocha*; MARQUES, Tarcia Virginia Falcao; MOFFA, Eduardo Buoizzi

Curso: Odontologia

Email: ritacarolivesoi@hotmail.com

Os microrganismos desempenham papel central na etiopatogenia das principais alterações pulpares e periapicais seja atuando como agentes causais primários ou participando como agentes secundários complicadores no processo de reparação periapical. Considerando este protagonismo das infecções endodônticas pode-se dizer que a endodontia é a disciplina voltada para prevenção, controle e eliminação dos microrganismos presentes no Sistema de Canais Radiculares (SCR). Isso faz com que o conhecimento das infecções endodônticas e o respeito ao protocolo de atendimento pacientes portadores de dentes despolpados associados ou não a lesões perirradiculares, seja essencial para a obtenção do sucesso endodôntico. O presente estudo teve como objetivo apresentar revisão sobre principais aspectos relacionados ao desenvolvimento das infecções endodônticas tais como: vias de contaminação do SCR, principais microrganismos envolvidos nas infecções endodônticas e o protocolo de desinfecção dos canais. Os resultados indicam que: a exposição do complexo dentina-polpa resultante de lesões cariosas ou traumáticas, representa a principal via de infecção do SRC; as infecções do sistema de canais radiculares são polimicrobianas, com maior prevalência de estreptococos e microrganismos

anaeróbios; existem protocolos diferentes utilizados na desinfecção de canais radiculares, mas apresentam-se com o objetivo comum de eliminar ou diminuir a carga microbiana do SCR, através de eficientes meios utilizados no preparo químico-mecânico e na correta obturação dos canais radiculares.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA AO AUTISMO E RELAÇÃO TERAPÊUTICA

CRUZ, Ingrid Naiany Carvalho da; CARNEIRO, Abigail Cunha; PEREIRA, Layla Leiticia Barbosa; SILVA, Katiane Reis da; LIMA, Meliane Gomes; MATOS, Daniel Carvalho de

Curso: Psicologia

Email: inai-any@hotmail.com

Resumo: O autismo é uma condição crônica e são identificados frequentemente prejuízos em áreas como linguagem. O desenvolvimento dessa habilidade e outras demanda muitas vezes intervenções especializadas, considerando que muitos apresentam dificuldade na aprendizagem por meio de métodos convencionais. Profissionais de diversas áreas delineiam propostas com esse intuito. É importante que o tratamento seja contínuo e envolva equipe multidisciplinar. Em se tratando da Psicologia, a Análise do Comportamento representa uma abordagem, que ganha destaque no cenário nacional e internacional pelo desenvolvimento de metodologias de intervenção, que visam o desenvolvimento das habilidades de linguagem e outras relevantes. Todas as intervenções propostas são fundamentadas em evidências científicas. A abordagem compreende a linguagem como um tipo de comportamento chamado verbal e as estratégias de intervenção compreendem, no que diz respeito à linguagem, o ensino de diversas funções ou comportamentos operantes verbais. Parte do trabalho teve o objetivo de descrever genericamente sobre essas funções e, também, discutir sobre a proposta de desenvolvimento de intervenções para o ensino das mesmas. Além disso, este trabalho teve o objetivo de discutir, em linhas gerais, sobre o desenvolvimento de outras habilidades indiretamente relacionadas à linguagem, mas relevantes ao seu desenvolvimento em função de estabelecerem melhor atenção dos aprendizes com autismo para os outros, incluindo pessoas presentes em ambientes sociais como o familiar e a escola. Por fim, discute-se sobre a importância de um mediador estabelecer boa relação de empatia como condição importante para a motivação.

AVALIAÇÃO DA EMPATIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA

FERREIRA, Clude Irene Cardoso*; LIMA, Ana Beatriz Rocha.

Email: dy.ferreira17@gmail.com

Curso: Psicologia

A empatia faz parte das habilidades e competências esperadas de profissionais das mais diversas áreas, em especial, do psicólogo, para que seu exercício profissional seja pautado em valores e virtudes, que respeitem os princípios éticos, da autonomia, da beneficência, da justiça e equidade. A empatia é necessária ao profissional de Psicologia, pois proporciona um acolhimento verdadeiro ao paciente/cliente, colaborando para a construção do vínculo terapêutico, influenciando sua adesão e permanência no processo psicoterapêutico estabelecido. Empatia refere-se à capacidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamentos ou críticas, e de compreender os seus sentimentos e emoções. O objetivo principal dessa investigação é analisar no contexto nacional a produção científica sobre instrumentos de mensuração do construto empatia. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória que realiza uma revisão sistemática, na qual foram encontrados 94 artigos e analisados 37 destes, publicados em português, nas bibliotecas virtuais SCIELO e PEPSIC no período de 1999 a 2014. A observação da preocupação com a elaboração de instrumentos de medida desse construto, validados para o contexto brasileiro aponta a sua importância, sendo considerado essencial para o exercício profissional de várias categorias, e em especial, para o psicólogo. A disponibilidade de muitos instrumentos de medidas contribui para o diagnóstico dessa competência profissional e para avanço de metodologias ativas para o ensino da empatia, uma vez que permite a sua mensuração. Pois, o desenvolvimento da empatia, em especial na graduação, contribui positivamente para as relações profissionais e pessoais e para elevar a qualidade técnica profissional. Palavras-chave: EMPATIA, COMPETÊNCIAS, REVISÃO SISTEMÁTICA.

BEM-ESTAR SUBJETIVO E RESILIÊNCIA: PSICOLOGIA POSITIVA E TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA NA SAÚDE MENTAL ENTRE IDOSOS.

LIMA, Robson*; LIMA, Ana Beatriz Rocha; LIMA, Dra. Ana Beatriz Rocha;

Curso: Psicologia

Email: robsonlima.misc@bol.com.br

O envelhecimento populacional apresenta novos desafios que exigem novas abordagens e tecnologias de cuidados que permitam ir além do modelo curativo, avançando para um modelo de promoção e prevenção da saúde mental. Os efeitos do contexto desagregador das relações familiares, agravadas por condições socioeconômicas e movimentos migratórios provocam perda da identidade pessoal, sociocultural e pobreza da autoimagem, cujo contexto grande parte dos idosos brasileiros estão inseridos. O objetivo principal desse estudo é compreender as convergências entre a Psicologia Positiva e a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) para a promoção da saúde mental em pessoas idosas. A TCI é um espaço de cuidado que permite a construção de redes sociais solidárias de promoção da vida e construção de vínculos,

mobilizando recursos psicológicos, resgatando valores socioculturais, que ao longo do tempo por diversos fatores foram negligenciados. Assim, a TCI se propõe a resgatar as competências dos indivíduos, das famílias e das comunidades. O termo resiliência também é objeto de investigação da Psicologia Positiva. A TCI atua como um espaço de fomentação e promoção da resiliência, pois pela partilha de experiências de vida de seus participantes eles reforçam a autoestima, fortalecem os vínculos interpessoais e estimulam a autonomia. A resiliência funciona como mecanismo que ajuda os indivíduos e grupos a se beneficiarem e se empoderarem com as experiências vividas, de modo que a dificuldade possa significar o desafio para mobilizar as capacidades solidárias dos indivíduos e da população, promovendo bem-estar individual e coletivo, fazendo assim um chamado à responsabilidade coletiva.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, RADIOGRÁFICAS E HISTOLÓGICAS DA DISPLASIA FIBROSA

SANTANA, Hellen Thayane Lemos*; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Email: hellen.thayane@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A Displasia fibrosa é considerada uma patologia benigna, de crescimento lento, congênita e proliferativa. Caracterizada pela expansão e substituição do osso normal por tecido fibroso, causando crescimento excessivo do osso afetado. De modo geral, a displasia fibrosa afeta 1 em 4.000 a 10.000 indivíduos nascidos vivos. Apresenta-se em duas formas, a displasia fibrosa monostótica e a poliostótica. A Displasia fibrosa Monostótica representa cerca de 70-80% dos casos. Geralmente é assintomática e descoberta em exames clínicos e radiográficos de rotina. A forma Monostótica acontece se a mutação ocorrer durante a vida pós-natal. A Displasia fibrosa Poliostótica corresponde a 20-30% dos casos. Envolve dois ou mais ossos. Acontece se a mutação ocorrer durante a vida embrionária. Cerca de 25% de todos os pacientes com displasia fibrosa poliostótica apresentam a doença em mais de metade do esqueleto. Na região maxilofacial a displasia fibrosa envolve a maxila quase 2 vezes mais que a mandíbula, frequentemente na região posterior, e é geralmente de natureza unilateral. Radiograficamente, a displasia fibrosa pode ser classificada nas formas compactas ou escleróticas, líticas e mistas. Existem três abordagens de tratamento para a displasia fibrosa, monitoramento, terapia médica ou tratamento cirúrgico. A biópsia da área do crescimento ósseo deve ser realizada para confirmar o diagnóstico de displasia fibrosa. Alguns autores recomendam a monitorização regular dos pacientes por toda a sua vida para avaliar o progresso da doença.

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de; LOBO, Eliene Aquino; SILVA, Eldi Pereira; SANTOS, Ednamara de Oliveira; RIBEIRO, Wallyson Martins; GALVÃO, Pollianna; BECKMAN, Márcia Beckman

Curso: Psicologia

Email: elianek2@hotmail.com

Resumo: Os estudos sobre formação e atuação docente têm se direcionado àqueles profissionais que atuam em espaços de escolarização formal, principalmente em referência às características julgadas como necessárias para a composição desse perfil. No entanto, tem-se observado pouca atenção acadêmica aos educadores sociais que trabalham em contextos educativos não-formais, cuja atuação volta-se para o atendimento direto às demandas e problemas sociais da nação. No Brasil, as organizações não-governamentais, geralmente, são lócus de trabalho do educador social, que ainda comparece com um perfil profissional pouco definido para uma atuação específica a esse cenário. Este trabalho trata-se de um ensaio teórico que objetiva destacar a importância da atuação do psicólogo escolar na formação dos educadores sociais para a consolidação de sua identidade profissional. Primeiramente, visa-se apresentar a literatura da Psicologia Escolar crítica quando voltada a contextos de educação social direcionado às classes populares. Em seguida, sugere-se uma proposta de atuação do psicólogo escolar na formação do educador social a partir de três eixos de ação: (1) assessoria à elaboração de projetos pedagógicos criativos que busquem diferentes linguagens e formas de potencializar a aprendizagem humana; (2) escuta psicológica aos educadores, a fim de construir espaços de interlocução dos sentidos sobre situações de adversidade vivenciadas na atividade profissional; (3) momentos de estudos coletivos, orientados por conhecimentos específicos da ciência psicológica. Conclui-se que o psicólogo pode colaborar nos planejamentos de projetos sociais, na elaboração de políticas públicas, na formação de educadores, no apoio psicológico e na assessoria ao educador no enfrentamento de conflitos.

CONTROVÉRSIAS NO TRATAMENTO DAS FRATURAS CONDILARES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS - REVISÃO DE LITERATURA

PEREIRA, Ana Carolina Soares*; SOUZA, Wennya Karolliny Moreira; SOUZA, Raphaela Luiza Kich; CASTRO, Caio César de Siqueira; CORREA, Silvan; MADEIRA, Petrus Levid

Email: anacarolinasoaper@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

De forma geral os traumatismos faciais demandam uma atenção criteriosa dos que atendem, principalmente quando se trata de fratura condiliana em pacientes pediátricos. Estudos mostram que fraturas faciais em crianças são relativamente raras quando comparadas em

adultos, devido a fatores variáveis. O grupo de crianças com maior incidência de traumas compreende aquelas com idade superior a 5 anos, onde o contato com o meio externo se torna mais independente e desprotegido. Outro fator que explica tais resultados se dá por características anatômicas em crianças menores, como a presença de ossos mais elásticos, menor distância da queda devido à altura, espessa cobertura de tecido mole e tamanho aumentado do crânio. A grande preocupação com as fraturas condilares pediátricas deve-se as graves sequelas que estes traumas ocasionam em função do desenvolvimento e crescimento ósseo até a vida adulta, considerando o potencial de remodelação dos ossos. Fraturas com pequenos desvios podem ser tratadas de forma conservadora, já os grandes desvios requerem uma intervenção através de redução e estabilização. Na literatura, diversos tratamentos estão dentre as opções disponíveis ao cirurgião, como a fixação rígida por meio de materiais de liga de titânio, que constituem o método padrão da abordagem cirúrgica, e o uso de materiais de fixação reabsorvíveis, que têm se disponibilizado como uma nova opção na manipulação de fraturas faciais pediátricas. A terapia padrão apresenta prognóstico satisfatório, entretanto, autores questionam sua eficácia quando relacionada ao crescimento ósseo. Nenhum tratamento traz um prognóstico completamente satisfatório. Sendo assim, o melhor tratamento ainda é a prevenção.

CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

CARVALHO, Vivian Aragão*; GALENO, Maria De Fátima Rocha; SANTOS, Helena Silva; FERRES, Letícia De Kássia Costa; MELO, Suzana Cardoso De; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; SANTIAGO, Lília De Cássia Piedade.

Email: vivslevita@outlook.com

Curso: Enfermagem

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade preparada para uma assistência curativa, contribuindo para o prolongamento da vida e controle da morte. Logo, os Cuidados Paliativos ou Paliativismo, se baseia na visão da ortatanásia, onde se caracteriza pela morte em seu tempo natural, querendo trazer ao indivíduo um limiar de uma terapêutica mais curativa, para uma assistência focada em garantir seu bem estar e conforto. O objetivo principal do Paliativismo era restritamente focado em pacientes onde a cura se tornou algo inalcançável. Contudo, nos dias atuais essa terapêutica é estabelecida desde a fase inicial de determinadas doenças graves até sua fase final, podendo ou não haver possibilidade de cura. Quando nos referimos aos cuidados paliativos na UTI, diferem-se daqueles prestados em outros setores hospitalares. O foco passa a ser na qualidade de vida do cliente e de sua família. Porém, sabemos que nessa unidade são admitidas pessoas com enfermidades mais graves e que o nível de óbitos se torna mais comum,

logo é imprescindível proporcionar uma atenção mais específica, cautelosa e integral para o paciente, evitando uma morte sofrida e desgastante. Todavia, com esse estudo foi possível proporcionar a reflexão sobre a importância dos cuidados paliativos para pacientes que estão internados na UTI. Além disso, ressalta-se a relevância de atividades educativas no âmbito profissional com o objetivo da educação permanente e aprimoramento em relação ao cuidado paliativo para pacientes de UTI, levando em consideração não somente as dimensões físicas, mais também as psíquicas, sociais e/ou espirituais.

DENGUE, ZIKA VÍRUS, CHICUNGUNYA E ASPECTOS CLÍNICOS ORAIS

SILVA, Maressa Keila de Souza; LEÓDIDO, Victor Machado; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos

Curso: Odontologia

Email: mgmaressakeila@gmail.com

É de conhecimento público há muitos anos que o *Aedes aegypti* é responsável pela transmissão da dengue, que consiste em uma doença infecciosa. Recentemente foi descoberto que esse mosquito também é o responsável pela transmissão da chikungunya e zika vírus, o que tem despertado grande preocupação da população. Apesar de possuírem vetor em comum, os vírus, algumas características e suas consequências são diferentes. Poucos são os estudos encontrados sobre essa situação, porém podem-se observar em alguns casos sinais clínicos e manifestações maxilo facias, que consistem em aftas, boca seca, lesões e sangramento gengival. Essas manifestações no sistema estomatognático evidenciam a importância do conhecimento por parte do cirurgião dentista sobre a dengue, zika vírus e chikungunya, pois quando prestarem atendimento a tais casos, esses problemas poderão afetar ou necessitar de tratamento odontológico, além de que tais manifestações podem ser auxiliares no diagnóstico das doenças quando não há o conhecimento sobre a sua presença.

DELINQUÊNCIA JUVENIL, ABANDONO E MEDIDAS PROTETIVAS NO ESTADO DO MARANHÃO

BARROS, Jozielma Bastos da Silva*; DE BRITO, Antonia Thacyara Dias; DA SILVA, Paula Rayssa Nogueira; MARTINS, Kassia de Sousa; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado

Email: Jozielma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Violência praticada por crianças e adolescente tem sido constantemente exibida pela imprensa o que tem preocupado diversos pesquisadores de diferentes áreas no sentido de estudar esses processos. Na presente revisão discutem-se como os fatores de riscos como a exposição à criminalidade e a violência podem levar a criança e o adolescente a terem conflitos com a lei. Identificar a incidência da população infanto-juvenil em conflitos com a lei no

Maranhão. Baseia-se em um levantamento sobre estudos publicados sob a temática em questão e análise documental dos últimos relatórios da FUNAC e do Mapa da violência no estado do Maranhão. A população infanto-juvenil constitui-se como um dos seguimentos mais prejudicados. O relatório anual da FUNAC de 2015 constatou-se dos 1.849 atos infracionais destes configuraram-se o roubo o mais praticados 1.400 (76% dos casos) os demais com relevância foram: homicídios 6,96%; furto 3 %; latrocínio 3,7%. Em relação ao perfil observa-se uma prevalência 99% afrodescendentes (93% negros e 6% pardos). Observou-se que nesse período foram registrados 1.355 adolescentes em cumprimento de medidas de liberdade, sendo: 1.286 que cumpriram medida socioeducativa de internação e 69 cumpriram medidas no regime de semiliberdade. Diante dos dados é possível constatar que o índice de atos infracionais cometidos pela população infantojuvenil no Maranhão ainda é um percentual significativo e, além disto, tem trazido uma série de danos para famílias desses jovens e para a sociedade. Palavras-chaves: Criminalidade, Crianças e adolescentes, Vulnerabilidade social.

DESMISTIFICANDO A TÉCNICA ANESTÉSICA POR VIA EXTRAORAL

CARNEIRO, Lucas Almeida*; FERRO, Amanda Costa; CORREA, Silvan.

Email: LUCAS.ALMEIDA.CARNEIRO@HOTMAIL.COM

Área/Especialidade: Odontologia

O uso da anestesia por via extraoral é pouco explorado, dessa forma, sua utilização se tornou restrita apenas para casos que há impossibilidade da anestesia intraoral por fatores que limitam a abertura de boca, estes, principalmente associados à insegurança e falta de conhecimento do operador em relação à técnica. Portanto, o presente estudo foi realizado através de uma minuciosa revisão de literatura especializada de periódicos nacionais e internacionais dos últimos cinco anos, com o intuito de destrinchar as diversas técnicas da anestesia extraoral, em toda sua abordagem, dando ênfase na especificidade de sua utilização e indicação bem como referências anatômicas que norteiam sua aplicabilidade, evitando determinadas situações indesejadas no trans-cirúrgico. A partir do exposto, fica claro a importância da maior abordagem literária sobre o tema visando a suplantação deste método no dia-a-dia clínico, ressaltando que os maiores desafios a serem superados por parte dos profissionais e acadêmicos é a confiança e conhecimento técnico-científico em relação a esta técnica

DOENÇAS DA INFÂNCIA E SUAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS

JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins Junior; SILVEIRA, Luíza Carneiro; JUNIOR, Francisco Valcy Moreira de Oliveira; COSTA, Matheus Leonel; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: odontologia

Email: marcelomartins602@gmail.com

Resumo: Manifestações bucais decorrentes de algumas patologias são bastante comuns e podem ser os primeiros sinais de doenças e alterações sistêmicas. As lesões bucais podem ser o primeiro indicativo da patologia, com isso é de suma importância que o cirurgião-dentista tenha conhecimento das manifestações bucais de doenças infectocontagiosas que acometem principalmente crianças, visto que as alterações na cavidade bucal podem anteceder as erupções cutâneas e possibilitar um diagnóstico precoce. Catapora, caxumba, herpes simples, rubéola e sarampo são exemplos de doenças que podem ter seu diagnóstico antecipado, principalmente pelo fato de que essas doenças podem ser confundidas entre si, por terem sintomas em comum, como febre, dor de garganta e falta de apetite. Com isso é relevante o papel do cirurgião-dentista na identificação das alterações bucais do paciente pediátrico, uma vez que elas podem ter seu tratamento realizado de maneira precoce, por conta da identificação das lesões bucais que sugeririam ao profissional de saúde a possibilidade de tais enfermidades.

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO NOTIFICADA

DOS SANTOS, Hellen Di Paulla Correa*; ARAÚJO JUNIOR, Antonio Alves; LIMA, Sara Fiterman; SOUSA, Anna Carolyn de Anchieta; REIS, Livia Mariane Castelo Branco; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: hellendipaulla@hotmail.com

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) representam um agravo de grande importância à saúde pública estando entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde no mundo. Neste trabalho, objetivou-se a identificação das características da população notificada por DST em um Centro de Saúde do Município de São Luís, durante o ano de 2012, identificando suas características e a distribuição das principais infecções sexualmente transmissíveis. Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, com abordagem quantitativa. As informações foram coletadas através da utilização da ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), na versão impressa e analisadas através de tabelas e gráficos. Totalizou-se 1.035 notificações por DST, e, a partir destas, foi constatado que a maior parte da população foram acometidas pelo HPV (52,03%), pertenciam ao sexo feminino (72,85%), com faixa etária entre 20 e 30 anos (34,69%), da raça/cor parda (34,49%), possuíam ensino fundamental completo (36,23%) e residiam no Município de São Luís (85,31%). Os resultados indicam que, apesar de todo o investimento realizado no sentido de prevenir e conscientizar a população, ainda continuam a crescer os números de casos por DST.

ESTUDO NA ALTERAÇÃO DE COR NAS RESINAS COMPOSTAS

DE SOUZA, Brigida Valeria Rodrigues*; KUSSANO, Sandro Carvalho;

Curso: Odontologia

Email: bri-souza@hotmail.com

A grande procura por tratamentos estéticos e restauradores tem feito com que a resina composta seja o material mais intensamente pesquisado na última década, buscando melhorar suas propriedades negativas além de mencionar as perspectivas para esses compostos. Existem hoje no mercado diversas resinas com composições, formatos e escoamento variado, surgidas durante esse processo evolutivo mas ainda há uma grande dificuldade de se encontrar uma resina composta que não cause pigmentação nas restaurações estéticas. O manchamento está relacionado com a penetração dos corantes contidos nos alimentos e bebidas ingeridas, e também pode estar co-relacionada com a má higiene oral pois a placa bacteriana provoca a deteriorização da resina, facilitando seu manchamento. Contudo, esse estudo avalia determinadas resinas compostas submetidas ao contato direto com soluções potencialmente corantes para avaliar o grau de pigmentação que o material apresenta em um espaço de tempo

EXERCÍCIO FÍSICO NA REABILITAÇÃO EM PACIENTES REVASCULARIZADOS.

SOUZA, Phabullo Rocha de; ARAÚJO, Ana Eugênia Ribeiro de; QUINTANILHA, Laura Mourão; GAMBACI, Bruno Bavaresco; SAUAIA, Bismarcke Ascar; ALMEIDA, Fabiano de Jesus Furtado; NINA, Vinicius José da Silva

Curso: Educação física

Email: phabullorocha@hotmail.com

Resumo: O exercício físico contribui de forma importante na reabilitação cardíaca. O objetivo desta revisão foi investigar a influência do exercício físico na reabilitação cardíaca pós-revascularização do miocárdio. A pesquisa bibliográfica foi realizada no período entre 2010 a 2016 na base indexada Pubmed, sendo inclusos estudos clássicos e guia de recomendações, levando em consideração características do tipo de estudo, programas de exercício e duração da pesquisa. Dentre os estudos selecionados, o tamanho da amostra variou entre 15 e 100 pacientes, com média de idade de 54 a 64 anos. Os estudos que utilizaram o modo de exercícios aeróbicos tiveram duração entre 4 a 12 semanas e intensidade de 60 a 80% da frequência cardíaca de reserva com tempo de 20 a 60 minutos por sessão. Quanto aos estudos que adotaram o treinamento de força como estratégia não farmacológica, a intensidade foi aplicada com base na escala de Borg (0 a 13) e 50 a 60% de 1 RM. Embora ainda haja discussões sobre quais seriam as modalidades de exercício e a sua respectiva magnitude para melhores efeitos

de proteção nos riscos de morbimortalidade nessa população, os resultados indicaram que o exercício físico exerce uma função benéfica na reabilitação de pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca

EXODONTIA ATRAUMÁTICA

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Rocha*; BASTOS, Andrezza Maciel

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

A perda dentária constitui-se em um fenômeno que apresenta impacto negativo sobre a qualidade de vida do indivíduo. Ao longo dos anos, técnicas exodônticas atraumáticas, vieram ganhando destaque, podendo vir a se tornar em um futuro bem próximo, padrão para a remoção de dentes. Com a crescente modernização da implantodontia, a exodontia atraumática tem se tornado cada vez mais imprescindível. Além do sucesso na região estética, a escolha pela técnica de exodontia atraumática também permite posição, angulação e profundidade adequadas para os implantes, mantendo altura óssea e uma largura desejável de crista alveolar, diferentemente do que ocorre em casos de exodontia convencional com perda tecidual óssea e injúria periodontal. O objetivo desse trabalho é evidenciar as vantagens da intervenção cirúrgica minimamente traumática, obtendo melhor resultado em preservação de estrutura alveolar e de tecidos periodontais, em comparação com a técnica convencional de extração dental.

EXODONTIA ATRAUMÁTICA: QUANDO INDICÁ-LA

ABREU, Wagner Costa Seixas*; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: WSEIXAS94@ICLOUD.COM

Área/Especialidade: Odontologia

O osso alveolar é uma estrutura dependente do dente, o perfil e o volume do processo alveolar são influenciados pela forma do dente. Depois da exodontia, o rebordo alveolar sofre mudanças significativas, em um ano, aproximadamente 50% da dimensão buco-lingual do rebordo se perderá. Com isso novas técnicas reabilitadoras protéticas tem sido desenvolvidas no intuito de diminuir o tempo de tratamento, assim como o trauma cirúrgico dos pacientes. Além disso, minimizam agravos psicológicos, principalmente em regiões com envolvimento estético. A exodontia atraumática através do uso do extrator radicular Neodent é uma alternativa rápida e segura na reabilitação de dentes condenados, pois permitem preservação da parede óssea. Assim, conseqüentemente, regredindo a reabsorção óssea associado com a alternativa de implantes com carga imediata, mantendo assim a estética, a qualidade do osso alveolar e submetendo o paciente por menos procedimento cirúrgicos e traumas.

EXTRUSÃO ORTODONTICA COM FINALIDADE PROTETICA:

BARROS, Caian Plinio Almeida*; ABREU, Wagner Costa Seixas; OLIVEIRA, Eurielva; FALCAO, Tarcia.

Email: dededigues@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

A extrusão ortodôntica de uma raiz residual viabiliza o tratamento endodôntico e, posteriormente, o trabalho protético. É uma opção viável que evita a realização da exodontia de tal elemento em virtude de grandes destruições coronárias, fraturas transversais na porção radicular, dentre outras situações. O objetivo dessa revisão, foi elucidar sobre as formas adequadas de tracionamento e a importância dessa mecânica para que os tratamentos posteriores pudessem ser realizados com o espaço biológico readequado, afim de se obter um resultado estético satisfatório em dentes anteriores. PALAVRAS-CHAVE: Extrusão ortodôntica. Endodontia. Raiz residual.

FACETAS E LENTES DE CONTATO DENTAIS: ASPECTOS DIFERENCIAIS E INDICAÇÕES

CARVALHO, Sanalle Luiza Baêta*; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; MOUCHREK, Monique Maria Melo; BRUZACA, Karoline Guara; KUSSANO, Sandro Carvalho; CARNEIRO, Karina Gama Kato.

Email: sanalle.luiza@hotmail.com

A odontologia restauradora progrediu de forma intensa nos últimos anos, tanto em técnicas quanto em materiais. Atualmente, a dentística restauradora permite grandes resultados estéticos e funcionais com alto nível de qualidade dentro de um relativo curto período de tempo. Com inúmeras possibilidades no mercado, deve-se ter uma atenção maior para as particularidades de cada opção disponível, permitindo que seja escolhido o melhor tratamento para cada caso individualmente. As lentes de contato dentais e as facetas de Iporcelana são alternativas muito eficientes quando se considera estética odontológica. Ambas são laminados cerâmicos, diferenciadas pela espessura do material e técnica empregada para cada uma. A Faceta é uma lâmina com alguns milímetros que é cimentada na face vestibular do elemento dental e permite a correção da cor, tamanho, e discreto realinhamento dos dentes, exigindo desgaste dental. As lentes de contato dentais são mais finas e têm função de corrigir manchas superficiais que permanecem após alguns procedimentos, e ligeira correção de cor e forma dos dentes, sem nenhum ou pouco desgaste. Facetas e lentes de contato dentais são designadas para tipos de tratamento diferentes, mas com o mesmo objetivo de oferecer um sorriso mais harmônico e agradável ao paciente.

FECHAMENTO DE FÍSTULA OROANTRAL EM PACIENTE VÍTIMA DE PAF

GASSMANN, Hildenesa*; SILVA, Natyla Maysa de Lima; MACIEL, Andreza de Almeida Bastos; DE MORAIS, Helio Clauber Freitas; BARRETO, Samuel Benson Barreto

Email: hildenesa@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Paciente sexo feminino, natural de São Luís - MA, 45 anos vítima de PAF em face com perfuração em palato há 20 anos, com projétil alojado em região próximo a vértebra C5. Paciente realizou quatro procedimentos cirúrgicos para correção de comunicação oroantral sem obter sucesso. Foi realizada nova consulta onde ficou evidenciada a comunicação corrigida com obturador palatino, além de estomatite devido à má higiene oral por conta do uso do obturador. Sendo solicitados exames pré-operatórios e prescrito Periogard 0,12% e Nistatina oral para tratamento da estomatite. Como procedimento cirúrgico foi proposto a paciente palatoplastia com uso de retalho palatino.

HPV: A VULNERABILIDADE DO SEXO FEMININO PARA DESENVOLVER A DOENÇA

JUNIOR, Antonio Alves de Araújo*, DOS SANTOS, Hellen di Paulla Correa; RODRIGUES, Cianna Nunes; SANTIAGO, Lilia; NORONHA, Francisca Maria Ferreira

Curso: Enfermagem

Email: tonyjunior1996@hotmail.com

A infecção pelo HPV, é considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade, com maior prevalência no sexo feminino, sendo responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo uterino e 50% das neoplasias intraepiteliais de grau III. O papilomavírus humano (HPV) é um agente infeccioso que se manifesta através de lesões conhecidas como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. É um vírus de transmissão frequentemente sexual, em que ambos os sexos, podem ser acometidos pelo vírus, sendo os homens considerados os principais responsáveis pela transmissão sexual às mulheres, pois estes em geral apresentam as formas subclínica e assintomática da doença. Neste trabalho, teve-se por objetivo avaliar o conhecimento, o ponto de vista e a maneira como as mulheres lidam com o diagnóstico de HPV. As informações foram coletadas através de dados obtidos por fontes secundárias, na base de dados SciELO. Trata-se de uma revisão de literatura com estudo do tipo descritivo e com abordagens de pesquisas bibliográficas, foram selecionados artigos que convergiam para uma mesma linha de raciocínio. Diante dos resultados, nota-se a necessidade de introduzir práticas seguras em relação à prevenção do HPV, e a realização de uma abordagem mais significativa para as mulheres, induzindo-as na construção de conceitos e opiniões que assegurem o

empoderamento feminino e estimulem a não omissão em relação ao seu parceiro, seja ela portadora ou não do vírus.

IDENTIDADE E PATOLOGIZAÇÃO: A PSICOLOGIA FRENTE A PESSOAS DE IDENTIDADE TRANS

ROCHA, Jefther Felipe Lima; SILVA, Juliana Alves da; VIEIRA, Ana Paula Alves; COSTA, Mônica Maria Bezerra; PRAZERES, Almerinda Botelho; VIETH, Giovana Duailibe de Abreu

Curso: Psicologia

Email: jefther.felipe@yahoo.com.br

Resumo : O presente trabalho visa discutir o posicionamento da Psicologia frente a pessoas que se identificam como pertencentes à identidade trans. Ao posicionar-se acerca de questões referentes ao seu próprio corpo e a identidade de gênero, a Psicologia busca despatologizar a experiências de indivíduos transexuais. Por meio de revisão bibliográfica, perpassa-se pelos conceitos de gênero, identidade de gênero, transexualidade e patologização. Ademais, analisa-se o posicionamento, movimentos, orientações e disposições do Conselho Federal de Psicologia acerca da atuação profissional psicólogo frente a pessoas que se submetem à cirurgia de redesignação sexual. Percebe-se que o trabalho do profissional de Psicologia deve ser pautado no respeito à diversidade, não patologização, humanização e integralidade do atendimento, e promoção de saúde e bem-estar a indivíduos trans.

INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL E PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL

DA SILVA, Paula Rayssa Nogueira*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; SOUSA Erica Louzeiros; SANTOS, Maria da Graça Pereira; DO CANTO, Julia Araujo Silva; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado;

Email: josylma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: É evidente o crescimento do índice de atos de violências cometidas por menores infratores, uma realidade cada vez mais comum. No entanto, é importante compreender os fatores que levaram a tais atos e sobre a necessidade de medidas preventivas de saúde. Configura-se a pesquisa bibliográfica e descritiva. Partiu-se da análise de 15 artigos disponíveis nas bases de dados: Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Este estudo visa descrever como ocorrem os processos de diagnósticos, promoção e prevenção de saúde dos sistemas de reeducação de menores infratores. Constatou-se nos estudos a visão dos profissionais a respeito da cidadania destes sujeitos, e como eles atuam diante de diagnósticos de transtorno mental. Alguns estudos têm analisado como são aplicadas intervenções psicossociais, nesse processo uma vez que o tratamento efetivo necessita da real compreensão de um transtorno de sua

etiologia multifatorial, visto que engloba as diversas facetas deste tipo de problema. As pesquisas mostram a importância do profissional da psicologia em de ações de prevenção e no acompanhamento dos casos de transtornos mentais e nos graves comprometimentos psicológicos que provocam comportamentos agressivos, abusivos e ilegais que podem diminuir ou evoluir de gravidade de acordo com a forma de tratamento. Palavras -chave: Sistema prisional, Psicologia , Direitos Humanos, Saúde mental.

LESÕES ORAIS MAIS FREQUENTES EM PACIENTES INFECTADOS PELO HIV

SILVA, Maressa Keila de Souza*; SILVEIRA, Luiza Carneiro; JUNIOR, Marcelo Mesquita Martins; SILVA, Gabriela Barbosa Bezerra da; COELHO, Aline Rocha; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos;

Email: mgmaressakeila@gmail.com

Curso: Odontologia

A principal característica do vírus da imunodeficiência humana consiste na diminuição progressiva da imunidade celular e conseqüentemente o aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas, a infecção compromete o sistema imune de maneira sistêmica, inicialmente a infecção por HIV pode apresentar-se de forma assintomática ou com uma resposta aguda. Lesões maxilofaciais estão fortemente associadas a esta infecção, as manifestações orais mais comuns são as primeiras a serem apresentadas, por isso podem ser de grande valor no diagnóstico da doença. Estas manifestações mais comuns correspondem a candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, herpes simples, linfoma não-Hodgkin, doenças gengivais e periodontais. Recentemente tem-se feito grandes avanços no tratamento para infecção por HIV, em alguns casos o mesmo torna-se quase indetectável, a partir deste pressuposto entende-se a extrema importância do cirurgião dentista nestes casos, pois além de necessitarem de tratamento para melhores condições orais, os pacientes poderão detectar a infecção a partir da associação destas lesões com a possibilidade da infecção por HIV.

MANEJO DAS AVULSÕES DENTÁRIAS TRAUMÁTICAS EM DENTIÇÃO PERMANENTE

OLIVEIRA, Rita De Cassia Da Rocha*; MARQUES, Tarcia Virginia Falcao

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica que necessitam de atendimento clínico criterioso e rápido. A incidência de injúrias traumáticas varia entre 4 a 30% na população em geral, sendo as por luxação as mais comuns. A avulsão de dentes permanentes é a mais séria de todos os tipos de traumatismos dentários representando de 1 a 16% destas injúrias. O prognóstico depende das medidas tomadas no ato do acidente ou imediatamente após sua ocorrência e o reimplante é o tratamento de escolha. Considerando que o prognóstico depende das medidas executadas no ato ou imediatamente após a avulsão dentária traumática, elaborar e/ou conhecer e manter atualizado um Protocolo Clínico para o atendimento destes casos e segui-lo, criteriosamente, é crucial para prover resolutividade aos pacientes vitimados por essas ocorrências. Cabe ressaltar que parte dos pacientes acometidas pela avulsão dental encontra-se em processo de desenvolvimento ósseo facial e esse fato deve ser considerado durante a formulação do plano de tratamento. Dessa forma, esse trabalho tem a finalidade de apresentar protocolo clínico para manejo das Avulsões Dentárias Traumáticas em Dentição Permanente.

MANIFESTAÇÕES LOCAIS E SISTÊMICAS DA ERUPÇÃO DENTAL.

MARCELIANO, Camila*; VIEIRA Clarissa;

Curso: Odontologia

E-mail: camilamarceliano@bol.com.br

A palavra “erupção” é derivada do latim erode, que significa “irromper”. Considerando o significado estrito do termo “erupção dentária”, poderia ser definido como sendo a incisão da gengiva realizada pelo dente. Poucos dias antes do irrompimento do dente na cavidade bucal, geralmente ocorrem manifestações locais e/ou sistêmicas. Dentre as manifestações locais, as consideradas mais frequentes são: Salivação abundante, prurido, edema local e eritema gengival, as inflamações gengivais, a hiperemia da mucosa, os cistos de erupção e úlceras bucais. Já a sintomatologia sistêmica os mais comuns são: aumento da temperatura, tosse, corrimento nasal, apatia, diminuição do sono, convulsões e herpes. Essas manifestações não estão ligadas apenas à erupção dos dentes, mas a um conjunto de fatores que ocorrem simultaneamente a ele. Contudo, ainda não existe um consenso na literatura e entre médicos pediatras e odontopediatras se a sintomatologia na fase de erupção dos dentes decíduos é originária do próprio desenvolvimento fisiológico da criança ou se faz parte de um processo fisiopatológico relacionado à erupção dentária. Assim este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura para tentar esclarecer aos profissionais o “porquê” de cada manifestação local e sistêmica e como tais manifestações ocorrem no período de erupção dentária, para que os pais e responsáveis da criança saibam acalmar e informar os pais e responsáveis da criança sobre tais fatores.

MANIFESTACOES SINTOMATOLOGICAS DO EFEITOS DISSULFIRAM

ABREU, Wagner Costa Seixas Abreu*; BARROS, Caian Plinio Almeida ; MARCUS Eduardo Costa Seixas Abreu; MACIEL, Andrezza Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima

Email: WSEIXAS94@ICLOUD.COM

Área/Especialidade: Odontologia

O efeito Dissulfiram é bastante conhecido no meio farmacológico devido a sua associação de sinais e sintomas simultaneamente. Consiste na cadeia de reações resultantes da administração de metronidazol com o álcool. Há bastante controvérsias na literatura sobre seus efeitos e grau de severidade. O objetivo dessa região de literatura, é esclarecer mitos e verdades sobre essa reação e elucidar sobre a importância da conscientização do uso indiscriminado de álcool durante qualquer terapêutica medicamentosa. PALAVRAS CHAVE: METRONIDAZOL, ÁLCOOL, DISSULFIRAN

MEDICALIZAÇÃO DA EXISTENCIA

CHAVES, Jessica Bastos*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; SILVA, Thassya Ines Mendonça; SILVA, Ciane Cabral; AQUINO, Daiane Rose Cunha Bentivi

Email: jessycabastos@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Freud demonstrava a preocupação com a chegada do dia em que medicamentos causassem uma drástica mudança em nossos espíritos. Neste dia, segundo ele, a Psicanálise sendo uma terapia cara e demorada fosse substituída por essas novas práticas (tratamento baseado apenas em remédios) . Estudo bibliográfico baseado na análise de 10 artigos científicos, disponíveis nas bases de dados: SCIELO e Google Acadêmico. Considerou-se os artigos que tratava da temática publicados em português a partir de 2010 .Este é o fenômeno da “medicalização da existência”que atualmente está muito presente na nossa sociedade e preocupa justamente por colocar remédios á frente do trabalho terapêutico. Em uma sociedade imediatista como a que vivemos, as pessoas querem resolver seus problemas existenciais de forma rápida e precisa assim evitam a experiência da terapia por achá-la longa, profunda e por vezes dolorosa demais. Encontram nas farmácias drogas capazes de fornecer o alívio imediato a que tanto almejam e perdem-se nessa possibilidade superficial de sanar seus problemas. Sabemos que existem medicamentos que podem auxiliar nos problemas com eficácia e neste sentido cabe reconhecermos importância dos remédios desde que usados com parcimônia e aliados quando necessário à terapia. Existem vários tipos de medicamentos, como por exemplo, antidepressivos, anticonvulsivos e até estabilizadores de humor. O conhecimento dessas opções

e a facilidade de conseguir tais remédios, mesmo que burlando as leis, induzem os pacientes a manifestarem impaciência com seus analistas, exigindo resultados imediatos

MIÍASE TRATAMENTO E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS

ABREU, Wagner Costa Seixas*; ABREU, Marcus Eduardo Costa Seixas; MACIEL, Francisco Jose Lima ; DE AZEVEDO, Guilherme Cortez

Email: WSEIXAS94@ICLOUD.COM

Área / Especialidade: Odontologia

A miíase é uma infecção de pele causada por larvas de moscas que são depositadas em tecidos cutâneos necrosados ou não, bastante frequente em países tropicais e subtropicais, como os da América Central, América do Sul, África e componentes das Ilhas do Caribe, a doença acaba afetando mais as pessoas dos países subdesenvolvidos na maioria das vezes, por não terem o devido saneamento básico e as condições básicas de higiene, esse trabalho visa mostrar suas classificações, sintomatologia, complicações e tratamento

MORDIDA ABERTA ANTERIOR: DA ETIOLOGIA A RESOLUÇÃO CLÍNICA.

DOS SANTOS, Reginaldo Victor Pereira*; VERAS, Marcela Viégas; ; LIMEIRA, Herick Cruz; BRAMANTE, Fausto Silva; VERCLINO, Célia Regina Maio Pinzan;

Curso: Odontologia

Email: regisrvps@outlook.com

A mordida aberta anterior (MAA) é uma anomalia na cavidade bucal caracterizada pela falta de contato vertical entre os dentes do arco superior e inferior, um desvio na relação vertical entre os maxilares, sendo tal abertura de diferentes magnitudes que variam de acordo com o paciente. A MAA tem diversas etiologias que acabam interagindo para seu desenvolvimento, como: irrupção incompleta dos dentes anteriores, má posicionamento da língua, interposição labial, hábitos de sucção, deglutição atípica com interposição lingual, respiração bucal e padrão de crescimento vertical. Podem ser classificadas em dentárias, quando envolvem somente os dentes, dentoalveolares, quando acometem dentes e rebordo alveolar e as esqueléticas, que envolvem estruturas ósseas e/ou craniofaciais. Possui uma incidência relativamente alta e pode se manifestar precocemente. Após seu diagnóstico deve ser tratada o mais breve possível, para possibilitar um tratamento mais conservador e com boa estabilidade pós tratamento. Este trabalho tem como objetivo demonstrar essa má oclusão, em paciente de 13 anos de idade, portadora de hábito de sucção de polegar. Foi tratada com grade palatina, aparelho fixo e elásticos verticais. Ao fim devolveu-se a estética dentofacial e a função mastigatória.

MORDIDA ABERTA ANTERIOR: ETIOLOGIA E TRATAMENTO PRECOCE

CUTRIM, Andressa Costa*; CAVALCANTI, Karoline Guar Brusaca Almeida; FIALHO, Melissa Proena Nogueira

Email: ddssacutrim@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A mordida aberta anterior  um tipo de m ocluso que pode ser definida como um trespassse vertical negativo entre as bordas incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores, e que mais acomete o aspecto esttico-funcional, alm de trazer consequncias nas alteraes dentrias e esquelticas. Ela est relacionada com diversos fatores etiolgicos envolvidos, por isso  uma m-ocluso difcil de ser tratada e de possveis recidivas. Em pacientes jovens torna-se de fcil soluo quando interceptada o mais cedo possvel. J nos adultos, a mordida aberta possui muitas limitaes e o tratamento pode ser cirrgico. A busca da identificao dos fatores determinantes e seu controle ou eliminao  que indicará o sucesso do tratamento. A interveno dessa m ocluso deve ser feita o mais precocemente possvel, com mtodos preventivos e teraputicos adequados. Existem diversos tipos de aparelhos que podem ter um prognstico favorvel para esse tipo de situao, alm de uma abordagem multidisciplinar para a manuteno da ocluso normal obtida pelo tratamento ortodntico.

MORTALIDADE POR LINFOMA NO-HODGKIUN NO ESTADO DO MARANHO

GARCEZ, Marcos Vincius Maciel*; DUARTE, Rositnia Alves; PIRES, Rmulo Csar Rezo; MOURO, Thaianne Polanna de Carvalho; VIEIRA, Clarissa Lopes

Curso: Odontologia

Email: garcez27@hotmail.com

Os Linfomas constituem um grupo heterogneo de doenas malignas responsveis por 3-4% de todos os cnceres no mundo. No Brasil, o linfoma  a segunda neoplasia mais incidente em menores de 19 anos. Entre as regies brasileiras, o nordeste apresenta as maiores magnitudes de variao percentual de aumentos em bitos. Este trabalho tem como objetivo principal fazer uma reviso bibliogrfica sobre mortalidade dos linfomas No-Hodgkin (LNH) no Maranho. A taxa de mortalidade por LNH tem aumentado consideravelmente nos ltimos anos, principalmente em pases desenvolvidos. Vrios fatores esto relacionados a este aumento, tais como melhoria na captao dos registros e no diagnstico de cncer, alm de fatores socioeconmicos. Entre as regies brasileiras, a nordeste vem apresentando as maiores taxas de mortalidade, principalmente em homens com faixa etria superior a 40 anos. Estudo realizado no Maranho aponta aumento crescente na taxa de mortalidade por LNH entre os anos de 2004 e 2014, registrando sua maior taxa em 2013 (1,09) e menor taxa no ano de 2005

(0,59). Estudos apontam que países em desenvolvimento podem apresentar maior incidência de LHN. Alguns pesquisadores sugerem que fatores socioeconômicos tenham estreita relação com o desenvolvimento da doença. No Brasil, houve aumento na taxa de mortalidade nos últimos anos e o nordeste apresentou a quarta maior taxa de mortalidade no período de 2009 – 2012. O Maranhão registrou aumento nas taxas de mortalidades o que poderia ter sido influenciado pelos fatores socioeconômicos já que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil com 63,5% da população pobre.

MULHER: CLIMATÉRIO E OSTEOPOROSE

SILVA, Dheny Antonia Martins*; RODRIGUES, Karla Regina Costa; DOS SANTOS, Erika Layane Privado; BARROS, Andreia Rocha; FERREIRA, Ana Maria Nunes; SANTIAGO, Lilia de Cassia Piedade

Email: dheny.msilva@hotmail.com

Curso: Enfermagem

Resumo: O objetivo do artigo foi reunir, de forma prática e clara, o maior número de informações atuais para identificar e correlacionar a relação entre climatério e osteoporose e as mudanças ocorridas neste período. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura nos bancos de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe e Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library (SciELO) e Cochrane, na base de dados do Public MEDLINE (PubMed), de caráter descritivo e exploratório. O climatério é a fase da vida da mulher em que ocorre a transição do período reprodutivo ao não reprodutivo. A osteoporose é uma doença óssea metabólica caracterizada pela diminuição da densidade mineral óssea que acometem em sua grande maioria as mulheres no período de climatério. O climatério está diretamente associado a patologias oportunistas que devido as alterações sofridas nesta fase acabam se instalando simultaneamente, dentre estas podemos citar a osteoporose que é bastante prevalente nesta fase da vida feminina devido a redução brusca de hormônios como estrógeno e progesterona.

NUTRIENTES NEUROPROTETORES NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

SANTOS, Mariana Sales dos; AZEVEDO, Camila Rodrigues; BELFORT, Iara Araújo; BARBOSA, Janaina Maiana Abreu

Curso: Nutrição

Email: marianasalesdossantos96@gmail.com

Resumo :Introdução: A doença de Parkinson e de Alzheimer são doenças incapacitantes, neurodegenerativas, progressivas, e com causas desconhecidas (SOARES et al., 2008). Que pode ter como consequência a Epilepsia, caracterizada por convulsões que podem produzir danos neurais em diversas áreas do cérebro. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes neuroprotetores estabelece relação direta com o sistema nervoso, já que as moléculas precursoras de neurotransmissores são provenientes dos alimentos (ZIEGLER, 2015). Revisão: Os dados obtidos foram direcionados a pacientes com morbidades neurodegenerativas. Verificou-se que a utilização de nutrientes neuroprotetores pode promover uma ação preventiva contra doenças do sistema nervoso. A vitamina E apresenta alto poder oxidante e o consumo precoce (iniciado na terceira década de vida) pode reduzir o estresse oxidativo e seus danos as células do cérebro de pacientes com Doença de Parkinson (SOARES et al., 2008). Em pacientes com Doença de Alzheimer, ocorre o déficit de acetilcolina, este neurotransmissor é encarregado da concentração, aprendizado e memória, sendo sintetizado a partir colina e lecitina e minerais como, zinco e cálcio (ANDRADE et al, 2012). A Vitamina C também tem um importante papel oxidante e exerce um poder terapêutico em pacientes epiléticos na proteção contra lesões cerebrais por meio da remoção de radicais livres formados, atuando diretamente na promoção de eventos neuroprotetores durante as convulsões (FREITAS et al, 2009). Conclusão: Uma alimentação rica com nutrientes neuroprotetores tem sido sugerida para diminuir eventos relacionados a danos cerebrais, podendo auxiliar no tratamento de doenças do sistema nervoso.

O IMPACTO DA QUALIDADE DE ÁGUA NA SAÚDE HUMANA (REVISÃO DE LITERATURA)

DOS SANTOS, Gleicy Roise Costa*; MARTINS, Gessica Maria; ALVES, Flavio Henrique Bezerra; SANTOS, Rayane Rabelo, ASSUNÇÃO; Maria Luísa Reis; DE SOUSA, Leila Cristina Almeida

Curso: Enfermagem

Email: leila-sousa@uol.com.br

Sabe-se da importância de se tratar a água destinada ao consumo humano, pois, é capaz de veicular grande quantidade de contaminantes físico-químicos e/ou biológicos, cujo consumo tem sido associado a diversos problemas de saúde. Assim, é necessário saber se a qualidade da água destinada ao consumo humano, responde as exigências da legislação. Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destacam o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística. O trabalho teve por objetivo analisar artigos e identificar os principais fatores que interferem na qualidade de vida da população que necessita do uso da água. Revisão: A rápida urbanização concentrou populações de baixo poder aquisitivo em periferias

carentes de serviços essenciais de saneamento. Isto contribuiu para gerar poluição concentrada, sérios problemas de drenagem agravados pela inadequada deposição de lixo, assoreamento dos corpos d'água e consequente diminuição das velocidades de escoamento das águas. Atualmente, a cada 14 segundos, morre uma criança vítima de doenças hídricas. Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada, e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas à água. Conclusão: a qualidade de água de abastecimento sofre inúmeros impactos, causando conseqüentemente a má qualidade da água, causando um impacto qualitativo na vida da população.

O QUE É NEUROPLASTICIDADE E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA EM UM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

DINIZ, Juliana Pinheiro*; JUNIOR, Edimilson da Silva Brandão; OLIVEIRA, Alessandra Cardoso Gomes; DUTRA, Grazielle Caldas; ALVES, Cândida Helena Lopes.

Curso: Psicologia

Email: juliana.dinniz@hotmail.com

A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso possui de organizar as redes neurais para aprender uma nova atividade. Portanto a neuroplasticidade tem um papel de extrema importância em caso de AVC (Acidente Vascular Cerebral), permitindo a transferência das funções representadas em áreas lesadas para áreas homólogas no hemisfério oposto, reabilitando e organizando o cérebro para a compreensão dos mecanismos de recuperação funcional. O tratamento e a reabilitação da pessoa vitimada por um AVC dependerá sempre das particularidades que envolvem cada caso. O presente estudo teve por objetivo explicar o que é neuroplasticidade e como ela atua em caso de AVC, pela visão da neurociência. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da consulta das bases de dados: PePSIC e Biblioteca Virtual em Saúde, no período de 2015 a 2016. Observa-se que o AVC está entre as principais causas de morte a nível mundial e é uma das patologias que mais incapacitam para a realização das atividades cotidianas. Por fim para que o risco de sequelas seja significativamente reduzido, é necessário que o atendimento seja iniciado imediatamente, evitando o prolongamento das primeiras 3 horas após o acidente. Assim o sistema nervoso procura restituir o funcionamento das atividades prévias numa outra área do cérebro, observa-se quanto mais o cérebro trabalha, mais fortalece as redes neurais, sendo este o principal mecanismo de reabilitação e recuperação funcional do indivíduo.

O USO DOS LOCALIZADORES FORAMINAIS NA ENDODONTIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

OLIVEIRA, Rita De Cassia Da Rocha*; MARQUES, Tarcia Virginia Falcão

Curso: Odontologia

Email: ritacaroliveso@hotmail.com

A correta determinação do comprimento real de trabalho (CRT) é um fator importante que corrobora no sucesso do tratamento endodôntico. Diversos estudos mostram que o uso de localizadores foraminais eletrônicos é recomendado devido a sua eficácia e benefícios quando utilizados na terapia endodôntica. O princípio de ação desses aparelhos está relacionado às propriedades que os tecidos orais apresentam quando submetidos a diversos componentes elétricos como resistência, frequência e impedância. Os localizadores foraminais podem ser utilizados em diversas situações na prática clínica, como nos tratamentos de dentes vitais e não vitais, assim como nos casos de retratamentos. Esses aparelhos possuem aplicabilidade clínica sendo utilizados em dentes decíduos e permanentes possuindo ainda diversas vantagens como a menor quantidade de radiografias realizadas durante o tratamento endodôntico e a diminuição do tempo despendido na determinação do CRT. O objetivo deste estudo é avaliar por meio de revisão da literatura a eficácia dos localizadores foraminais eletrônicos na determinação do comprimento real de trabalho durante a realização do tratamento endodôntico.

OBTURADORES BUCOMAXILOFACIAIS – UMA REVISÃO DE LITERATURA

GASMANN, Hildenesa*; SILVA, Natyla Maysa de Lima; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastol; MORAIS, Helio Claubert

Email: nathymaysa@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: Pacientes que sofrem de deformações faciais, sendo por acidentes, patologias ou deformidades congênitas, representa um desafio a ser superado diante do imenso efeito psicológico que tais deformações representam. Diante de tal problemática a prótese bucomaxilofacial que vem sendo descrita desde o século XVI, e que com o passar do tempo teve sua técnica aperfeiçoada, representa uma solução complementar ou alternativa. Tais próteses sejam com, função obturadora palatina e/ou auxiliaadoras de fala proporcionam uma melhor estética, fonação, mastigação e deglutição o que contribui favoravelmente para a saúde psicológica e convívio social dos pacientes. Portanto a busca de novas técnicas e materiais para o tratamento de tais deformidades é de fundamental importância para o sucesso do tratamento e futura reintegração do paciente à vida social e restabelecimento de função.

OVERDOSE E PARACETAMOL: QUAIS OS RISCOS?

SILVA, Natyla Maysa de Lima*; GASSMANN, Hildenesa; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima Maciel

Email: nathymaysa@hotmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Paracetamol também chamado de acetaminofeno, foi introduzido na década de 1950 e é um dos analgésicos não opióides mais utilizados em todo o mundo, possui ação antipirética além da sua propriedade analgésica. Muito se tem levantado a respeito da hepatotoxicidade do paracetamol, por ele ser classificado como hepatotóxico, sendo que essa hepatotoxicidade é resultado geralmente de situações específicas, sendo elas, uma overdose do medicamento, quando há uma demasiada ativação do sistema citocromo P450 (CYP) ou através da depleção dos níveis de glutathione do hepatócito, Dessa forma paracetamol com a ingestão de menos de 125mg/kg em adultos e quando o paciente busca evitar as situações que podem levar a essa problemática, o uso do paracetamol não caracteriza um risco relevante a mesma. Portanto cabe ao profissional analisar as condições físicas do paciente e se o mesmo pode correr risco de interação medicamentosa e o mesmo deve também colaborar não fazendo ingestão demasiada do paracetamol, para assim haver a solução do problema que o paciente apresenta de uma forma segura e que não haja comprometimento da saúde do mesmo.

OZONIOTERAPIA: UMA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM APLICAÇÃO EM ODONTOLOGIA

SOUZA, Rafaela Luiza Kich de; COSTA, Matheus Leonel; SOUZA, Wenny Karollynny Moreira; PEREIRA, Ana Carolina Soares; ZAGO, Patricia Maria Wiziack; GALVÃO, Livia Camara de Carvalho

Curso: Odontologia

Email: rafaela.luiza@hotmail.com

Resumo : Em dezembro de 2015, o Conselho Federal de Odontologia aprovou a resolução que reconhece e regulamenta o uso, pelo cirurgião dentista, da prática da Ozonioterapia. Legalizada em mais de treze países, essa abordagem terapêutica é baseada nas características únicas atribuídas ao ozônio, uma molécula composta de três átomos de oxigênio em uma estrutura dinamicamente instável. Dentre as propriedades descritas do ozônio, têm-se as ações bactericida, fungicida e virucida, justificando seu uso como esterilizante e desinfetante. Além disso, estudos demonstraram também efeitos antiálgicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e estimulantes do sistema imune. A partir disso, a Ozonioterapia demonstra aplicabilidades em diferentes especialidades da clínica odontológica: em periodontia e implantodontia é empregado principalmente como antimicrobiano local e regenerador tecidual; na cariologia representa alternativa não invasiva para o tratamento de lesões cáries incipientes; na

endodontia, atua no tratamento de pulpites; na cirurgia oral pode auxiliar a cicatrização de feridas. Apesar dos promissores resultados de utilização do ozônio para a prática clínica, é importante salientar que essa terapêutica não é isenta de efeitos adversos, e requer mais estudos com metodologias aprofundadas para uma conclusão precisa de sua aplicabilidade e dos protocolos para sua utilização.

PÊNFIGO VULGAR

DE OLIVEIRA, Viviane Cardoso Lima*; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Curso: Odontologia

Email: vivi_cslm@hotmail.com

O pênfigo vulgar é uma doença vésico-bolhosa crônica, rara, de natureza autoimune e com possibilidade de seguir um curso clínico preocupante, quando não diagnosticada e tratada na sua fase inicial. Usualmente, acomete indivíduos entre quarenta e sessenta anos de idade, sendo raro seu aparecimento em crianças. As manifestações bucais são, na maioria das vezes, os primeiros sinais da doença, tendo o cirurgião-dentista um papel fundamental no seu diagnóstico precoce. Em alguns casos, o paciente relata a presença de numerosas úlceras dolorosas espalhadas na cavidade bucal, com evolução, onde, primeiramente, surgem bolhas que se rompem rapidamente, dando lugar a ulcerações extremamente dolorosas. O indicado é a realização de biópsias incisionais das regiões de mucosa jugal e retromolar, além de hemograma completo, para se descartar a hipótese de um quadro de leucemia. Diante dos achados clínicos e histopatológicos, chega-se ao diagnóstico definitivo de pênfigo vulgar. Geralmente, pode-se ocorrer piora acentuada do quadro, antes do tratamento especializado, com exacerbação dos sinais e sintomas intrabucais e desenvolvimento de lesões cutâneas ao redor da superfície corporal.

PERFIL DOS FARMACÊUTICOS E DAS FARMÁCIAS DO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DE LACERDA, Yone Santana Sousa*; UCHOA, Michelle Russo Bendelak; SALOMÃO, Rondineli Seba

Curso: Farmácia

Email: yone_lacerda@hotmail.com

O farmacêutico é indispensável no estabelecimento de saúde, realizando atribuições nas farmácias, atuando de modo direto no uso racional de medicamentos, prestando atenção farmacêutica aos usuários. Diante da importância do farmacêutico, dispondo da atenção farmacêutica, e da necessidade das farmácias serem estruturadas para este fim, esta revisão

buscou analisar os indicadores de qualidade dessas estruturas. Os estudos demonstram que o perfil médio dos farmacêuticos é de formados e contratados a menos de cinco anos, atuando em drogarias de rede, tal perfil reflete a expansão dos cursos de farmácia no Brasil. As atribuições técnicas do profissional farmacêutico nas farmácias mais citadas foram dispensação, controle de estoque e de medicamentos controlados. Segundo os estudos a maioria das farmácias não apresenta estrutura mínima para realização de atenção farmacêutica, limitando a atuação clínica do farmacêutico, esta realidade é melhor vista nos estados do sul e sudeste, enquanto que o norte e nordeste, esta atuação acontece de forma incipiente. Em relação à atenção farmacêutica, a maioria das farmácias não possui um local reservado para a prestação dos serviços, como uma sala isolada, assim atendendo os pacientes em pé, no balcão. No que se refere à satisfação profissional, a maioria se sente insatisfeito com o salário, estrutura das farmácias e não ter envolvimento direto com a aquisição de medicamentos. Desta forma, concluímos que apesar de ser uma profissão antiga no Brasil, a farmácia ainda apresenta muitas deficiências para a sua atuação satisfatória, limitando a completa atuação do farmacêutico.

PERIIMPLANTITES: ETIOLOGIA, APRESENTAÇÕES CLÍNICAS E TRATAMENTOS.

DOS SANTOS, Reginaldo Victor Pereira*; VERAS, Marcela Viégas; RODRIGUES, Natália Aguiar; CASTRO, Igor Renault Marques; LIMEIRA, Herick Cruz; NUNES, Livia Helena de Araujo Castro; MOUCHREK JUNIOR, José Carlos Elias;

Curso: Odontologia

Email: regisrvps@outlook.com

Os implantes osseointegrados são uma ótima alternativa na reabilitação oral para substituir dentes perdidos, sendo, muitas das vezes, resultado de uma doença periodontal. Apesar de não serem naturais do organismo humano, os implantes são susceptíveis a atividade microbiana e a doenças, como a mucosite a periimplantite. A mucosite é uma reação inflamatória reversível nos tecidos moles ao redor dos implantes; Já a periimplantite é um processo inflamatório, sítio específica que atinge os tecidos ao redor de um implante, com certa similaridade a periodontite crônica. O desequilíbrio hospedeiro-microbiota associado a bactérias gram-negativas e desequilíbrio biomecânico podem acabar causando a periimplantite. O seu tratamento pode variar de medidas preventivas a medidas terapêuticas; na primeira, cabe, principalmente, instrução de higiene oral, motivação e controle de biofilme por parte do paciente; na segunda, trata-se a doença propriamente dita, objetivando o retorno do estado de saúde, a fim de aumentar o prognóstico do implante. Dentre tais medidas, encaixam-se o debridamento mecânico, descontaminação da superfície do implante, uso de princípios antimicrobianos, terapias com laser, cirurgias ressectivas e renergerativas e terapia oclusal. A possibilidade de

estabelecer diferentes terapêuticas abre um leque para o profissional, onde cabe ao mesmo o correto planejamento e execução dos procedimentos, para garantir um ótimo estado de saúde bucal e reabilitação do paciente.

PIEZOCIRURGIA: UMA EVOLUÇÃO NA ODONTOLOGIA

SILVA, Luís Gustavo Cássio Da*; SILVA, Natyla Maysa De Lima; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima.

Email: nathymaysa@hotmail.com

Curso: Odontologia

Em cirurgias orais as osteotomias são realizadas geralmente com uso de brocas e serras, instrumentos mecânicos. Tais instrumentos são altamente prejudiciais, devido a altas temperaturas que geram durante a perfuração e que podem lesionar nervos, vasos sanguíneos e tecidos moles. Como alternativa a cirurgias ósseas convencionais temos hoje a piezocirurgia, especialmente em casos que se tem o risco de danos as estruturas moles adjacentes. A cirurgia piezoelétrica é definida como uma técnica que utiliza vibrações ultrassônicas para a realização de osteotomias. Tal tipo de tecnologia vem sendo empregada em variados procedimentos, tais como cirurgias de em mãos, craniofaciais, orbitários, reconstrutivos faciais, otológicos e orais. O aparelho piezocirurgico é composto por um dispositivo piezoelétrico que funciona com uma frequência de 29 kHz que pode chegar a 30 Hz, o mesmo pode possuir variados tipos de pontas, onde as mesmas se adequa a cada planejamento de tratamento que o profissional realize. Dessa forma a piezocirurgia vem como uma evolução para odontologia, onde com a mesma pode ser realizados procedimentos mais conservadores e atraumáticos, objetivos de todos os profissionais e tal aparelho esta ainda em constantes testes tanto em animais quanto humanos, sendo que os mesmos apresentam resultados satisfatórios, portanto as perspectivas da utilização desse instrumento prometem revolucionar importantes paradigmas nas diversas áreas da cirurgia.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO POSTURAL: ESCOLA DE POSTURA

VALE, C.L*; SILVEIRA, S.A.M; MELO, P.R; SANTOS, P.A; CASTRO, S.B.D; MARTINS, Érica Silva.

Email: Laryssa.castro01@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

A fase escolar é representada por um ciclo de desenvolvimento de maturidade corporal, entretanto, a adoção de posturas incorretas podem repercutir de forma negativa no futuro. O projeto itinerante: “escola de postura”, desenvolvido na UNICEUMA pelo curso de Fisioterapia, visa identificar e prevenir os possíveis desvios posturais encontrados em crianças em fase

escolar através do programa de educação postural. O projeto é dividido em 3 fases, a 1ª realizada na sala de expressão corporal da universidade para capacitação dos discentes do quinto e sexto período que integram o projeto, esta capacitação refere-se a avaliação e orientação postural de escolares e montagem de questionários e exercícios para melhor aptidão na aplicação dos mesmos. A fase subsequente é realizada nas escolas de rede pública ou privada em São Luís –MA, o projeto acontece semestralmente, apresentando-se através de uma peça educativa no intuito de ressaltar os principais posicionamentos inadequados que acometem e/ou influenciam os desvios posturais. Por fim, a última etapa envolve a aplicação do Instrumento de Avaliação Postural (IAP) e questionários seguido de exercícios posturais de flexibilidade, tonificação global e alongamentos. O valor de relevância do projeto vai muito além da experiência e conhecimento de levar as escolas o programa de educação postural, mas também a detecção e intervenção precoce que podem vir minimizar progressões e sequelas futuras.

PROJETO ITINERANTE ESCOLA DE POSTURA

VALE, Laryssa Castro*; MARTINS, Érica Silva.

Email: laryssa.castro01@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

A fase escolar é representada por um ciclo de desenvolvimento de maturidade corporal, entretanto, a adoção de posturas incorretas podem repercutir de forma negativa no futuro. O projeto itinerante: “escola de postura”, desenvolvido na Universidade Ceuma pelo curso de fisioterapia visa identificar e prevenir os possíveis desvios posturais encontrados em crianças em fase escolar através do programa de educação postural. O projeto é dividido em 3 fases, a 1ª realizada na sala de expressão corporal da Universidade Ceuma para capacitação dos discentes do sexto e sétimo período que integram o projeto. Esta capacitação refere-se a avaliação e orientação postural de escolares, assim como a montagem de questionários e exercícios para melhor aptidão na condução e aplicação dos mesmos. A fase subsequente é realizada nas escolas de rede pública e privada em São Luís –MA. O projeto ocorre semestralmente apresentando-se uma peça educativa no intuito de ressaltar os principais posicionamentos inadequados que acometem e/ou influenciam os desvios posturais. Por fim, a última etapa envolve a aplicação do Instrumento de Avaliação Postural (IAP) e questionários nos alunos e logo após a realização de uma bateria de exercícios posturais de alongamento, flexibilidade e tonificação global são aplicados. O valor de relevância do projeto vai muito além da experiência e conhecimento de levar as escolas o programa de educação postural, mas

também a detecção e intervenção precoce que podem a vir minimizar progressões e sequelas futuras.

PSICANÁLISE, ARTETERAPIA E ENVELHECIMENTO: UM ESTUDO SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM IDOSOS

PRASERES, Adrienne Fernandes*; LIMA, Amanda Rolim; LIMA, Livia Fernanda Alves; LIMA, Ana Beatriz Rocha; LIMA, Suely Simone Costa

Curso: Psicologia

Email: adriannefernamdesp@gmail.com

As demandas provenientes do envelhecimento populacional exigem uma compreensão sobre a expressão da subjetividade das pessoas idosas. O objetivo desse estudo é compreender a questão do envelhecimento, salientando aspectos da saúde e da subjetividade a partir da Psicanálise e da Arteterapia. A Psicanálise contribui com sua escuta diferenciada e singular do sujeito, visto que, a velhice deve ser compreendida como um tempo lógico, ou seja, uma realidade pulsional e não material, na qual o sujeito é marcado pela falta e sempre está em busca do objeto que irá preencher o vazio, consequente da falta. Esta busca tem efeitos de singularização, com estilos e processos psíquicos únicos e particulares. A Arteterapia contribui com a compreensão dos aspectos psicodinâmicos do desenvolvimento humano e a expressão artística que se nutre de afetos, percepções e motivações inconscientes. É fato que o envelhecimento traz modificações nos relacionamentos dos idosos com as outras pessoas. Por este motivo percebe-se nos idosos um movimento de esconder suas vontades, seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos, suas ambições e até mesmo as insatisfações, já que muitas vezes sentem-se como se fossem invisíveis para a sociedade. Por meio da Psicanálise e da Arteterapia compreende-se aspectos centrais da velhice, em que se destacam os desafios e a heterogeneidade, considerando o envelhecimento em sua multidimensionalidade. Neste sentido, a arte e a psicanálise podem se tornar grandes aliadas na compreensão e elaboração de conteúdos emocionais, que ganham contornos singulares no idoso, muitas vezes pelas dificuldades de se expressar. Palavras-chave: Envelhecimento; Psicanálise; Arteterapia.

PSICOLOGIA ESCOLAR E A ADOLESCÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES À ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de; ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima; RIBEIRO, Wallyson Martins; SANTOS, Ednamara de Oliveira; LOBO, Eliene Aquino; GALVÃO, Pollianna; BECKMAN, Márcia

Curso: psicologia

Email: elianek2@hotmail.com

Resumo : A adolescência é um período no ciclo de vida do ser humano que, usualmente, está associada a ideias de transição, instabilidade emocional e imprevisibilidade sem relação com o contexto social, econômico e cultural no qual o desenvolvimento humano ocorre. A literatura da Psicologia do Desenvolvimento sinaliza que as diversidades de experiências que ocorrem na fase da adolescência estão de acordo com as condições sociais e culturais existentes. Nas sociedades ocidentais, a adolescência é concebida por uma fase evolutiva na vida do ser humano onde se busca uma nova forma de visão de si e do mundo, somada à percepção de ser um período de preparo para sua inserção no mundo do trabalho. No contexto da escola, o psicólogo pode desenvolver uma atuação voltada para intervenções no processo de escolha profissional e para a carreira, sendo esta uma das atividades tradicionais da área a partir de uma leitura crítica sobre o processo da adolescência situada na cultura e nas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Este estudo constitui-se em um ensaio teórico que objetiva discutir as possíveis contribuições da atuação em Psicologia Escolar no processo de orientação profissional, a partir da literatura da Psicologia do Desenvolvimento que concebe a adolescência associada a diferentes condições de inserção social no trabalho em consonância às suas formas de ser e estar no mundo. Enfatiza-se que o psicólogo escolar, junto a outros membros da equipe pedagógica, podem incitar processos de conscientização crítica nos jovens para que desenvolvam melhor segurança na escolha profissional.

PSICOLOGIA E DEFICIÊNCIA NA TERCEIRA IDADE: ROMPENDO ESTIGMAS E PRECONCEITOS

DUTRA, Grazielle Caldas*; CUTRIM, Bárbara Esther Silva; PEDROSA, Letícia De Moraes; FRREIRA, Willyane De Oliveira; LEITE, Zinole Helena Martins.

Email: grazi.dutra@hotmail.com

Curso: Psicologia

Introdução: A deficiência, uma condição humana à qual todos estão sujeitos, pode-se fazer presente em qualquer momento da vida, inclusive a terceira idade. Este estudo bibliográfico e qualitativo objetiva refletir sobre a intervenção do psicólogo no enfrentamento das atitudes sociais negativas frente ao idoso com deficiência. Procedeu-se à análise de 15 artigos (de 2011 a 2016) disponíveis nas bases de o Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), assim como livros relacionados ao tema, através das palavras chaves: “Deficiência”, “Terceira Idade”, “Atitudes Sociais” .Revisão O envelhecimento é um processo natural propicio ao aparecimento de doenças crônicas e neurodegenerativas, que podem causar deficiências. O Idoso deficiente encontra-se duplamente vulnerável a atitudes sociais negativas. Descrita como uma alteração no funcionamento físico ou psicológico que impede a realização de atividades, a deficiência torna-se um tabu quando associada à velhice, em função de estereótipos, preconceitos, crenças

e estigmas sociais sobre o envelhecimento . Conclusão: Diante de atitudes sociais negativas frente ao idoso com deficiência, cabe ao psicólogo intervir no sentido de resgatar a dignidade destas pessoas, orientar familiares no sentido dos cuidados e qualidade de vida. O apoio familiar é indispensável para minimizar o sofrimento psíquico do idoso com deficiência advindos de atitudes sociais negativas, além de evitar abandonos. Palavras- chave: Deficiência. Terceira idade. Atitudes Sociais.

PSICOMOTRICIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL : RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESTÁGIO CURRICULAR EM INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM CRIANÇAS NA ONG VALORIZAR

ANDRADE, Livia Maria Guedes de Lima Andrade; LEITE, Zinole Helena Martins

Curso: Psicologia

Email: liviaguedesandrade@gmail.com

Resumo: Introdução: Desigualdade social e vulnerabilidade social são condições que se correlacionam, especificamente em São Luís. Por configurarem-se como fatores de agravos ao desenvolvimento psicossocial de crianças, estes aspectos comumente levam a exclusão e marginalização social. Este trabalho consiste num relato de experiência em estágio curricular, cujo objetivo era promover o desenvolvimento de habilidades para aprendizagens escolares em crianças em condições de vulnerabilidade social através de praticas psicomotoras. Para a sua elaboração, além dos relatos das atividades práticas, utilizou-se livros e 15 artigos sobre psicomotricidade disponíveis nas bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde e Google acadêmico considerando-se os seguintes descritores: “Psicomotricidade”, “Aprendizagens Escolares” e “ Vulnerabilidade Social “. Revisão: A infância, uma fase que requer atenção e cuidados dos familiares, educadores, e de toda sociedade, possui marcadores no seu desenvolvimento bem delimitados e importantes. Frente á negação á omissão do Estado no cumprimento dos seus deveres para com a infância, ONGs como a Valorizar tem assumido esta responsabilidade nas esferas esportivas, sociais e psicológicas com enfoque na psicomotricidade , que enfatiza a unidade mente-corpo. Conclusão: Observou-se significativos avanços entre as crianças nas esferas cognitiva, psicoemocional, autoestima e vínculos sociais, bem como aquisição de valores humanos indispensáveis para a vida social, através de praticas psicomotoras, desenvolvidas pelos estagiários sob orientação da supervisora técnica, psicóloga da ONG Valorizar.

PSICO-ONCOLOGIA INFANTIL: A PERCEPÇÃO DA CRIANÇA SOBRE A MORTE

LOPES, Ana Karla Monteiro*; BOTELHO, Helena Rúbia de Santana

Curso: Psicologia

Email: anakm.l@hotmail.com

Falar de morte não é tarefa fácil, quando envolve crianças, então, fica mais difícil ainda. Ao observar a grande ocorrência de óbitos infantis, em uma instituição de tratamento contra o câncer, surgiu o desejo de pesquisar sobre o pensamento da criança em relação ao adoecer e a morte. O trabalho tem como título Psico-Oncologia Infantil: a percepção da criança sobre a morte. A pesquisa buscou, através de levantamento bibliográfico em livros, artigos, sites e bancos de dados (SciELO, Lilacs, Pepsic, Portal Capes, Teses e dissertações da USP) responder como se constrói a percepção da morte na criança em tratamento oncológico e descrever os benefícios de se falar sobre o assunto com elas. O câncer carrega o estigma de doença fatal. Apesar dos avanços na Medicina o tratamento nem sempre é eficaz, o que faz com ele seja uma doença muito temida e fortemente relacionada à morte. Os resultados apontaram que os adultos se negam a falar sobre a finitude com as crianças por julgá-las despreparadas para lidar com situações de perda e sofrimento, embora elas possuam grande capacidade de observação e uma representação única da morte e do morrer, sofrendo influências tanto do desenvolvimento cognitivo quanto das interações sócio-ambientais. O uso do lúdico aparece como um instrumento importante no acesso aos sentimentos e representações infantis e na abordagem do tema da morte com as crianças. Conclui-se que a criança é um ser pensante e capaz de perceber o que acontece a sua volta, sendo importante deixá-la participar ativamente do processo de fim da vida.

POTENCIAL USO DA SALIVA COMO UM FLUIDO DIAGNÓSTICO

PEREIRA, Ana Carolina Soares*; SERRA, Patrícia; DINIZ, Rafael Soares; FERRO, Amanda Costa; SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira; MOFFA, Eduardo Buozi; GONÇALVES, Letícia Machado

Email: anacarolinasoaper@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

Fluido oral ou saliva total é um fluido biológico complexo, uma vez que vários contribuintes são responsáveis pela produção deste fluido corporal. Isto torna o diagnóstico da doença, por meio da análise da saliva, um trabalho desafiador e atraente. A maior parte da porção de fluido de saliva total (600-1200 ml / dia) deriva das principais glândulas salivares e de, uma variedade de glândulas salivares menores que se localizam na face interna do rebordo, palato e língua. Ao todo, estas glândulas representam a porção exócrina da saliva, o que tem uma concentração de proteína variando entre 150-400 mg/dl. Os contribuintes não-exócrinos podem ser divididos em entidades derivadas do hospedeiro, tais como, células epiteliais descamadas e intactas, resíduos de células sanguíneas, fluido gengival e fluido que entra na cavidade oral através da infiltração da mucosa. Componentes derivados não-hospedeiros são na maior parte microrganismos como

bactérias, vírus e seus produtos. Constituintes da saliva não-exócrinos podem derivar localmente, mas muitos são sintetizadas em outras partes do corpo. Por exemplo, o fluido gengival é um transudato sérico rico em proteína (7000 mg/dL), o que reflete o padrão de proteína de soro e entra na cavidade oral através do sulco gengival. A perspectiva de identificar e medir biomarcadores na saliva abre o caminho para diagnóstico, detecção precoce, progressão de monitoramento da doença e a conformidade com as modalidades de tratamento de diversas patologias. Visto isso, o presente estudo tem como objetivo explorar o uso de saliva para o diagnóstico de doenças de caráter sistêmico.

PROPORÇÃO ÁUREA E A ODONTOLOGIA ESTÉTICA

AQUINO, Ingrid Nayra da Costa*; GOMES, Isabella Azevedo; CARNEIRO, Karina Gama Kato; BENINI, Marco Aurélio Paschoal; REIS, Washington; KUSSANO, Sandro Carvalho; FIALHO, Melissa Proença Nogueira

Curso: Odontologia

Email: joana.josimar@hotmail.com

Sempre houve a necessidade humana de compreender formas, tamanhos, pessoas, composições, estruturas, dentre outros. Diante disso, passou-se a analisar e observar a importância da harmonia, seja ela aplicada a pessoas, objetos ou à natureza. O significado de harmônico relaciona-se com proporcionalidade e coerência, o que pode ser amplamente abordado quando relacionado à estética humana. A proporção áurea é uma constante real algébrica irracional, onde acredita-se que a mesma não é aplicada apenas na matemática, ou em obras de artes e monumentos, mas no corpo humano também. Pode-se citar a organização dos ossos, ramificação de veias e nervos. Na odontologia, tal conceito é de grande importância para a construção de sorrisos e harmonia facial. Pelo fato de a beleza ser subjetiva, o ser humano procura, a partir de medidas comparativas, estabelecidas como proporções, alcançar harmonia estética. Na tentativa de estabelecer proporções é que se chegou à proporção áurea. O objetivo deste trabalho é trazer os conhecimentos a respeito de proporção áurea e sua interferência na estética dental, durante a construção e planejamento de sorrisos. A proporção áurea deve ser considerada no planejamento restaurador estético pois possibilita uma melhor análise dos parâmetros morfológico e de dimensão dos dentes anteriores e sua relação com o sorriso

(RE)CONHECENDO O FILHO HOMOAFETIVO: PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS

ROCHA, Jefther Felipe Lima*; GUIMARÃES, Roberto Mendes

Curso: Psicologia

Email: jefther.felipe@yahoo.com.br

O ambiente doméstico é apontado como espaço em que violência homofóbica ocorre nas mais diversas formas o que afeta as relações aí estabelecidas. Um dos momentos em que essa violência ocorre é aquele em que a orientação sexual é assumida aos familiares. Logo, nos parece interessante analisar a vivência dele para os pais dos indivíduos homoafetivos. O presente projeto de pesquisa visa compreender a percepção que os pais de homossexuais possuem acerca da descoberta da homossexualidade de seu filho. Objetivamos ainda comparar e analisar as diferenças perceptivas entre mães e pais acerca da descoberta da homossexualidade de seus filhos; comparar as diferenças entre as percepções tidas logo após a descoberta e as atuais, e quais fatores as permeiam e analisar as percepções que os pais de homoafetivos possuem acerca da homofobia. Optamos pela pesquisa qualitativa e como técnica a Análise de Conteúdo de Bardi. Os participantes da pesquisa serão pais e mães de homoafetivos do sexo masculino e cujo filho já tenha assumido sua orientação para ambos em algum momento. Hipotetizando que encontraremos condutas homofóbicas por parte dos pais, muito provavelmente aprendidas e herdadas pelas contingências sociais, culturais e religiosas à saída do armário de seus filhos, acreditamos que compreender a orientação sexual dentro do universo família é um passo inicial (mas decisivo) para promover o bem-estar entre seus membros, diminuir preconceitos e atitudes discriminatórias.

RESPONSABILIDADES DO CONFEF/CREF NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO MARANHÃO

SILVA, NEUSA DE PAULA MENDES SILVA; AZEVEDO, ANA CAROLINA TORREÃO DE; AMARAL, NAIANE DE JESUS; MELO, ROSIANE VIEIRA DOS SANTOS; BRASIL, AURENILDES DA SILVA

Curso: Educação física

Email: neusa.dpaula@gmail.com

Resumo: Para que haja valorização e demanda por profissionais qualificados na área de Educação Física, é necessário que exista uma preocupação com a qualificação da formação, com uma matriz curricular capaz de preparar os profissionais de Educação Física no ofício de sua carreira de maneira eficaz e segura para a população (CARTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2010). É relevante que tanto a sociedade quanto os profissionais de Educação Física e os futuros ingressos nas Instituições de Ensino Superior para formação em profissionais de Educação Física, tenham consciência do papel do Conselho Federal de Educação Física e Conselho Regional de Educação Física na formação tanto dos profissionais quanto dos que estão em processo de

aprendizagem, já que é necessário um credenciamento no CONFEF/CREF para o exercício legal da profissão e esses órgãos tem deveres a cumprir com seus associados, deveres esses que vão muito além da fiscalização do exercício legal da profissão (ESTATUTO DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2010). A pesquisa descreveu as funções e identificou e discutiu as contribuições do CONFEF/CREF diante da realidade atual da formação dos profissionais de Educação Física em São Luís. Conclui-se que apesar do CONFEF E CREF terem suas responsabilidades e obrigações, o profissional de Educação Física não deve jogar toda a responsabilidade para o órgão regulamentador, assim como os discentes que estão em processo de formação e futuros estudantes devem compreender o estatuto, saber dos seus direitos, mas ter consciência de suas responsabilidades para uma formação profissional qualificada.

RUIDOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PODE PRODUZIR PERDA AUDITIVA?

NEVES, Denise da Silva*; MELO, Natália Costa Oliveira; GALANA, Camila; SALES, Sandra da Conceição; FERNANDES, Gabriel Cássio da Silva; LEAL, Adriana Mara Araújo; CARNEIRO, Karina Gama Kato

Curso: Odontologia

Email: denise.neves7@gmail.com

O ruído pode ser prejudicial em casos de exposição contínua e o efeito mais conhecido da exposição ao ruído no trabalho é a perda de audição. O PAIR ou perda auditiva induzida por ruído é causada por bloqueio mecânico do canal auditivo na transmissão do som ao ouvido interno (surdez de transmissão) ou a danos nas células ciliadas da cóclea, que faz parte do ouvido interno (surdez neurossensorial). Ambas tem caráter evitável, e podem ser causadas caso o indivíduo seja exposto a elevados níveis de ruídos. O cirurgião-dentista desenvolve as mais variadas tarefas dentro do consultório odontológico, desta forma, direta ou indiretamente esse profissional é exposto a distúrbios e riscos a saúde. Estes profissionais da saúde são expostos continuamente a ruídos provenientes dos equipamentos em seu consultório e podem sofrer danos a saúde auditiva. Sendo assim para conservar o ambiente odontológico ideal, sem prejuízos ao cirurgião-dentista deve tomar algumas precauções ergonômicas como uso de protetor auricular, e aparelhos modernos que emitem baixas frequências sonoras no ambiente de trabalho.

SÉPSE, SÉPSE GRAVE E CHOQUE SÉPTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

SOUSA, Jaqueline De Sá*; RODRIGUES, Cianna Nunes; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; SANTIAGO, Lília De Cássia Piedade; CALANZAS, Dagolberto Araújo Pereira.

Curso: Enfermagem

Email: jaquelinysa@hotmail.com

A Sepse pode ser definida como um foco infeccioso associado com dois ou mais critérios de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS), a Sepse Grave como sendo a Sepse associada com um dos critérios de gravidade e o Choque Séptico como sendo a Sepse Grave com hipotensão que haja a necessidade da utilização de drogas vasoativas. Para se definir Sepse, é necessário que haja um processo infeccioso ou um foco infeccioso conhecido ou suspeito, associado com dois ou mais critérios de SRIS secundários à infecção. A Sepse resulta de uma complexa interação entre o microorganismo infectante e a resposta imune, pró e anti-inflamatória e pró-coagulante do hospedeiro. A resposta do hospedeiro e as características do organismo infectado são as principais variáveis fisiopatológicas da doença. Seu tratamento sofreu profundas e significativas modificações na última década, principalmente a partir de uma campanha mundial, Surviving Sepsis Campaign, onde se estabeleceu uma rotina padrão para o atendimento desses pacientes. Esta revisão tem por objetivo discutir a epidemiologia, os mecanismos fisiopatológicos, os critérios diagnósticos e o tratamento da Sepse. Para tanto, buscaram-se artigos indexados na base de dados PubMed/Medline, sendo utilizados como descritores as palavras sepsis, sepsis grave e choque séptico. A pesquisa concluiu que a Sepse é a resposta complexa do hospedeiro à agressão de um patógeno. Seu tratamento baseia-se no controle do foco e no suporte hemodinâmico e das funções orgânicas.

SÍNDROME DA COMBINAÇÃO: ASPECTOS CLÍNICOS DE IMPORTÂNCIA PARA O ODONTÓLOGO

OLIVEIRA, Rita De Cassia Da Rocha*; MOFFA, Eduardo Buoizzi

Email: ritarsouzaji@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A síndrome da combinação, descrita por Kelly em 1972, apresenta-se a partir de um conjunto de características marcantes que ocorrem quando uma maxila desdentada se opõe a dentes anteriores inferiores naturais. Essa condição clínica é mais comumente encontrada em pacientes que fazem uso de prótese total superior que oclui com dentes naturais anteriores inferiores e prótese parcial removível bilateral inferior. Também conhecida por Síndrome de Kelly, é caracterizada pela perda óssea da região anterior do rebordo superior, extrusão dos dentes naturais anteriores, aumento das tuberosidades maxilares, perda óssea da região posterior do arco inferior sob a base da PPR e hiperplasia papilar da mucosa do palato duro. O

correto diagnóstico e tratamento da síndrome são imprescindíveis na obtenção de resultado que, no mínimo, impeça o avanço do quadro. O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura acerca da Síndrome da Combinação, no qual, além de importantes considerações acerca do diagnóstico, prevenção e tratamento reabilitador dos pacientes portadores dessa síndrome, chama-se atenção para os cuidados cirúrgicos que devem estar

TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE DA PERIIMPLANTITE

NERES, Keliane Almeida*; COELHO, Jessika Almeida ; MALHEIRO, Adriana Santos; OLIVEIRA, Maysa Kelly; TAVAREZ, Rudys Rodolfo de Jesus ; GOMES, Mário Gilson Nina;
Email: jessikacoelho2@gmail.com

Área/Especialidade: Odontologia

A periimplantite é um processo inflamatório cuja causa principal é a contaminação da superfície do implante por bactérias. Diversas terapias têm sido estudadas para o tratamento de modo efetivo da periimplantite. Contudo, nenhuma permite a completa eliminação das bactérias da bolsa periimplantar e, os antibióticos, por sua vez, geram resistência bacteriana a longo prazo. A terapia fotodinâmica (PDT) vem ganhando cada vez mais espaço dentro dos protocolos de tratamento auxiliar da periimplantite com o objetivo de promover a redução bacteriana, a PDT consiste na associação de um agente fotossensibilizador mais uma fonte de luz específica, como o laser de baixa potência, que tem baixo custo comparado ao laser de alta potência, sem efeitos colaterais e age seletivamente na área de aplicação. O objetivo do presente estudo é revisar a literatura e discutir o uso da terapia fotodinâmica com laser de baixa intensidade como tratamento coadjuvante da periimplantite.

TERMINALIDADE E QUALIDADE DE VIDA, O MORRER E A HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE

DA SILVA, Paula Rayssa Nogueira*; BARROS, Jozielma B da Silva; DE LACERDA, Sarah Sales; CHAVES, Jessica Bastos; NUNES, Josiele Dias; BOTELHO, Helena Rúbia de Santana
Email: josylma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Os profissionais da saúde vêm discutido sobre a terminalidade e a influência na qualidade de vida dos pacientes, considera-se estas questões muito delicadas e impactantes, visto que os sentimentos que norteiam a vivência do fenômeno da morte interferem de maneira significativa no estado psicológico do indivíduo em fase terminal. Esta pesquisa busca descrever os aspectos que norteiam o contexto do processo de luto e que devem ser observados pelo profissional da psicologia na atuação com pacientes em fase terminal. O estudo em questão caracteriza-se em uma pesquisa de revisão bibliográfica e descritiva, a partir da leitura de artigos

sobre a temática em questão. Partiu-se da análise de 21 artigos disponíveis nas bases de dados: Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde a partir das palavras-chave: Terapia do luto, Fase terminal, Humanização na Saúde. Observou-se que diante dos casos graves e terminais, o profissional de psicologia deve discutir com o paciente suas prioridades e respeitar suas escolhas, ter sempre como princípio norteador o direito do paciente e de buscar a qualidade de vida em seus últimos dias de vida. Concluiu-se que a qualidade de vida é necessária em todas as etapas da vida do ser humano, incluindo o processo do morrer. Incluir o indivíduo no processo de seu próprio morrer é conferir-lhe uma morte com dignidade, é humanização na saúde. Palavras-chaves: Terapia do luto, Fase terminal, Humanização na Saúde.

TIPOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS QUE PODEM ACOMETER A BOCA: TUMORES EPITELIAIS

REIS, Juliana Sousa*; SILVA, Tainah Cristina Araujo; FEITOSA, Mylena Franco de Sa; MACIEL, Andrezza

Email: juliana_reis@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O câncer de boca gera um sério problema de saúde em quase todos os países do mundo e no Brasil. Os cânceres que dão origem no revestimento da boca ou em tecidos superficiais são denominados carcinomas e correspondem a 96% dos tumores malignos na boca. As pessoas que apresentam um maior risco são os indivíduos fumantes e alcoólatras. O carcinoma espinocelular do lábio é um tumor maligno mais comum da cavidade oral. Existe também tumores como ameloblastoma que é um tumor de crescimento lento e assimétrico que pode provocar deformidade fácil. A variedade maligna tem sido observada em pacientes com diabetes de 40 a 75 anos com a incidência de 1 a 2% de todos os ameloblastomas. O Carcinoma ameloblástico é um tipo raro de tumor odontogênico com apresentação principal na mandíbula. Possui características histopatológicas malignas tanto na lesão inicial quanto nos possíveis sítios de metástases. O Ameloblastoma é um tumor odontogênico que acomete principalmente a mandíbula e tem sua origem epitelial a partir da linha embriogênica dentária remanescente. Essa neoplasia determina cerca de 1% de todos os cistos e tumores da mandíbula. Geralmente, é reconhecida com invasão local, podendo demonstrar tendência à recorrência em 50% - 72% após excisão, mas raramente se apresenta com comportamento agressivo ou com disseminação metastática. A Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhecendo esse comportamento biológico raro, porém importante, em 1972, incluiu o termo ameloblastoma maligno para os carcinomas odontogênicos. Palavras chaves: Neoplasias malignas; Ameloblastoma maligno; Carcinoma ameloblástico; Diagnóstico; Cavidade bucal

TIPOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS QUE PODEM ACOMETER A BOCA: TUMORES SÓLIDOS

REIS, Juilana Sousa Reis*; AGUIAR, Vanessa Melonio; DE LIMA, Julyana Hellen Macedo; MACIEL, Andrezza

Email: juliana_reis@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: A neoplasia maligna é uma forma de proliferação celular não controlada pelo organismo com tendência a autonomia e perpetuação, apresenta um crescimento acelerado com a capacidade de invadir os tecidos adjacentes, podendo desenvolver metástase. Pode apresentar-se de várias maneiras em diversas partes do corpo, no entanto, algumas pessoas possuem uma inclinação para a cavidade bucal. O carcinoma espinocelular (CEC) ou epidermoide é um exemplo claro, representando 90% a 95% dos casos de câncer bucal, este atinge ambos os sexos, com preferência ao sexo masculino. Vale ressaltar que esta neoplasia está frequentemente associada ao tabagismo, alcoolismo e até mesmo a propensão genética como os principais responsáveis pelo CEB bucal. O papilomavírus (HPV) também pode vir a se comportar como mais um cocarcinógeno. Todavia, outro fator que ganha um determinado destaque como coadjuvante de risco para a incidência desta doença tem relação com hábitos alimentares de baixos padrões nutricionais. Fatores ocupacionais também podem ter interligação com a doença. Os sítios de localização mais comum encontram-se na língua e assoalho bucal. Há diferentes opções para o tratamento a fim de melhorar ou sanar a problemática existente dos pacientes, como a cirurgia ou radioterapia. Palavras chaves: Neoplasias malignas; carcinoma espinocelular; fatores de risco; localização; tratamento.

TRANSPLANTE DENTÁRIO AUTÓGENO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, Natyla Maysa de Lima*; MENEZES, Pedro Valdo Lucena de; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco Jose Lima.

Email: nathymaysa@hotmail.com

Curso: Odontologia

Apesar dos avanços odontológicos que levaram a uma diminuição de casos de indicação de exodontia, seja por lesões de cárie ou por doença periodontal tal procedimento ainda é realizado rotineiramente principalmente em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis. O transplante dentário autógeno é a substituição de um dente perdido ou ausente por um dente transplantado do próprio paciente, geralmente um terceiro molar, pode ser pela técnica convencional/imediata ou pela mediata. Possui como principais indicações: cáries extensas, reabsorção radicular, doença periodontal, fratura coronoradicular, agenesia e aplasia de dentes relacionados ao dente perdido. A técnica cirúrgica exodontica empregada

nesses casos deve ser atraumática, a fim de evitar danos ao dente a ser transplantado, sendo o sucesso dessa técnica influenciado por vários fatores, tais como técnica cirúrgica adequada, mínimo trauma na região, grau de desenvolvimento radicular do dente selecionado, ausência de carga mastigatória precoce e um acompanhamento clínico e radiográfico. Portanto o transplante dentário autógeno confere uma opção para reabilitação de dentes perdidos precocemente em todas as camadas sociais

TRATAMENTO DE PORTADORES DO VÍRUS HIV/SIDA COM ANTIRRETROVIRAIS E ASPECTOS DA ADESÃO AO TRATAMENTO

FERREIRA, Vanessa Alves*; VIANA, Juliane Flávia Cançado;

Email: alves92vanessa@hotmail.com

Introdução: A SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença que tem como agente etiológico o vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana), um retrovírus de genoma RNA, pertencente à família Retroviridae e subfamília Lentiviridae. Revisão: O vírus HIV que tem como alvo as células Linfócitos TCD4+, causando uma intensa imunodepressão do portador (fase aguda da doença), posteriormente levando à soroconversão (formação de anticorpos anti-HIV no organismo por volta da quarta semana), ocorrendo a produção de bilhões de partículas virais diariamente. Exames laboratoriais de contagem de linfócitos TCD4+ e de carga viral são usados para se ter controle da replicação do vírus no organismo. O tratamento com os medicamentos antirretrovirais inicia-se quando o número de linfócitos CD4+ encontra-se com valores abaixo de 350 cél/mm³, ou quando o paciente apresenta quadro de doenças oportunistas como: candidíase oral/esofágica; pneumocitose; toxoplasmose. Medicamentos antirretrovirais atuam inibindo a replicação do vírus HIV, reduzindo a carga viral de RNA e conseqüente aumento do número de linfócitos CD4+. A Lei de nº 9.313/1996 garante que todos os medicamentos necessários para o tratamento de HIV/SIDA serão distribuídos de forma gratuita para todos portadores por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Conclusão: Dessa forma, a adesão terapêutica se dá com uso correto do antirretroviral, realização de exames laboratoriais a cada 3–4 meses e consultas frequentes, além de abranger aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais sendo o mais importante uma boa relação entre o portador e a equipe de saúde para que não haja um abandono no tratamento.

TRAUMA FACIAL EM MULHERES

SILVEIRA, Luíza Carneiro Silveira; JÚNIOR, Marcelo Mesquita Martins; COSTA, Matheus Leonel; MACIEL, Andrezza de Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

CURSO: Odontologia

Email: silveiracluiza@gmail.com

Resumo : A preocupação com o problema da violência é considerada recente na história humana, estando relacionada à modernidade e seus valores. A violência contra a mulher não tem restrição de grupo, raça, idade ou classe social, e se tornou um problema de saúde pública. As principais causas desse tipo de trauma, são acidentes com contusão, lutas, quedas e lesões esportivas. É uma das agressões mais devastadoras, devido principalmente a consequências emocionais, possibilidade de deformação e ao impacto econômico que tais traumas causam ao serviço de saúde, por se tratar de um trauma de abrangência multidisciplinar. Sendo assim, essa violência, chega aos serviços de saúde de diferentes maneiras e circunstâncias, com isso, profissionais da área médica devem saber identificar quando há a ocorrência de violência de gênero

TOXINAS BOTULÍNICAS TIPO A: ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO BIOMÉDICO

COSTA, Daniela de Jesus Ferreira Costa; MOTTAS, Brenda Leticia Araujo; NUNES, Márcio Anderson Sousa; ROCHA, Marla Raquel Pontes da

Curso: biomedicina

Email: danyellacosta07@gmail.com

Resumo: Introdução: A toxina botulínica (T.B.) é uma proteína de origem biológica, produzida pela bactéria anaeróbica, gram negativa, Clostridium Botulinum, popularmente conhecida e comercializada com o nome de “Botox®”. Os primeiros estudos com a toxina botulínica foram realizados em indivíduos vítimas de botulismo, que adquiriram a doença através de alimentos mal conservados e contaminados com bactérias, que quando ingeridos levavam ao envenenamento. Revisão: Em condições apropriadas as bactérias são capazes de crescer e produzir sete sorotipos diferentes de toxinas distintas imunologicamente, sendo o A mais potente. Quando administrada por injeção intramuscular, em doses adequadas ela inibe acetilcolina (ACh), um neurotransmissor, e como resultado o músculo acaba não recebendo a mensagem para se contrair. É considerado um tratamento interessante no bloqueio neuromuscular seletivo, aliviando espasmos musculares originados de atividade neural excessiva, a primeira experiência terapêutica realizada em humanos com a aplicação desta toxina, foi em 1980 por um Oftalmologista, Allan B. Scott, visando encontrar uma forma não cirúrgica para tratar o estrabismo, desde então tem sido amplamente utilizada na área da estética –Botox, assim como na área da neurologia. Na vertente neurológica, encontra principal utilização em casos de distonias focais dos membros e da coluna cervical, espasmos hemifaciais,

cefaleias tensionais e enxaquecas, destacando-se ainda a sua aplicação, no tratamento da espasticidade, causada por acidentes vasculares cerebrais (A.V.C.S). Conclusão: A Toxina Botulínica vem sendo uma alternativa muito procurada por consequências do seu bom resultado, da evolução das técnicas e o fácil manuseio, além de abranger inúmeros tipos de tratamentos, do dermatológico ao neurológico.

UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA SOBRE HIPNOSE À LUZ DA NEUROCIÊNCIA E DA PSICOLOGIA POSITIVA.

BEZERRA, João Alex Marques*; LIMA, Ana Beatriz Rocha.

Email: arcanjoj@hotmail.com

Curso: Psicologia

A utilização de estados alterados de consciência na psicoterapia implica em mudança do paradigma científico atual. A hipnose refere-se a um estado alterado de consciência. E enquanto técnica apresenta alta eficácia na modificação de padrões de pensamento e de comportamento. Esse estudo consiste em uma revisão de literatura narrativa cujo objetivo é investigar as contribuições da hipnose para o processo terapêutico e suas convergências com a Psicologia Positiva. A hipnose apresenta como principal fundamento o sugestionamento empático, favorecendo autoestruturações cognitivas, bem como alterações psicossomáticas. No processo terapêutico, além do emprego de qualquer técnica, outras variáveis contextuais, relacionadas a itens como empatia, legitimidade, sintonia, expectativas, nível da demanda, dentre outros aspectos relacionados influenciam o curso da terapia. Existe comprovado valor na estruturação dos aprendizados experienciais, sendo esta a janela que a hipnose se encaixa de modo consistente ao possibilitar a construção de contextos terapêuticos favoráveis à associação de variáveis complexas. A Psicologia Positiva investiga virtudes e forças e de caráter que habilitam os indivíduos e comunidades a prosperarem, por meio das emoções e características positivas. O valor da utilização conjunta destas estratégias consiste no uso da hipnose como recurso da “semeadura positiva”, estimulando anseios, cujas respostas eclodirão gradativamente a partir da absorção focal de novas imagens mentais e ideias que convergem os pressuposto da Psicologia Positiva. Outros construtos como à dinâmica dos processos atencionais, o potencial de sugestão, contextualização para suporte de exercícios, ampliação de percepções de caráter favorecem a integração deste recurso concomitantemente a esta promissora abordagem denominada Psicologia Positiva. Palavras-chave: hipnose, psicologia positiva, Psicoterapia.

UTILIZAÇÃO DO LASER NO TRATAMENTO DA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA

LEÓDIDO, Victor Machado; FIALHO, Melissa Proença Nogueira; GOMES, Isabella Azevedo; E MAIA, Mariana Lopes; DE ARAÚJO, Cássio Felipe Silveira; KUSSANO, Sandro Carvalho; CARNEIRO, Karina Gama Kato

Email: victorleodido@live.com

Curso: Odontologia

Resumo: A hipersensibilidade (hiperestesia) dentinária é caracterizada por dor de curta duração, aguda e súbita, sugerida pela exposição dentinária em resposta a estímulos térmicos, evaporativos, táteis, osmóticos ou químicos, que não pode ser atribuída a nenhuma outra forma de defeito ou patologia dental. A etiologia é multifatorial, podendo levar à exposição dos túbulos dentinários: escovação inadequada, interferências oclusais, uso de abrasivos ou erosão por dietas ácidas, técnica incorreta de preparo cavitário e/ou do método restaurador, entre outros. A terapia utilizando baixa densidade de energia é baseada na absorção da energia dos fótons transformando-se em efeito fotoquímico, fotofísico e fotobiológicos nas células. A luz absorvida pelo tecido-alvo em doses corretas estimula ativação de funções celulares biomoduladas frente a situações de inflamação instalada, demonstrando possuir efeitos anti-inflamatório e analgésico, colaborando para a melhora nos quadros de sensibilidade pós-operatória.

USO DOS CONCEITOS DO PLANEJAMENTO DIGITAL DO SORRISO PARA A OTIMIZAÇÃO DA ESTÉTICA FACIAL

BONFIM, Valéria Da Silva*; DINIZ, Rafael Soares; NUNES, Patricia Luciana Serra; FONSECA, Nayara Fernanda Costa Barros; OLIVEIRA, Thaynara Josanne Borges; BUOZI MOFFA, Eduardo; GONÇALVES, Letícia Machado

Curso: Odontologia

Email: valeria_silbonfim@hotmail.com

O sorriso é a maior das expressões faciais, e somente ele, faz aquilo que chamamos de “a beleza de um rosto”. Dentro desse preceito, consideramos que a partir do terço inferior da face temos a possibilidade de conceituar, caracterizar e reconstruir o sorriso, sendo esse o melhor caminho para recuperar a atratividade da face humana. A utilização de imagens fotográficas obtidas através de um protocolo bem definido nos permite a aplicação dos princípios do visagismo, associando esse tipo de conceito à construção de um perfil harmônico do sorriso e da face, através da tecnologia que permite um planejamento digital. O DSD – Digital Smile Design é um conceito de planejamento estético digital individualizado, que desenvolve o design dos dentes de acordo com a face do paciente por meio de imagens digitais, pode ser usada como base para a realização de uma série de procedimentos, diagnósticos, incorporando dados cruciais no processo do plano de tratamento estético virtual do sorriso. O DSD melhora a comunicação

entre os membros da equipe, cria sistemas previsíveis ao longo das fases de tratamento, aumenta a motivação do paciente e aumenta a eficácia da apresentação do caso, pois envolve o paciente no processo tornando-o co-criador de seu próprio tratamento através da partilha de seus objetivos. O objetivo deste trabalho é apresentar um conceito singular do desenho digital do sorriso em duas dimensões (DSD), que fornecerá parâmetros importantes para guiar um encerramento de diagnóstico tridimensional efetivo.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA ATUALIDADE, VITIMIZAÇÃO DE MENINAS NO BRASIL

BARROS, Jozielma Bastos da Silva*; DE BRITO, Antonia Thacyara Dias; DA SILVA, Paula Rayssa Nogueira; MARTINS, Kassia de Sousa; MARANHÃO, Talita Teresa Gomes Furtado
Email: josylma@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: A violência sexual pode ser exercida através de formas explícitas ou veladas, como pelo uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite ou a vontade pessoal. Este estudo buscou identificar a incidência da violência sexual contra crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas de violência. Estudo de revisão bibliográfico, descritivo e exploratório. Partiu-se da análise de 21 artigos disponíveis nas bases de dados: Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde e análise do relatório anual do disque 100. Observou-se nos dados obtidos pelo Balanço sobre Denúncias de Violação de direitos Humanos contra crianças e adolescentes coletados pelo o disque 100 que em 2015 no Brasil contabilizou 153.962 mil denúncias. As violências mais denunciadas foram: a negligência, 38,04%; a violência psicológica, 23,90%; a violência física com média nacional de 22,16% seguida a violência sexual com 11%, 42 dos casos. Quanto ao perfil confirmou-se que de N= 15.3962, destes 54% eram do sexo feminino e a faixa etária das vítimas mais atingidas são: 4 a 11 anos (40% e 12 a 17 anos (30%) Quanto a raça meninas e meninos negros somam 57,55 e brancos , 41, 6%. Diante dos dados conclui-se que a violência contra criança continua um problema social, político e principalmente envolve questões de gênero. O canal de denúncia o disque 100, possibilitou o mapeamento dos indicie de violência sexual contra criança e adolescente brasileira. Palavras- chave: Violência sexual, Violência de Gênero, Criança e adolescente.

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS USUÁRIOS DAS VIAS

CHAVES, Jessica Bastos*; BARROS, Jozielma Bastos da Silva; FRANÇA, Regina Célia Cantanhede; SOARES, Juliana Avelar; PEREIRA, Andreia Reis; SILVA, Nelma Pereira
Email: jessycabastos@hotmail.com

Curso: Psicologia

Resumo: Sabe-se que há vários fatores podem contribuir para a violência no trânsito: sociais, ambientais, culturais e individuais. O trânsito é uma negociação permanente do espaço, em que muitas vezes o carro, de um simples veículo de locomoção, pode se transformar numa verdadeira arma. Descrever a incidência de violência no trânsito e suas consequências. Estudo bibliográfico baseado na análise de 10 artigos científicos, disponíveis nas bases de dados: SCIELO e Google Acadêmico. Considerou-se os artigos que tratava da temática publicados em português a partir de 2010. A cada ano, 1,2 milhões de homens, mulheres e crianças de todo o mundo perdem suas vidas em decorrência de colisões ocorridas no trânsito e outras centenas de milhares de pessoas ficam feridas. Mais da metade de todas as mortes globais no trânsito ocorrem em jovens entre 15 e 44 anos de idade e 73% de todas as vítimas de fatalidades globais de trânsito são do sexo masculino. Os vulneráveis usuários das vias representam uma proporção muito maior de colisões de trânsito nos países de baixa e média renda do que em países de alta renda. O alto índice de acidentes de trânsito no Brasil faz com que uma grande quantidade de vidas seja ceifada anualmente. O trânsito exige que o indivíduo pense sob a ótica da coletividade, visto que um acidente de trânsito atinge muitas pessoas de diferentes formas, sendo assim, zelar pela vida do outro e pela própria vida deve ser a lei maior.

VÍRUS IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA: REVISÃO DA PATOGENIA, CARACTERÍSTICAS IMUNOLÓGICAS, EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO, E ENTRE OUTROS ASSUNTOS.

DE MELO, Bruna De Oliveira*; MAIA, Hermerson Sousa; BOMFIM, Maria Rosa Quaresma.

Email: brunaoliv.96@gmail.com

Área / Especialidade: Biomedicina

Desde o diagnóstico das primeiras infecções pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), no início dos anos 80, o vírus se disseminou pelo mundo tornando-se um dos maiores problemas de saúde pública. A AIDS ou Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida é a doença causada pela infecção com o HIV. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2015, foram registrados 2,1 milhões de novos casos de infecções. O HIV pertence à família Retroviridae e gênero Lentivirinae e atua em células do sistema imunológico do hospedeiro provocando a morte destas células, debilitando o sistema imune do indivíduo, deixando-o exposto a diversas infecções por patógenos oportunistas. Diversas formas de transmissão do vírus podem ocorrer, tais como: por relação sexual desprotegida, por transfusão de sangue e hemoderivados, transplante de órgãos, por compartilhamento de agulha entre os usuários de drogas injetáveis, transmissão vertical da mãe para o filho durante a gestação, parto e aleitamento materno. Ocasionalmente, infecções podem acontecer no ambiente de trabalho entre os profissionais da

saúde. Este estudo teve como objetivo revisar vários aspectos referentes à patogenia, aspectos clínicos, características imunológicas, epidemiologia, diagnóstico e tratamento das infecções causadas pelo HIV. Palavras-chave: HIV, AIDS, Infecção, Imunológico.

TEMA LIVRE REVISÃO DE LITERATURA PÓS GRADUAÇÃO

A NEUROPSICOLOGIA PODE AJUDAR NA EDUCAÇÃO

MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes de Melo; JUNIOR, Gilberto Assunção Costa ; CASTRO, Rízia Bastos Silva; ; ALVES, Cândida Helena Lopes

Curso: Psicologia

Email: elianeek2@hotmail.com

Resumo : A Neuropsicologia é uma ciência que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento. E, por conta dessa ligação tão intrínseca, nota-se que esse campo científico, com certeza, pode ser utilizado para ajudar também na Educação, proporcionando aprimoramentos nas formas de aprendizagem e ensino. Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica que utilizou artigos nacionais das plataformas de dados scielo e capes, objetivando conscientizar os profissionais de que a Neuropsicologia é uma excelente aliada à complexidade que existe na área educacional, ajudando o educador e o educando no processo de ensino-aprendizagem, pois permite estabelecer algumas relações entre as funções corticais superiores, como a linguagem, a atenção, a memória e a aprendizagem simbólica (conceitos, escrita, leitura). Sabe-se que, a partir do conhecimento do desenvolvimento e funcionamento normal do cérebro, pode-se compreender alterações cerebrais, como no caso de disfunções cognitivas e do comportamento resultante de lesões, doenças ou desenvolvimento anormal do cérebro. Através dos estudos realizados, verificou-se que a Neuropsicologia pode auxiliar diversos

profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e psicopedagogos, propiciando uma intervenção terapêutica mais eficaz, pois, por meio dela, pode-se compreender melhor os processos perceptivos, mnêmicos, de aprendizagem, solução de problemas, dentre outras atividades cognitivas. Sendo, portanto, uma área bastante relevante para os profissionais relacionados à Educação, visto que colabora para ampliar os conhecimentos sobre como todo o processo de aprendizagem se desenvolve, assim como meios de aperfeiçoar ainda mais a forma de ensinar

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS CLÍNICOS

DE MELO, Eliane Ribeiro Magalhães de Sousa Fortes*; CASTRO, Rizia Bastos Silva; SELARES, Davianne Santos Miranda; OLIVEIRA, Claudiane Silveira; SANTOS, Ester Santana De Carvalho; DE CASTRO, Karla Virginia Bezerra; ALVES, Cândida Helena

Email: elianeek2@hotmail.com

Curso: Fisioterapia

Resumo: O AVE - Acidente Vascular Encefálico - é uma das principais causas de morte e de sequelas no mundo, atingindo cerca de 16 milhões de pessoas anualmente e dessas, seis milhões morrem. No Brasil, é a principal causa de morte e incapacidade, gerando impactos econômicos e sociais. Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre o AVE com foco na etiologia e principais transtornos motores e apresenta como método uma revisão bibliográfica através dos bancos de dados: PUBMED, LILACS e SCIELO, entre os anos de 2012 a 2016. Resultados: Existem dois tipos de AVE: o Isquêmico, decorrente de obstrução de artéria que leva o sangue para o cérebro e o Hemorrágico, conseqüente de um rompimento em um vaso sanguíneo nesta região, causando hemorragia cerebral. A sintomatologia depende da localização e abrangência, da natureza e funções da área atingida, além da disponibilidade de um fluxo colateral. Como sequelas, há os défices neurológicos uni ou bilaterais, dependendo da localização e da dimensão da lesão cerebral, podendo apresentar perda do controle motor voluntário, hemiplegia ou hemiparesia, existindo assim um comprometimento ao nível das função neuromuscular, sensorial, motora, perceptiva e cognitiva/comportamental. Sua etiologia multifatorial inclui fatores não modificáveis: idade, constituição genética, sexo e fatores passíveis de diagnóstico prévio e tratamento, tais como a hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiopatias, enxaqueca, o uso de anticoncepcionais hormonais, ingestão de bebidas alcoólicas, colesterol alto, fumo, sedentarismo e obesidade. A informação e adequação dos hábitos de vida diária é primordial para a prevenção do AVE.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SÃO LUÍS – MA: PERFIS E FORMAÇÃO

JUNIOR, Jamesson Ferreira Leite*; PEREIRA, Dagolberto Calazans Araujo; SERRA, Humberto Oliveira

Email: jjpsi@hotmail.com

Área/Especialidade: Psicologia

O conhecimento sobre as variáveis socio-clínicas e nível acadêmico dos Agentes Comunitários de Saúde, permite uma maior aproximação com estes profissionais de saúde. Até o momento não há publicação que represente esta categoria de forma ampla em São Luís – MA. Para tornar isto possível, foi realizado um estudo quantitativo e descritivo, que pudesse representar estatisticamente toda a classe no município. A coleta de dados foi realizada em julho de 2016, de um total de 822 profissionais registrados no SCNES, foram sorteados 300 ACS utilizando-se seus Cartões do SUS, dos quais 202, participaram da pesquisa. Aplicaram-se questionários de cadastro que compõem o sistema e-SUS, as respostas foram tabuladas no STATA 12, revelando um público essencialmente do sexo feminino, 93,53%, entre 45 a 59 anos, 55,22%, residem em imóveis próprios 88,06%, na zona urbana 87,31%, com formação acadêmica predominante de nível médio/técnico 62,5%. No que se refere às condições de saúde, a doença crônica com maior prevalência é hipertensão 17,91%, com 46,84% considerando-se acima do peso, sem planos particulares de saúde 94,41%. Este público deve ser compreendido e analisado, tanto para o desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador e metas de trabalho exequíveis, na medida em que, seu processo de trabalho, requer tanto conhecimentos técnicos, quanto habilidades e resistência física, devido ao deslocamento diário, para realização das visitas para acompanhamento das famílias do território adscrito, assim como preenchimento de formulários e ações de educação em saúde em âmbito coletivo e individual. Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, formação, características socio-clínicas.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO LACTOBACILLUS RHAMNOSUS FRENTE A E.COLI

RABELO, Herika Polyana Silva Martins*; FERRAZ, Fernanda Avelino; DINIZ, Mikael Italo Cantanhede; MENDES, Aleff Ricardo Santos; SANTOS, Samia Melo; DOS SANTOS, Julliana Ribeiro Alves; MONTEIRO, Andrea De Souza.

Email: carlosvinni@hotmail.com

Área/Especialidade: Farmácia

O referente trabalho tem como objetivo analisar a inibição do *Lactobacillus rhamnosus* frente cepas da *E.coli*. A bactéria a ser utilizada para analisar sua atividade inibidora será o *Lactobacillus rhamnosus* UFMG 154.6, que se encontra liofilizado no laboratório de microbiologia da Universidade Ceuma e que foi concedido pela Universidade Federal de Minas Gerais. As cepas

da E.coli, EPEC, EHEC, EAEC, EIEC e ETEC pertencem à bacterioteca da Universidade Ceuma e serão utilizadas nos ensaios. Utiliza-se o método baseado na preparação inicial do inócuo, onde será utilizado a escala 2 de Mac Farland (6.10^8), para verificar turbidez, primeiramente será retirada uma colônia isolada que será adicionada no tubo com salina, em outro tubo adiciona-se 5ml de MH mas 1ml da bactéria, deixando na proporção 1:5, o número ficará puro 10^8 que antes era 6.10^8 , realizar a inversão no tubo. Será adicionado 4. 500 microlitros de MH e completar com 500 microlitros da bactéria para ajustar o numeram 10^8 para 10^7 . Logo depois se prepara o controle zero, em 6 ependorfs será adicionado 900 microlitros de salina e 100 microlitros da bactéria do ependorf contendo 10^7 , deixando-o 10^6 , fazer a diluição e ao final descartar 100 microlitros, plaquear todo o controle zero menos o ependorf número 1. Preparar o tubo de crescimento em 6 ependorfs, nos quais serão adicionado 900 µl de MH, faz-se a distribuição geométrica do lactobacillus do meio MRS, adicionando 1000 µl deste no primeiro ependorff, homogeneizar e transferir 1000 µl para o próximo ependorf, assim até o ependorf de numero 6 e descartar os 1000 µl e adiciona-se 100 µl da bactéria do inoculo. Será preparado o controle positivo, em 6 ependorf adicionar 900 microlitros de MH, adicionar 1000 microlitros de MRS e realizar a diluição descartando-se 1000 ao final, e completar com 100 microlitros da bactéria, armazenar na estufa por 24 horas. Logo depois será feito a micro diluição seriada, Logo depois se deve plaquear, primeiramente retirar 10 µl de cada ependorf e plaquear com auxilio de perolas de vidro, colocar na estufa e aguardar 12 horas para leitura, onde serão contadas as unidades formadoras de colônia. Este experimento determinará a capacidade de inibição do lactobacillus frente as cepas da E.coli na qual será analisado o crescimento das bactérias e possibilitara construir um gráfico contendo as diferenças entre cada ependorf nas diferentes diluições. O resultado da diluição seriada seguida de plaqueamento foi que o lactobacillus apresentou atividade antimicrobiana, todas as cepas foram inibidas nas primeiras diluições; verificou-se as unidades formadoras de colônia, a primeira diluição nada cresceu, pois a quantidade de lactobacillus foi suficiente, estava em maior concentração, porém nas últimas diluições tudo cresceu e algumas placas foram impossíveis de contar devido o lactobacillus está em menor concentração, ou seja, ao comparar com controle positivo esses dados se confirmaram, todas as cepas cresceram no meio sem o lactobacillus. Palavra Chaves: Bactéria, Lactobacillus e E.coli.

CUIDADOS PALIATIVOS E ODONTOLOGIA

LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco Leite; CARVALHO, Luenna Teixeira; ROMÃO; Iasmym Queiroz; CAVALCANTE, Salma Ivana Araújo

Curso: Odontologia

Email: haddalyz@hotmail.com

Resumo : De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) “Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. Os cuidados paliativos em odontologia podem ser definidos como o manejo de pacientes com doença avançada, ou progressiva, devido ao envolvimento da cavidade oral pela doença ou seu tratamento, direta ou indiretamente, e o foco do atendimento é a melhora da qualidade de vida. Os cuidados paliativos odontológicos têm como objetivo primário manter adequada saúde bucal para evitar infecções na boca, garantir que próteses mal ajustadas não machuquem a cavidade bucal do paciente, evitar problemas de deglutição e boca seca, garantir que o doente tenha condições de se alimentar e de respirar adequadamente, além de se comunicar com médicos, cuidadores e familiares

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E QUALIDADE DE VIDA DOS ALUNOS DO PPGO/UFC: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DO WHOQOL-BREF

TEIXEIRA, Cinthia Nara Gadelha*; SOUZA, Rita de Cássia da Rocha Oliveira; RODRIGUES, Maria Imaculada de Queiroz; SILVA, Paulo Goberlanio de Barros; MOFFA, Eduardo Buozi; DE ALMEIDA, Maria Eneide Leitão; FROTA, Myrna Maria Arcanjo

Email: ritarsouzaji@hotmail.com

Curso: Odontologia

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre os dados sociodemográficos e a qualidade de vida (QV) dos estudantes do Programa de Pós-graduação em Odontologia (PPGO) da Universidade Federal do Ceará (UFC), através do emprego do WHOQOL-bref. A QV é definida, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive. Realizou-se um estudo transversal, com abordagem quantitativa, sendo a coleta realizada entre junho e agosto de 2015, utilizando para a análise dos dados de QV dos quatro domínios da escala, o físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, além da autoavaliação, os índices insatisfação/indiferença e satisfação quanto a QV. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFC, sob o parecer de nº 1.113.226. Participaram 88 discentes, sendo a maioria (61,4%) do sexo feminino e 48,9% se disseram solteiros. Dentre os entrevistados, 75% consideraram-se religiosos e 68,2% eram bolsistas da pós-graduação. Quando associados os dados sociodemográficos com os índices de análise da QV, verificou-se resultados estatisticamente significantes nos estudantes solteiros ($p=0,005$), os que se consideraram

religiosos ($p=0,041$) e aqueles não bolsistas na pós-graduação ($p=0,025$), sendo classificados como insatisfeitos/indiferentes quanto à QV. Concluiu-se que o estado civil, considerar-se uma pessoa religiosa e possuir bolsa da pós-graduação interferiu diretamente na QV dos alunos da pós-graduação em odontologia.

GUILLAIN BARRÉ: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS CLÍNICOS DESTA SÍNDROME

DOS SANTOS, Ana Clara Soares*; DE MELO, Luzia Rosa Souza; SOUSA, Mariana Lucia E. Vasconcelos; MONDAINI; Rosimery Leão; SANTOS, Thiago Filipe Linhares; SOARES, Thiago Filipe Linhares; ALVES, Cândida helena

Curso: Psicologia

Email: anaclarassantos93@gmail.com

A Síndrome de Guillain Barré é considerada uma doença autoimune engatilhada por uma infecção viral ou bacteriana previa que se manifesta por uma poliradiculoneuropatia inflamatória aguda, resultando em debilidade motora progressiva e arreflexia. Objetivo: discorrer sobre a síndrome de Guillain Barré com foco nos principais transtornos motores. Método: revisão bibliográfica através dos bancos de dados: PUBMED, LILACS e SciELO, com refinamento de abrangência temporal entre os anos de 2000 a 2016. Resultados: De aparecimento súbito e etiologia desconhecida, a síndrome é relativamente rara atingindo ambos os sexos com maior prevalência no sexo masculino. Define-se como uma patologia desmielinizante periférica imunomediada e sintomatologicamente caracterizada por dor nos membros inferiores associada à fraqueza muscular progressiva, simétrica, distal evoluindo para uma paralisia ascendente e flacidez muscular com perda de reflexos profundos, bilaterais e simétricos. Além destes, alterações na deglutição, paralisia facial, alteração nos movimentos oculares, ataxia cerebelar e nos músculos respiratórios e disfunções autonômicas estarão presentes, podendo levar a morte. O diagnostico é feito através dos sinais e sintomas, eletroneuromiografia, analise de liquor e exames imunológicos. Outros exames podem ser realizados para descartar outras patologias. Embora seja uma síndrome de bom prognostico, o risco de óbito gira em torno de 7,5%, tendo como fatores de mal prognostico a idade avançada, presença de anticorpos antiglicosideos, antecedente de diarreia e recuperação demorada com comprometimento da musculatura respiratória. Conclusão: os estudos aqui realizados permitiram ampliar a visão em relação a síndrome e alterações no funcionamento motor, permitindo maior aproximação com o tema e compreensão das limitações vivenciadas pelo paciente. Descritores: Guillain Barré: Transtornos De Movimento, Etiologia, Bases De Dados Bibliográficas.

ÍNDICE INFLAMATÓRIO DA DIETA E SUA RELAÇÃO COM DOENÇAS CRÔNICAS.

BARROS, Mariana Castro*; BARBOSA, Thaís Portela Rocha; OLIVEIRA, Leila Alves; CARVALHO, Wyllyanne Rayana Chaves; BARBOSA, Janaína Maiana Abreu; DE CARVALHO, Carolina Abreu.

Email: cbarros.mariana@gmail.com

Área/Especialidade: Nutrição

A inflamação crônica tem sido associada à ocorrência de diversas doenças crônicas, como aterosclerose, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, resistência insulínica, câncer, dentre outros. Existem evidências de que a dieta desempenha importante papel na regulação da inflamação crônica. A literatura sugere que uma “dieta pro-inflamatória”, isto é, composta predominantemente por alimentos e nutrientes capazes de promover maior liberação de mediadores pro-inflamatórios, representa um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Nesse contexto, o Índice Inflamatório da Dieta (IID) foi desenvolvido nos Estados Unidos em 2014, com a proposta de ser um instrumento para avaliação do potencial inflamatório da dieta. O IID é um contínuo que varia de maximamente anti-inflamatório à maximamente pro-inflamatório. Na presente revisão, foram encontrados estudos recentes (2014 a 2016) que tem verificado a associação entre maiores valores do IID (dieta pro-inflamatória) e aumento de mediadores pro-inflamatórios como Proteína C reativa e Interleucina-6, maior risco de alguns tipos de câncer (colorretal, próstata e mama), aumento da chance de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, bem como maior inflamação sistêmica e diminuição da função pulmonar, promovendo a piora da asma. Além disso, o IID também foi associado ao desenvolvimento de depressão e redução da densidade óssea. A maioria desses estudos foi realizada em populações de adultos ou idosos de ambos os sexos. O IID é um proposta muito recente e por isso necessita ser estudado em mais populações a fim de confirmar sua capacidade de detectar o potencial inflamatório da dieta. Entretanto, trata-se de uma ferramenta promissora para avaliar-se o consumo alimentar sob o ponto de vista do papel da dieta na inflamação e desta última no desenvolvimento de doenças crônicas. É possível que futuramente, caso os estudos continuem evidenciando a boa capacidade do IID na avaliação do potencial inflamatório, seu uso seja popularizado nas clínicas e consultórios.

INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE OCORRIDAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

ALMEIDA, Hariane Freitas Rocha*; RODRIGUES, Cianna Nunes; NORONHA, Francisca Maria Ferreira; MACHADO, Márcia Cristina Aguiar Mendes; ALVES, Raissa Pinheiro Lobato; CALAZANS, Dagolberto Araújo Pereira; SANTIAGO, Lilia De Cássia Piedade

Email: harianealmeida@hotmail.com

Curso: Enfermagem

Resumo: As infecções são as mais frequentes e importantes complicações ocorridas em pacientes hospitalizados. Objetivou-se descrever as infecções relacionadas a assistência à saúde ocorridas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público em São Luís-MA. Tratou-se de um estudo descritivo, analítico e transversal realizado com 1048 pacientes internados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Para análise estatística foi utilizado o Programa Bioestat 5.0, usado o Teste Qui-quadrado estimando a Odds Ratio (OR), intervalo de confiança de 95% e valor $P < 0,001$, e o Teste Kruskal-Wallis. 50,38% eram do sexo feminino; 37,11% tinham mais de 65 anos; 43% foram internados para realizar cirurgia eletiva; 48,5% foram oriundos do centro cirúrgico; a duração média das internações foi de 7,41 dias e 31,25% evoluíram ao óbito. Em relação às infecções, 47,03 % apresentaram Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAVM), 15,14% Pneumonia Nosocomial, 14,05% Infecção do Trato Urinário (ITU) e 9,73% Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS). Em relação aos óbitos, os pacientes com PAVM têm chance 4 vezes maior de evoluírem a óbito do que os pacientes que não apresentaram nenhum tipo de infecção ($p < 0,0001$); e também apresentam maior probabilidade de desenvolver sepse e choque séptico do que os pacientes que apresentaram ITU ($p = 0,008$). Constatou-se que a infecção mais incidente foi a PAVM, o que sugere uma reavaliação nos protocolos assistenciais. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade CEUMA por meio do parecer nº 539739 de 24 de fevereiro de 2014.

MANIFESTAÇÕES AUDITIVAS E EXTRA-AUDITIVAS EM INTEGRANTES DE UM GRUPO DE BUMBA-MEU-BOI

MUNIZ, Carina Moreno Dias*; DIAS, Rosane da Silva; FAÇANHA, Rachel Costa

Curso: Fisioterapia

Email: Carina.muniz@ifma.edu.br

O ruído em forte intensidade e por um longo período de tempo pode ocasionar uma perda auditiva, sendo este um dos maiores agentes causadores de doenças ocupacionais. Existem normas que estabelecem como obrigatório, para todas as empresas, o monitoramento do ruído ocupacional e da condição auditiva dos trabalhadores, porém os músicos ainda não contam com amparo legal no que se refere à saúde e segurança no trabalho. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo descritivo, composto por uma amostra aleatória simples, contendo 41 integrantes de um grupo de bumba-meu-boi. A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2016, por meio de um questionário adaptado da pesquisa de Gambarra et al

(2012), contendo as variáveis de estudo: características da amostra social, perfil laboral e sintomas auditivos e extra-auditivos. . Estudo aprovado pelo CEP com parecer de nº 1.532.544. Dos indivíduos avaliados 58,5% eram do sexo masculino, com idade média de 27,68 anos, estando 58,5% com 15 a 25 anos idades entre, 53,7% são dançarinos e 46,3% são percursionistas. Com relação ao perfil sócio-laboral, 80,5% não possuem outra atividade ocupacional com exposição ao ruído. O tempo médio de participação no grupo é de 8,83 anos, sendo 75,6% com exposição de 2 horas diárias. 95,1% dos entrevistados não fazem uso de equipamento de proteção auditiva. O sintoma auditivo mais relatado pela amostra foi o zumbido, com 68,3%, sendo que 29,3% referiram otalgia, 19,5% apresentaram dificuldade de inteligibilidade da fala, 26,8% relataram dificuldade de compreender o rádio na presença de ruído e 24,4% referiram tontura, com 22,0% de dificuldade de atenção. Dentre os sintomas extra-auditivos, os distúrbios digestivos apresentaram maior prevalência, com 41,5% dos casos, seguido de alteração do humor (36,6%), alteração do sono e cansaço frequente com 24,4%. 22,0% relataram cefaleia. Os resultados demonstram que um maior número dos integrantes são do sexo masculino com idades de 15 a 25 anos , e dançarinos não possuindo outra atividade laboral com exposição a ruído e com frequência na quadra de ensaios de duas vezes na semana, ainda relatam como maior sintoma auditivo o zumbido e dificuldade em compreender o rádio na presença de ruído e um número bastante significativo não faz uso de EPI fazendo-se necessário conscientização do uso de equipamento de proteção individual e conscientização sobre sintomas auditivos extra-auditivos para uma saúde auditiva ,que se mau cuidada, interfere na compreensão de sons em atividades diárias como escutar radio/tv e interações sociais que poderão prejudicar a qualidade de vida pessoal e profissional.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ODONTOLOGIA POR IMAGEM

LEHMKUHL, Nery Nunes*; DO NASCIMENTO, Marcos Vinicius Monteiro; ROCHA, Thays De Sousa Medeiros; BRAGA, Vinicius Guilherme Leitão Dos Santos; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos; MACIEL, Francisco José Lima

Email: thaysmedeirosrocha@gmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

A imaginologia é uma das maiores ferramentas do cirurgião dentista, ao revisar parte da literatura disponível, percebe-se como os avanços tecnológicos nesta área possibilitam diagnósticos cada vez mais precisos e precoces, além de mais seguros e menos invasivos. Nota-se que, apesar de continuar como a mais utilizada, a técnica de radiografia utilizando filme convencional está sendo gradualmente substituída por técnicas mais avançadas, onde os filmes são substituídos por sensores que permitem a imediata digitalização e manipulação da imagem.

Um dos maiores avanços está relacionado a tecnologias como a tomografia Computadorizada, principalmente a TC de feixe cônico (cone beam), que permite produzir imagens 3D, se comparado a técnica radiológica convencional que tenta representar estruturas tridimensionais em 2D, o que resulta em perda de fidelidade na representação de ditas estruturas. Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas pelos raios-x, a TC evidencia as relações estruturais em profundidade, mostrando imagens em “fatias” do corpo humano. A TC permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com uma definição admirável, permitindo a delimitação de irregularidades tridimensionalmente. A Ressonância Magnética é outra técnica muito interessante, considerada padrão ouro na avaliação de tecidos moles, como o disco da ATM, além de evitar a utilização de radiação ionizante. Além destes, vale mencionar também a ultrassonografia, muito utilizada na avaliação de tecidos musculares, por exemplo. Todos esses avanços são de grande ajuda para que o cirurgião dentista possa cuidar de seus pacientes da melhor maneira possível.

OSTEOMA EM ANGULA MANDIBULAR

DA SILVA, RONNIERY FALCÃO*, DE SOUZA, ALISON CRUZ; MACIEL, FRANCISCO JOSÉ LIMA; MACIEL, ANDREZZA DE ALMEIDA BASTOS.

Categoria : PÓS-GRADUAÇÃO

Email: ronnieryfalco@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

Osteomas são tumores de crescimento ósseo benigno, que se desenvolvem a partir do osso maduro compacto ou esponjoso. São normalmente diagnosticados na região bucomaxilofacial e dificilmente, em outros ossos. Os locais de ocorrência mais frequentes são a mandíbula e os seios paranasais. Encontrados em ambos os sexos, e sua prevalência é mais comum em adultos jovens, tendo sua origem associada a anomalias congênitas, à inflamação crônica, atividade muscular, aos distúrbios embrionários e ao trauma. Clinicamente possui rápido crescimento e suas principais características são a dor e o edema, em geral, localizados na própria lesão. No presente artigo, é relatado o caso de um jovem que se queixava de aumento de volume em região do angulo direito da mandíbula, com evolução de 3 anos. Ao exame tomográfico da face, apresentaram uma imagem hiperdensa, de formato oval e superfície irregular adjacente à cortical óssea de corpo mandibular direito. Com hipótese diagnóstica de osteoma, o paciente foi submetido à cirurgia sob anestesia geral, para a excisão da lesão. Após a peça cirúrgica ser enviada para análise, o laudo histopatológico confirmou diagnóstico de osteoma compacto. Após décimo quinto dia pós-operatório, o paciente não mais apresentava dor. Descritores: Osteoma; Osteocondroma; Neoplasias ósseas mandibulares.

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA

MONTEIRO, Pablo De Matos*; LIMA, Marcus Vinícius Viégas; MADEIRA, Hellyne Giselle Reis.

Email: pablomonteiro96@hotmail.com

Área / Especialidade: Enfermagem

Estimar a prevalência de depressão em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia em um Hospital Estadual de referência em São Luís- MA. **Materiais e métodos:** Estudo analítico e transversal realizado no Hospital Estadual de Câncer Dr. Tarquínio Lopes Filho em São Luís – MA, entre setembro e outubro de 2014, através de amostra de conveniência com 40 pacientes oncológicos, através de um Questionário Sócio Demográfico e para avaliar a intensidade da Depressão, foi utilizado o Inventário de depressão de Beck. Inicialmente foi realizado uma análise descritiva. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana. **Resultados:** Foram incluídos no estudo, 40 pacientes oncológicos, com média de idade de 57 (± 18) anos, sendo a maioria (70%) do gênero feminino. Embora 60% (24) da amostra não relate doença crônica associada, a prevalência de depressão foi de 100% (40), sendo 62% (25) do tipo leve e apenas 3% (1) grave. **Conclusão:** A prevalência de sintomas depressivos nos pacientes com câncer realizando quimioterapia, com base nos resultados obtidos, abrange 100% da amostra, sendo a maioria do sexo feminino.

PROTOCOLO DE PREPARO E CIMENTAÇÃO DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO

SOUSA, Adriano Lessa De Sousa; GONÇALVES, Letícia Machado; PASCHOAL Marco Aurélio Benine

Curso: Odontologia

Email: adriano-lessa@hotmail.com

Resumo: Protocolo de preparo e cimentação de pinos de fibra de vidro **RESUMO:** O uso de pinos de fibras pré-fabricados, associados às resinas compostas, constitui uma opção conservadora para a restauração de dentes anteriores tratados endodônticamente. A utilização de sistemas de pinos de retenção dentária associados a núcleos de preenchimento na restauração de dentes submetidos a tratamento endodôntico é fator que ainda gera discussões. Aos pinos de retenção dentária são atribuídas duas principais indicações. A primeira, aceita de forma universal, é proporcionar retenção ao material restaurador empregado no preenchimento. A segunda indicação está relacionada ao reforço da estrutura dentária remanescente, sendo causa de controvérsias e objeto de várias pesquisas. Este trabalho tem como finalidade mostrar o passo-a-passo de uma técnica de cimentação de um pino de fibra de vidro realizada com o mesmo material para reconstrução coronária. Esta técnica facilita o procedimento, pois não há

necessidade do uso de resina composta para restauração final do elemento reabilitado. Palavras chave: Pinos de fibra de vidro; pinos estéticos; pinos de retenção dentária

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE MANDÍBULA UTILIZANDO A TÉCNICA DE CHAMPY

DA SILVA, Ronniery Falcão*; DE SOUZA, Alison Cruz; MACIEL, Francisco José Lima; MACIEL, Andrezza De Almeida Bastos.

Email: ronnieryfalco@hotmail.com

Área / Especialidade: Odontologia

As fraturas mandibulares são injúrias frequentes aos ossos da face, possuem etiologia variada, que compreendem os acidentes automobilísticos ou motociclísticos, agressões, quedas e até mesmo realização de exodontias. Este trabalho tem por finalidade relatar o caso do tratamento de uma fratura de ângulo mandibular de uma paciente, vítima de atropelamento, atendida no Serviço de Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Dr. Clementino Moura (São Luís–Maranhão). O acesso cirúrgico foi intraoral, e logo em seguida realizada a redução e fixação interna estável da fratura, pela técnica de Champy, sob anestesia geral. Na literatura, dentre as técnicas cirúrgicas preconizadas para a redução, contenção e imobilização dos segmentos fraturados na região de ângulo mandibular, a técnica de Champy destaca-se por propiciar boa estética, não ter cicatriz extraoral e promover bons resultados pós-operatórios.

TERAPIA DO LUTO: AS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO NO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DA PERDA

SANTOS, Maria da Graça Pereira*; DA SILVA, Jozielma Bastos; NUNES, Josiele Dias, SILVA, Paula Rayssa Nogueira da; SOUSA, Sousa; BOTELHO, Helena Rúbia de Santana

Curso: Psicologia

Email: gracinhapereira_2007@hotmail.com

Na literatura observa-se várias concepções da morte. Perpassando por diferentes culturas e por décadas, a morte foi considerada como natural ao ser humano, tranquila e resignada. Durante muitos séculos a vivência de morte ocorria no âmbito familiar, os rituais se davam numa cerimônia pública, de que todos participavam e eram autorizados a expressar os sentimentos pela perda. Passado - se alguns anos, embora a morte fosse vista como cotidiana, também foi percebida como um fracasso do falecido em relação à vida, salientando a impotência diante dela. Objetivou-se descrever as possibilidades de intervenção do profissional da psicologia frente ao paciente enlutado. Este trabalho consiste em um estudo de revisão bibliográfica, por meio da leitura de artigos publicados a partir de 2010 sobre a temática em questão. Constatou-se algumas teorias quanto ao processo de luto como: a teoria de Kluber-Ross, existem cinco

fases de elaboração do luto, são elas: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e aceitação. Concluiu-se que o profissional de psicologia pode contribuir no processo de elaboração do luto de diversas maneiras, dentro as quais são possíveis destacar: estabelecimento de uma postura empática para favorecer o acolhimento e vínculo; facilitar na expressão dos sentimentos relacionados à perda; explorar as crenças do paciente enlutado sobre os conceitos de morte; auxiliar através de uma abordagem terapêutica o paciente a buscar novas atividades ou investimentos afetivos, dentre outros.